एगलोरो

क्लोरपायरीफॉस 20% इ.सी. (किटकनाशक)

हे एक संपर्क आणि पोटाद्वारे कृती करणारे विषारी इमल्सीकरणयोग्य संप्रक्त मिश्रण क्लोरपायरीफॉस टेक्निकलवर आधारित आहे. ***इशाराः*** जलचरांसाठी विषारी असल्यामुळे जलाशयांजवळ आणि मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी वापरू नये. मधमाशांसाठी विषारी असल्यामुळे मधमाशा सक्रिय असताना वापरू नये. हे उत्पादन पक्ष्यांसाठी अतिशय हानीकारक आहे त्यामुळे पक्ष्यांच्या वस्तीस्थानाजवळ त्याचा वापर टाळावा.

शिफारसः

पीक	कीटकांची सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.त. (ग्रॅम %)	संरचना (मिलि)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
इमारती	(बांधकाम–पूर्व आणि पश्चात उपचार)	1% स.त.	–	–	–
गहू	3–4 मिली / किलो बियाणे		–	–	–
वानिकी	–	1% स.त.	–	–	–
माती उपचार	–	–	–	–	–
ए – बिगर शेती क्षेत्र					
सफरचंद	मावा	0.05%	3750–5000	1500–2000	–
बार्ली (जव)	3–4 मिली / किलो बियाणे				
बी – पिकाचे क्षेत्र					
शेंगा	शेंग अळी, काळा ढेकूण	600	3000	500–1000	–
वांगे	शेंडे आणि फळ पोखरणारा भुंगा	200	1000	500–1000	–
पानकोबी	डायमंड बॅकमॉथ	400	2000	500–1000	–
कापूस	मावा, बोंडअळी, पांढरी माशी	250	1250	500–1000	–
	चपटे कृमी	750	3750	500–1000	–
हरभरा	15–30 मिली / किलो बियाणे				
कांदा	मुळावरील ग्रब	1000	5000	500–1000	–
भात	हिस्पा	250	1250	500–1000	–
	पाने गुंडाळणारी अळी	375	1875	500–1000	–
	गॉल माशी, खोड किडा, वर्ल मॅगॉट	250	1250	500–1000	–
ऊस	6.25 लिटर्स / हेक्टर	–	–	–	–
वाळवी नियंत्रण					
गहू	2–3 लिटर्स / हेक्टर	–	–	–	–

वापरासाठी निर्देशः पिक संरक्षक उपकरणः नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि अस्पी–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

वापरण्याची वेळः– सीआयबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घ्यावा.

वापराणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजीः 1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारापासून दूर ठेवावे. 2. श्वासो– श्वास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये. 3. नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये. 4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा. 5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणे धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये. 6. फवारणी करतेवेळी सुरक्षात्मक कपडे घालावे.

विषबाधेची लक्षणेः डोकेदुखी, गरगरणे, भोवळ, मळमळ, उलटी, धूसर दिसणे, अतिसार, विक्षेप, घाम, डोळ्यातून अति पाणी आणि लाळ येणे उद्‌भवू शकते.

प्रथमोपचारः 1. गिळलं असल्यास, मानेवर थोपटून उल्टी करवा. उलटीतून स्वच्छ पाणी पडेपर्यंत असं पुन्हा पुन्हा करत रहा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उल्टी करवू नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर पाणी आणि साबणाने स्वच्छ धुवा. 3. डोळे दूषित झाल्यास भरपूर सलाईन / स्वच्छ पाण्याने सुमारे 10–15 मिनिटे धुवा. 4. श्वासावाटे आत गेल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या.

फायटोटॉक्सिसिटीः निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशकः 1. रुग्णाला लगेच अंट्रोपिन द्या. आणि त्याची 2 ते 4 मिग्रा. पर्यंत मात्रा 5 ते 10 मिनीटांच्या अंतराने शिरेद्वारे लावून पूर्ण अंट्रोपिनाइज ठेवावी. एक दिवसात अंट्रोपिन सल्फेट ची अधिकाधिक 25 ते 50 मिग्रा. पर्यंत ची मात्रा आवश्यक असू शकते. अंट्रोपिन सल्फेटची पुन्हा मात्रा लक्षणे दिसत असल्यास देता येवू शकते. 2. 1 ते 2 ग्राम 2 पी.ए.एम. 10 मि.ली. पाण्यात मिसळून शिरेद्वारे फार हळू हळू 10 ते 15 मिनीटात दिली पाहिजे.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाटः 1. किटकनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं किटकनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही किटकनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापरली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

साठवणीचे नियमः 1. किटकनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत. 2. किटकनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

क्लोरपायरीफॉस टेक. (94% भार / भार वर आधारित) :	21.50% भार / भार
इमल्सीफायरः अनआयनिक (कॅल्शियम अल्किल अरिल सल्फोनेट)	
नॉनआयनिक (पॉलि ऑक्सीइथीलीन इथर) :	6.00% भार / भार
सॉल्वंट (अरोमेक्स)	72.50% भार / भार
एकूणः	**100.00% भार / भार**

दक्षताः लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करुन टाकावे.

એગલોરો

ક્લોર્પાયરીફોસ 20% ઈ.સી. (જંતુનાશક)

તે એક સ્પર્શીય અને પેટમાં જઈને કાર્ય કરતું ક્લોર્પાયરીફોસ ટેકનિકલ આધારિત ઝેરી ઈમલ્સિફાયેબલ કોન્સન્ટ્રેટ સંયોજન છે. ***સાવચેતી:*** આ ઉત્પાદન જળચર જીવો માટે ઝેર સમાન છે. તેથી જળાશયો અને જળચર જીવ સૃષ્ટિની આસપાસ છંટકાવ ન કરવો જોઈએ. મધમાખીઓ માટે ઝેર સમાન છે. તેથી, મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યારે આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. આ ઉત્પાદન પક્ષીઓ માટે અત્યંત ઝેરીલું હોવાથી પક્ષીઓના માળાની આસપાસ તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

ભલામણ:

પાક	જીવાતનાં સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ %)	સંરચના (મિ.લી.)	પાણીની માત્રા (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસો)
મકાનો	(બાંધકામ પૂર્વે અને તે પછીની ટ્રીટમેન્ટ)	1% સ.ત.	-	-	-
ઘઉં	3-4 મિ.લી./કિ.ગ્રા. બિયારણ	-	-	-	-
વનીકરણ	-	1% સ.ત.	-	-	-
જમીનની ટ્રીટમેન્ટ	-	-	-	-	-
એ - બિન-સિંચિત વિસ્તાર					
સફરજન	એફિડ	0.05%	3750-5000	1500-2000	-
જવ	4-6 મિ.લી./કિ.ગ્રા. બિયારણ				
બી - સિંચિત વિસ્તાર					
બીન્સ/ ફણસી	પોડ બોરર, બ્લેક બગ	600	3000	500-1000	-
રીંગણ	શૂટ અને ફ્રૂટ બોરર	200	1000	500-1000	-
કોબીઝ	ડાયમંડ બેકમોથ	400	2000	500-1000	-
કપાસ	એફિડ, બોલવોર્મ, વ્હાઈટ ફ્લાય	250	1250	500-1000	-
	કટ વોર્મ	750	3750	500-1000	-
ચણા	15-30 મિ.લી./કિ.ગ્રા. બિયારણ				
ડુંગળી	રૂફ ગ્રબ	1000	5000	500-1000	-
ડાંગર	હિસ્પા	250	1250	500-1000	-
	લીફ રોલર	375	1875	500-1000	-
	ગૉલ મીજ, સ્ટેમ બોરર, વ્હોર્લ મેગોટ	250	1250	500-1000	-
શેરડી	6.25 લીટર/હેક્ટર	-	-	-	-
ટર્માઈટ કંટ્રોલ					
ઘઉં	2-3 લીટર/હેક્ટર	-	-	-	-

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ: છોડ સુરક્ષા ઉપકરણ: નેપ્સેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપ્સેક સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપ્સેક બેટરી સ્પ્રેયર તેમજ અસ્પી એચ.ટી.પી. પાવર સ્પ્રેયર.

પ્રયોગના સમયે:- CIB દિશાસૂચનો તપાસો.

વાપનાર માટે સાવચેતી: 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ઝેરનાં લક્ષણો: માથામાં દુ:ખાવો, ચક્કર આવવા, ઉબકા, ઉલ્ટી, ધૂંધળું દેખાવું, ઝાડા, આંચકી, પરસેવો થવો, આંખોમાંથી વધારે પાણી પડવું તેમજ લાળ પડવી વગેરે હોઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર: 1. જો ગળી જાય તો ગળાના પાછલા ભાગમાં ગલગલિયા કરીની ઉલટી કરો. ઉલ્ટી દ્વારા સાફ ના થાય ત્યાં સુધી તેને પુનરાવર્તન કરો. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઉલટી ન કરાવો. 2. જો કપડાં અને ચામડી દૂષિત હોય તો કપડાં દૂર કરો અને દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ. 3. જો આંખો દૂષિત થાય છે, તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટે ખારા/સ્વચ્છ પાણીથી પુષ્કળ ફ્લશ કરો. 4. જો શ્વાસ લેવામાં આવે, તો દર્દીને તાજી હવામાં રાખો.

છોડની વિષયુક્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

વિષનાશક: 1. રોગીને તરત 2 થી 4 મિલીગ્રામની એટ્રોપિન 5 થી 10 મિનિટ અંતરાલમાં અંત: શિરા દ્વારા લગાતાર આપીને પૂરી રીતે એટ્રોપાઇનાઇઝેશન જાળવો. એક દિવસમાં એટ્રોપિન સલ્ફેટનો વધુમાં વધુ 25 થી 50 મિલિગ્રામ જેટલું જરૂર પડી શકે છે, એટ્રોપિન કેટલી આપવી જોઈએ એ નક્કી કરવા માટે મો દ્વારા લાળની માત્રા કસોટી રૂપ છે. 2. 1 થી 2 ગ્રામ 2 પીએએ 10 મિલી નિસ્યંદિત પાણીમાં ભેળવો અને ધીરે ધીરે 10-15 મિનિટમાં આપો.

ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ: 1. આ જંતુનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ જંતુનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

સંગ્રહ માટે સૂચના: 1. આ જંતુનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ જંતુનાશકના પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી જંતુનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રાસાયણિક બનાવટ:

ક્લોર્પાયરીફોસ ટેકનિકલ (94% ભાર/ભાર પર આધારિત) :	21.50% ભાર/ભાર
ઈમલ્સિફાયર: એનઆયોનિક (કેલ્શિયમ આલ્કાઈલ એરાઈલ સલ્ફોનેટ) નોન-આયોનિક (પોલી ઓક્સિઈથાઈલિન ઈથર) :	6.00% ભાર/ભાર
સોલ્વન્ટ (એરોમેક્સ) :	72.50% ભાર/ભાર
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણીસૂચક નિવેદન: આ સાથેના લીફલેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર આ નીંદામણનાશકનો ઉપયોગ કરશો નહી. ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે. નીંદામણનાશકનો ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો.

ਏਗਲੋਰੋ

ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ 20% ਈ.ਸੀ. (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਹ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਘੁਲਣਯੋਗ ਗਾੜ੍ਹਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ***ਸਾਵਧਾਨੀ:*** ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ। ਇਸਲਈ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਨੇੜੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ %)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ.)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਇਮਾਰਤਾਂ	(ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਪਚਾਰ)	1% ਏ ਆਈ	-	-	-
ਕਣਕ	3-4 ਮਿ ਲੀ/ਕਿ ਗ੍ਰਾ ਬੀਜ	-	-	-	-
ਜੰਗਲਾਤ	-	1% ਏ ਆਈ	-	-	-
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ	-	-	-	-	-
ਏ - ਗੈਰ-ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ					
ਸੇਬ	ਏਫਿਡ	0.05%	3750-5000	1500-2000	-
ਜੌਂ	3-4 ਮਿ ਲੀ/ਕਿ ਗ੍ਰਾ ਬੀਜ				
ਬੀ - ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ					
ਫਲੀਆਂ	ਫਲੀ ਛੇਦਕ, ਬਲੈਕ ਬਗ	600	3000	500-1000	-
ਬੈਂਗਣ	ਟਹਿਣੀ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ	200	1000	500-1000	-
ਬੰਦਗੋਭੀ	ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਕਮੋਥ	400	2000	500-1000	-
ਕਪਾਹ	ਏਫਿਡ, ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	250	1250	500-1000	-
	ਕਟ ਵਰਮ	750	3750	500-1000	-
ਛੋਲੇ	3-4 ਮਿ ਲੀ/ਕਿ ਗ੍ਰਾ ਬੀਜ				
ਪਿਆਜ	ਰੂਟ ਗ੍ਰਬ	1000	5000	500-1000	-
ਝੋਨਾ	ਹਿਸਪਾ	250	1250	500-1000	-
	ਪੱਤੀ ਲਪੇਟ	375	1875	500-1000	-
	ਗਾਲ ਮਿੱਜ, ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਵ੍ਹਰਲ ਮੈਗਟ	250	1250	500-1000	-
ਗੰਨਾ	6.25 ਲੀਟਰ/ਹੈਕਟੇਅਰ	-	-	-	-
ਦੀਮਕ ਕੰਟਰੋਲ					
ਕਣਕ	2-3 ਲੀਟਰ/ਹੈਕਟੇਅਰ	-	-	-	-

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੀਪੀ ਉਪਕਰਣ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਏਐਸਪੀਈਈ-ਐਚਟੀਪੀ ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:– ਸੀਆਈਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋਂ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। 6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸਿਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਉਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਦਸਤ, ਕੜਵੱਲ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਝੂਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਰ ਟਪਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ: 1. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਾਫ਼ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। 2. ਜੇਕਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਤ੍ਵਚਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤ੍ਵਚਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 3. ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ। 4. ਜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ: 1. ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਟ੍ਰੋਪਿਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿਗ੍ਰਾ ਤਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫ ਨਾਲ ਅੰਤਰਨਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਏਟ੍ਰੋਪਿਨਾਇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਏਟ੍ਰੋਪਿਨ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਤੋਂ 50 ਮਿਗ੍ਰਾ ਤਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਟ੍ਰੋਪਿਨ ਸਲਫ਼ੇਟ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਲੱਛਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਟ੍ਰੋਪਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। 2. 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ 2 ਪੀ ਏ ਐਮ 10 ਮਿਲੀ ਡਿਸਟਿਲਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰਨਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਪੈਕੇਟਾ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਕਲੋਰਪਾਇਰੀਫੋਸ ਟੈਕ. (94% ਭਾ/ਭਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ) :	21.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ : ਐਨੀਓਨਿਕ (ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਅਲਕਾਇਲ ਅਰਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ) ਨੋਨੀਓਨਿਕ (ਪੌਲੀ ਆਕਸੀਥਾਇਲੀਨ ਈਥਰ) :	6.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸੌਲਵੈਂਟ (ਅਰੋਮੈਕਸ) :	72.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੁਲ:	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

एगलोरो

क्लोरपायरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. (कीटनाशक)

क्लोरपायरीफास को सही ढंग से उपयोग नहीं करने पर मनुष्य में देर से होने वाली पाली–न्युरोपैथी का असर पैदा कर देता है। यह एक क्लोरपायरीफास टेक्निकल से बनाई गई तैलीय संरचना है जो स्पर्श तथा निगल जाने पर असर करती है। *सावधान : जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह मधुमक्खियों के लिए जहरीला है, इसलिए जब मधुमक्खियाँ सक्रीय हो उस समय इसका छिड़काव न करें। यह उत्पाद पक्षियों के लिए अत्यधिक विषैला है इसलिए पक्षी आवास के निकट उपयोग से बचें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्रा.%)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्र (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन में)
ईमारत	भवन निर्माण से पहले अथवा बाद में उपचार	1 प्रतिशत सक्रिय तत्व	—	—	—
गेहूँ	3-4 मि.ली. संरचना प्रति किलो बीज	—	—	—	—
जंगल	—	1 प्रतिशत सक्रिय तत्व	—	—	—
भूमि उपचार हेतू	—	—	—	—	—
(अ) भवन निर्माण से पहले अथवा बाद में उपचार					
सेब	माहू	0.05%	3750 - 5000	1500 - 2000	—
जौ	4-6 मि.ली. संरचना प्रति किलो बीज				
(ब) बीजोपचार हेतू					
सेम	फली छेदक, काला कीट	600	3000	500 - 1000	—
बैंगन	तना और फल छेदक	200	1000	500 - 1000	—
पत्ता गोभी	हीरा पीठ–पतंगा	400	2000	500 - 1000	—
कपास	माहू, डोडे की सुंडी, सफेद मक्खी	250	1250	500 - 1000	—
	कजरा कीट (कटुआ सुंडी)	750	3750	500 - 1000	—
चना	15-30 मि.ली. संरचना प्रति किलो				
प्याज	जड़ का लट	1000	5000	500 - 1000	—
धान	रोमिल कर्कर्श	250	1250	500 - 1000	—
	पर्ण बेलनक	375	1875	500 - 1000	—
	पोगा गाड़, तना छेदक, चक्रीय कीट	250	1250	500 - 1000	—
गन्ना	6.25 ली. / हेक्टेयर कुंड में	—	—	—	—
दीमक की रोकथाम					
गेहूँ	2-3 ली. / हेक्टेयर जमीन छिड़काव	—	—	—	—

उपयोग के लिए दिशा–निर्देशः उपयोग में आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोग का समयः सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा, और आँखों के सम्पर्क से बचाये। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षणः सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी), अधिक पसीना आना, आंसू आना और लार टपकना हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्साः 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तताः सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विषनाशकः 1. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी 2 से 4 मि.ग्रा. तक की खुराक 5 से 10 मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक 25 से 50 मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बराबर रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। 2. 1 से 2 ग्राम 2 पी.ए.एम. 10 मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा द्वारा बहुत धीरे–धीरे 10 से 15 मिनट में देना चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटाराः 1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बें, बचा हुआ सामान तथा डिब्बों व कीटनाशक धोने का पानी इस प्रकार फेंके जिससे वातावरण व पानी दूषित न हो। 2. डिब्बों का फिर से प्रयोग रोकने के लिए उन्हें बाहर न छोड़ें। 3. डिब्बों को तोड़कर रहने के स्थान से दूर, जहाँ जमीन के नीचे पानी न हो, गाढ़ दें।

संग्रहण की शर्तेः 1. कीटनाशक कमरे या अलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार, व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये ताकि कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचनाः

क्लोरपायरीफास टेक्नीकल (भारानुसार 94 स.त. पर आधारित) :	21.50% भार / भार
इमल्सीफायर एनिओनिक (कैल्शियम एलकेल एरिल सल्फोनेट) नोन ओयोनिक (पौलीआक्सीइथिलीन ईथर) :	6.00% भार / भार
घोलक (एरोमेक्स) :	72.50% भार / भार
कुल :	**100% भार / भार**

सावधानीः लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। खाली डिब्बों का पुनः उपयोग खतरनाक है। लीफलेट के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् डिब्बों को नष्ट करें।

AGLORO

Chlorpyriphos 20% E.C. (Insecticide)

It is a contact and stomach poisonous emulsifiable concentrate formulation based on Chlorpyriphos technical. *Caution : Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. It is toxic to honeybees, spray application should be avoided during foraging period of bees. Product is highly toxic to birds hence avoid use near bird habitat.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha AI (gm%)	Formulation (ml)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in Days)
Buildings	*(Pre & Post construction treatment)*	1% a.i.	—	—	—
Wheat	*3-4 ml/kg seed*	—	—	—	—
Forestry	—	1% a.i.	—	—	—
Soil treatment	—	—	—	—	—
A - Non cropped area					
Apple	*Aphid*	0.05%	3750 - 5000	1500 - 2000	—
Barley	*4-6 ml/kg seed*				
B - Cropped area					
Beans	*Pod borer, Black bug*	600	3000	500 - 1000	—
Brinjal	*Shoot & Fruit borer*	200	1000	500 - 1000	—
Cabbage	*Diamond Backmoth*	400	2000	500 - 1000	—
Cotton	*Aphid, Ballworm, White fly*	250	1250	500 - 1000	—
	Cut worm	750	3750	500 - 1000	—
Gram	*15-30 ml/kg seed*				
Onion	*Root grub*	1000	5000	500 - 1000	—
Paddy	*Hispa*	250	1250	500 - 1000	—
	Leaf roller	375	1875	500 - 1000	—
	Gall midge, Stem borer, whorl maggot	250	1250	500 - 1000	—
Sugar-cane	*6.25 Ltrs./ha*	—	—	—	—
Termite control					
Wheat	*2-3 Ltrs./ha*	—	—	—	—

Direction of Use: P.P. Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of Application: Refer CIB guidelines.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting blurred vision, diarrhoea, convulsions, sweating, excessive lacrimation, and salivation may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient of fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendations.

Antidote: 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or promises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilation and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Chlorpyriphos Tech. (based on 94% w/w) :	21.50% w/w
Emulsifier : Anionic (Calcium Alkyl Aryl Sulphonate) Nonionic (Poly oxyethylene ether) :	6.00% w/w
Solvent (Aromex) :	72.50% w/w
Total :	**100% w/w**

Cautions: Not to be used on crops other than specified on label/leaflet. Dangerous to re-use the empty containers. Destroy the container after used as direction on leaflet.

AGLORO

Chlorpyriphos 20% E.C. (Insecticide)

एगलोरो

क्लोरपायरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. (कीटनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY

केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

Read the leaflet before use

सूचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें

Manufactured & Marketed by :

ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED

Regd. Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:

info@agrostar.in **9503095030**

or **customer service team** at the above address

అగ్లోరో

క్లోర్‌పైరిఫాస్ 20 శాతం ఈ.సి. (కీటకనాశిని)

ఇది స్పర్శనీయమైన మరియు కడుపులోకి వెళ్లి విషపూరితమైన ప్రభావం కలిగించు ఎమల్సిఫైయబుల్ ద్రవం సూత్రీకరణ. ఇది క్లోర్‌పైరిఫాస్ టెక్నికల్ పై ఆధారపడింది. *హెచ్చరిక: జలచరాలకు విషపూరితమైనది. కాబట్టి జలాశయాలు, చేపలు పెంచే చోట ఉపయోగించరాదు. తేనెటీగలకు విషపూరితమైనది. కాబట్టి, తేనెటీగలు చురుకుగా ఆహారం సంపాదించే సమయంలో ఉపయోగించరాదు. ఉత్పత్తి పక్షులకు అత్యంత విషపూరితమైనది కాబట్టి పక్షులు నివసించే చోట ఉపయోగించకూడదు.

సిఫారసు:

పంట	కీటకాల సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ. (గ్రా. శాతం)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీటిలో విలీనం (లీ.)	చివరి పిచికారీ నుండి కోతలకు మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజుల్లో)
భవంతులు	(శుద్ధి చేయడానికి ముందు మరియు తరువాత నిర్మాణం)	1 శాతం ఏ.ఐ.	-	-	-
గోధుమ	3-4 మిలీ/కేజీ విత్తనాలు	-	-	-	-
అడవి	-	1 శాతం ఏ.ఐ.	-	-	-
నేలను శుద్ధి చేయడం	-	-	-	-	-
ఏ - పంటయేతర ప్రాంతం					
యాపిల్	పేను బంక	0.05 శాతం	3750-5000	1500-2000	-
బార్లీ	4-6 మిలీ/కేజీ విత్తనాలు				
బి - పంట పెరిగిన ప్రాంతం					
చిక్కుళ్లు	కాయను తొలుచు పురుగులు, బ్లాక్ బగ్	600	3000	500-1000	-
వంకాయ	చిగుళ్లు మరియు పండును తొలిచే పురుగులు	200	1000	500-1000	-
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్‌మాత్	400	2000	500-1000	-
ప్రత్తి	పేను బంక, బాల్‌వర్మ్, తెల్ల దోమ	250	1250	500-1000	-
	కట్ వర్మ్	750	3750	500-1000	-
శెనగలు	15-30 మిలీ/కేజీ విత్తనాలు				
ఉల్లి	రూట్ గ్రబ్	1000	5000	500-1000	-
వరి	హిస్పా	250	1250	500-1000	-
	లీఫ్ రోలర్	375	1875	500-1000	-
	గాల్ మిడ్జ్, కాండం తొలుచు పురుగు, వొరల్ మగ్గోట్	250	1250	500-1000	-
చెరకు పొగాకు	6.25 లీటర్/హెక్టార్	-	-	-	-
గోధుమ	2-3 లీటర్/హెక్టార్	-	-	-	-

వినియోగించడానికి సూచనలు: పీ.పీ సామగ్రి: న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఏఎస్‌పీఈఈ-హెచ్‌టీపీ పవర్ స్ప్రేయర్.

ఉపయోగించే సమయం:- CIB మార్గదర్శకాలను చూడండి.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోరు, కళ్లు, చర్మాలకు తగలనీయరాదు. 3. పిచికారి పొగని పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలో పిచికారి చేయాలి. 4. పిచికారి చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తుల్ని మరియు శరీర భాగాల్ని బాగా కడకాలి. 5. పిచికారి చేసేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, పొగ తాగరాదు, నమలరాదు. 6. విష వాయువును పీల్చకుండ ఉండేందుకు వీలుగా తగిన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి.

విషపూరితం లక్షణాలు: తలనొప్పి, తల తిరగడం, వికారం, వాంతులు, ఎత్తైన ప్రదేశాలలో భయం కలగడం, కంటిచూపు మసకబారడం, అతిసారం, మూర్ఛలు, చెమటలు పోయడం, కన్నీరు కారడం, చొంగ కారడం కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినట్లయితే, గొంతు లోపల చేయి పెట్టి వాంతి తెప్పించాలి. వాంతి పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు ఇలా పునరావృతం చేయాలి. రోగి స్పృహలో లేకపోతే వాంతి తెప్పించరాదు. 2. చర్మం, దుస్తులు కలుషితమైతే దుస్తుల్ని తొలగించాలి మరియు కావల్సినంత సబ్బు, నీటి పరిమాణంతో కలుషితమైన చర్మాన్ని కడగాలి. 3. కళ్లు కలుషితమైతే, కావల్సినంత సెలైన్/పరిశుభ్రమైన నీటితో సుమారు 10 నుండి 15 నిముషాలు కడగాలి. 4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి.

విషప్రభావం: సిఫారసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే విషపూరితం కాదు.

విరుగుడు: 1. రోగిని వెంటనే అట్రోపైనైజ్ చేయాలి మరియు 5 నుండి 10 నిముషాల విరామంతో సరాల ద్వారా అట్రోపైన్ సల్ఫేట్‌ని 2 నుండి 4 మిగ్రా మోతాదుని పునరావృతం చేస్తూ పూర్తి అట్రోపైనైజేషన్ నిర్వహించాలి. రోజుకి 25 నుండి 50 మిగ్రా అట్రోపైన్ అవసరం కావచ్చు. లక్షణాలు కొనసాగినప్పుడు తదుపరి అట్రోపైన్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మోతాదుని సర్దుబాటు చేయడానికి నోటిలో నుండి చొంగ కారడం ఒక ఉపయోగకరమైన అర్హత. 2. 10 మిలీ డిస్టిల్డ్ నీటిలో 2 పీఏఎం 1-2 గ్రా కరిగించాలి మరియు చాలా నెమ్మదిగా 10-15 నిముషాలు సరాల ద్వారా ఎక్కించాలి.

కంటైనర్లని పడవేయడం: 1. మిగిలిన సామగ్రి ప్యాకేజీలు మరియు యంత్రాల్ని కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యం జరగకుండా సురక్షితంగా సురక్షితమైన విధానంలో పడవేయడం కీటకనాశిని తయారీదార్లు మరియు ఆపరేటర్లు, సూత్రీకరణదార్ల బాధ్యత. 2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిగా పెట్టరాదు. 3. ప్యాకేజీలను పగలుకొట్టి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.

భద్రపర్చడానికి సూచనలు: 1. ఈ కీటకనాశిని కూడియున్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పనులకు నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ కీటకనాశిని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో ఉంచి నిల్వ చేయవలెను. 2. ఈ కీటకనాశిని నిల్వ చేయుటకు ఉపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్మింపబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరణ కలిగియుండి చల్లగాను, పొడిగాను ఉండి ఆవిరితో కలుషిమ కాకుండా నివారించుటకై తగినకొలతలతో నిర్మింపబడి యుండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

క్లోర్‌పైరిఫాస్ టెక్. (94 శాతం భా/భా ఆధారం) :	21.50 శాతం భా/భా
ఎమల్సిఫైయర్: అనియోనిక్ (కాల్షియం ఆల్కైల్ ఆరైల్ సల్ఫోనేట్) నాన్ అయోనిక్ (పాలీ ఆక్సీథిలిన్ ఈథర్) :	6.00 శాతం భా/భా
ద్రావణం (పరిమళం) :	72.50 శాతం భా/భా
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరిక వ్యాఖ్యానాలు: కరపత్రం మరియు కరపత్రాలపై సూచించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఖాళీ కంటైనర్లని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి.

எக்லோரோ

குளோர்பைரிபாஸ் 20% இஸி (பூச்சிக்கொல்லி மருந்து)

இது ஒரு தொடு நஞ்சாகவும், வயிற்றுக்குள் சென்று செயல்படும் நஞ்சாகவும் வேலை செய்கிறது. இது கொழகொழப்பான அடர் ஃபார்முலா. இதன் அடிப்படை குளோர்பைரிபாஸ் டெக்னிக்கல். ***கவனம்:*** மீன்களுக்கு நச்சுட்டக்கூடியது, எனவே, நீர்நிலைகள், மீன்பண்ணை அருகே பயன்படுத்தக்கூடாது. தேனீக்களுக்கு நச்சுட்டக்கூடியது. எனவே, தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக பறக்கும் நேரங்களில் இதைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. இந்த மருந்து பறவைகளுக்கு அதிகம் நச்சுட்டக்கூடியது. எனவே பறவைகள் வசிப்பிடத்திற்கு அருகில் இதைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்கள்	டோஸ்/ஹெ ஏ.ஐ. (கிராம் %)	ஃபார்முலேஷன் (மி.லி.)	நீரில் கரைசல் (லி.)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
கட்டிடங்கள்	(கட்டுமானத்துக்கு முன்பு & பின்பு டிரீட்மெண்ட்)	1% ஏ.ஐ.	-	-	-
கோதுமை	3-4 ml/kg seed				
வனங்கள்	-	1% ஏ.ஐ.	-	-	-
மண்ணின் டிரீட்மெண்ட்	-	-	-	-	-
அ - பயிர்சாகுபடி இல்லாத பகுதி					
ஆப்பிள்	அபிட்	0.05%	3750-5000	1500-2000	-
பார்லி	4-6 ml/kg seed				
ஆ - பயிர் சாகுபடி உள்ள பகுதி					
பீன்ஸ்	நெற்றுத் துளைப்பான்	600	3000	500-1000	-
கத்தரிக்காய்	குருத்து & பழத்துளைப்பான்	200	1000	500-1000	-
முட்டைக்-கோஸ்	வைரமுதுகுப் பூச்சி	400	2000	500-1000	-
பருத்தி	அபிட், காய்ப்புழு, வெள்ளைப்பூச்சி	250	1250	500-1000	-
	வெட்டுப் புழு	750	3750	500-1000	-
பயறு	15-30 ml/kg seed				
வெங்காயம்	வேர் வண்டு	1000	5000	500-1000	-
நெல்	ஹிஸ்பா	250	1250	500-1000	-
	இலைச்சுருட்டை	375	1875	500-1000	-
	கால் மிட்ஜ், தண்டுத் துளைப்பான், உருண்டைப்புழு	250	1250	500-1000	-
கரும்பு	6.25 லிட்டர்/ஹைக்	-	-	-	-
கரையான் கட்டுப்பாடு					
கோதுமை	2-3 லிட்டர்/ஹெக்	-	-	-	-

பயன்படுத்த ஆலோசனை: செடிப் பாதுகாப்பு சாதனம்: நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர், கால்மிதி ஸ்பிரேயர், கம்ப்ரெஷன் நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர், கம்ப்ரெஷன் நேப்ஸேக் பேட்டரிஸ்பிரேயர், மற்றும் அஸ்பீ-எச்டி பிபவர் ஸ்பிரேயர்.

தெளிக்கும் நேரம்:- CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவுப் பொருட்கள், உணவு வைப்பதற்கான காலிப் பாத்திரங்கள், கால்நடைத் தீவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் வைக்காதீர்கள். 2. வாய், கண்கள், மற்றும் சருமத்தில் படாமல் தவிர்க்கவும். 3. தெளிக்கும்போது ஏற்படும் ஆவிப்படலத்தை சுவாசிக்காமல் இருக்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு மருந்து பட்ட துணிகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் நன்றாகக் கழுவவும். 5. தெளிக்கும்போது புகை பிடிப்பதோ, எதையும் உண்பதோ, குடிப்பதோ, மெல்லுவதோ கூடாது. 6. மருந்தைக் கரைக்கும்போதும், தெளிக்கும் போதும் முழு காப்பு உடைகளை அணியவும்.

விஷ அறிகுறிகள்: தலைவலி, கிறுகிறுப்பு, தலைசுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, பார்வை மங்குதல், வயிற்றுப்போக்கு, வலிப்பு, வியர்த்தல், அளவுக்கு அதிகமாக கண்ணீர் ஒழுகுதல், எச்சில் ஊறுதல் ஏற்படலாம்.

முதல் உதவி: 1. விழுங்கிவிட்டால் தொண்டைக்குள் விரல் விட்டு வாந்தி பண்ண வையுங்கள். வெளிவரும் வாந்தி தெளிவாகும் வரை திரும்பத் திரும்பச் செய்யவும். நோயாளி நினைவிழந்த நிலையில் இருந்தால் வாந்தி பண்ண வைக்காதீர்கள். 2. உடைகளிலும், சருமத்திலும் மருந்து பட்டுவிட்டால், உடைகளைக் கழற்றி மருந்துபட்ட சருமத்தின் மீது நிறையத் தண்ணீர் விட்டு சோப்பு போட்டு கழுவவும். 3. கண்களில் பட்டுவிட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு உப்புநீர்/நன்னீர் நிறைய தெளித்து கண்களை அலம்பவும். 4. மருந்தை சுவாசித்து விட்டால், நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும்.

தாவர நச்சு: பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தினால் செடிகளுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படாது.

விஷ முறிவு: 1. நோயாளிக்கு உடனே அட்ரோபைன் கொடுக்கவும். 5 முதல் 10 நிமிட இடைவெளி விட்டு, 2 முதல் 4 மிகி அட்ரோபைன் சல்பேட் திரும்பத் திரும்ப நரம்பு ஊசி மூலம் செலுத்தவும். நாள் ஒன்றுக்கு குறைந்தது 25 முதல் 50 மிகி வரை அட்ரோபைன் தேவைப்படலாம். அறிகுறிகள் தொடருமானால் திரும்பவும் அட்ரோபைன் தரவேண்டியிருக்கும். எச்சில் ஊறும் அளவைப் பொறுத்து டோஸ் தீர்மானிக்கலாம். 2. 10 மிலி டிஸ்டில்டு வாட்டரில் 1-2 கிராம் 2 பிஏஎம் கரைத்து நரம்பு ஊசி வழியாக 10-15 நிமிடங்களுக்கு மிக மெதுவாகச் செலுத்தவும்.

பெட்டிகளை அப்புறப்படுத்துவது: காலிட டப்பாக்களையும், மீதி பூச்சிமருந்தையும், கழுவிய நீரையும் சுற்றுச்சூழலும், தண்ணீரும் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், மற்றும் பயன்படுத்துவோரின் கடமையாகும். 2. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக்கூடாது. 3. காலி டப்பாக்களை சிதைத்து மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விடவேண்டும்.

எடுத்து வைக்க யோசனைகள்: 1. பூச்சிமருந்து உள்ள பேக்கெட்டுகளை தனி அறைகளில் அல்லது வளாகங்களில், மற்ற பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் உள்ள இடங்களில், வைக்கவும். அல்லது பூச்சிமருந்தின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்டி வைக்கவும். 2. பூச்சிமருந்தை வைப்பதற்கான அறை அல்லது வளாகம் நன்கு கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, காற்றோட்டத்துடன், நல்ல வெளிச்சமாக, போதிய அளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

குளோர்பைரிபாஸ் டெக். (அடிப்படை 94% எ/எ) :	21.50% எ/எ
குழம்புப் பொருள்: அனியானிக் (கால்சியம் அல்கைல் அரைல் சல்போனேட்) :	6.00% எ/எ
கரைப்பான் (நறுமணப்பொருள்) :	72.50% எ/எ
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

எச்சரிக்கை: லேபல் & பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை விட வேறு நோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது. பயன்படுத்திய பிறகு டப்பாக்களை பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அழித்து விடவும்.

ಎಗ್ಲೋರೋ

ಕ್ಲೋರ್ಪೈರಿಫೋಸ್ 20% ಇ.ಸಿ. (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇದೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಉದರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿಷಕಾರಕ ಪಸರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಕ್ಲೋರ್ಪೈರಿಫೋಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ***ಎಚ್ಚರಿಕೆ:*** ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಚರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳನಾಶಕದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಕಾರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ %)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀ.)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಟ್ಟಡಗಳು	(ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ)	1% ಎ.ಐ.	–	–	–
ಗೋಧಿ	3–4 ಮಿ.ಲೀ./ಕಿಲೋ ಬೀಜ	–	–	–	–
ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ	–	1% ಎ.ಐ.	–	–	–
ಮಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣೆ	–	–	–	–	–
ಎ – ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದ ಪ್ರದೇಶ					
ಸೇಬು	ಗಿಡಹೇನು	0.05%	3750–5000	1500–2000	–
ಬಾರ್ಲಿ	4–6 ಮಿ.ಲೀ./ಕಿಲೋ ಬೀಜ				
ಬಿ – ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ					
ಹುರುಳಿ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ, ಕಪ್ಪು ಕೀಟ	600	3000	500–1000	–
ಬದನೆ	ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	200	1000	500–1000	–
ಎಲೆಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಥ್	400	2000	500–1000	–
ಹತ್ತಿ	ಗಿಡಹೇನು, ದುಂಡುಹುಳು, ಬಿಳಿ ನೊಣ	250	1250	500–1000	–
	ಕಟ್ ವರ್ಮ್	750	3750	500–1000	–
ಬೇಳೆ	15–30 ಮಿ.ಲೀ./ಕಿಲೋ ಬೀಜ				
ಈರುಳ್ಳಿ	ರೂಟ್ ಗ್ರಬ್	1000	5000	500–1000	–
ಭತ್ತ	ಹಿಸ್ಪಾ	250	1250	500–1000	–
	ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟ	375	1875	500–1000	–
	ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ವ್ಹೋಲ್ ಮಗ್ಗೆಟ್	250	1250	500–1000	–
ಕಬ್ಬು	6.25 ಲೀ.ಹೆಕ್ಟೇರ್	–	–	–	–
ಗೆದ್ದಲು ನಿಯಂತ್ರಣ					
ಗೋಧಿ	2–3 ಲೀ.ಹೆಕ್ಟೇರ್	–	–	–	–

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಿಡರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣ: ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ASPEE-HTP ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಮಯ:– ಸಿಐಬಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಕಣಗಳು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಳಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನುಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ವರ್ಟಿಗೋ, ವಾಕರಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಸಕಾಗುವುದು, ಅತಿಸಾರ, ಮೂರ್ಛೆ, ಬೆವರುವುದು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೋರುವುದು, ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಒಂದು ವೇಳೆ ತ್ವಚೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ತ್ವಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕಣ್ಣು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 4. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಹೇಳಿಕೆ: 1. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟ್ರೋಪೈನ್ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಆಟ್ರೋಪೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿರಿ. ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 50 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಆಟ್ರೋಪೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟ್ರೋಪೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಡೋಸೇಜ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜೊಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 2. 10 ಮಿ.ಲೀ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1–2 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು 2 ಪಿಎಎಂ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು/ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರ್ಪೈರಿಫೋಸ್ ಟೆಕ್. (94% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಆಧರಿತ) :	21.50% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಮುಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಅನಿಯಾನಿಕ್ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್), ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ (ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿಈಥಲೀನ್ ಈಥರ್) :	6.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಅರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್) :	72.50% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.

এগলোরো

ক্লোরপাইরিফস 20% ই.সি. (কীটনাশক)

এটি ক্লোরপাইরিফস প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি যোগাযোগ এবং পাকস্থলীতে কার্যকর বিষাক্ত দ্রবণীয় কনসেনট্রেট ফর্মুলেশন। ***সতর্কতা:*** জলজ জীব এর জন্য বিষাক্ত তাই জলাশয়, মাছ চাষ হয়েছে এমন জলাশয় বা পিসিকালচার হয়েছে এমন এলাকার কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়। মৌমাছির জন্য বিষাক্ত। অতএব, মৌমাছি সক্রিয় রয়েছে এমন স্থানে বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। পণ্যটি পাখিদের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত তাই পাখির আবাসস্থলের কাছাকাছি ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

অনুমোদনঃ

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা এ. আই. (গ্রাম %)	গঠন (মি.লি)	জলের পরিমাণ (লি.)	শেষ ছেটানোর সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)
বাড়ি	(নির্মাণের আগে এবং পরবর্তী উপচার)	1% এ.আই	-	-	-
গম	3-4 মিলি/কেজি বীজ	-	-	-	-
বন		1% এ.আই	-	-	-
মাটি উপচার	-	-	-	-	-
A- ফসল নেই এমন এলাকা					
আপেল	এফিড	0.05%	3750-5000	1500-2000	-
যব	4-6 মিলি/কেজি বীজ	-	-	-	-
B- ফসল যুক্ত এলাকা					
মটরশুটি	পড বোরার, ব্ল্যাক বাগ	600	3000	500-1000	-
বেগুন	অঙ্কুর এবং ফল ছিদ্রকারী	200	1000	500-1000	-
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাকমাথ	400	2000	500-1000	-
তুলা	এফিড, বলওয়ার্ম, হোয়াইট ফ্লাই	250	1250	500-1000	-
	কাটা কৃমি	750	3750	500-1000	-
ছোলা	15-30 মিলি/কেজি বীজ	-	-	-	-
পেঁয়াজ	রুট গ্রাব	1000	5000	500-1000	-
ধান	হিস্পা	250	1250	500-1000	-
	পাতার রোলার	375	1875	500-1000	-
	গ্যাল মিজ, স্টেম বোরার, হোর্ল ম্যাগট	250	1250	500-1000	-
আখ	6.25 লিটার/হেক্টর	-	-	-	-
উইপোকা নিয়ন্ত্রণ					
গম	2-3 লিটার/হেক্টর	-	-	-	-

ব্যবহারের দিকনির্দেশ: ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার এবং ASPEE-HTP পাওয়ার স্প্রেয়ার।

ব্যবহারের সময়ঃ- বিস্তারিত জানার জন্য CIB-এর নির্দেশিকা দেখুন।

ব্যবহারকারীদের সতর্কতা: 1. খাদ্যসামগ্রী, খাদ্য সামগ্রীর খালি পাত্র এবং পশু চারা থেকে দূর রাখবেন। 2. মুখ, চোখ এবং ত্বকের সম্পর্ক থেকে এড়িয়ে চলুন। 3. ছত্রাকনাশক শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ না করে সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন, সর্বদা হাওয়ার দিকে ব্যবহার করিবেন। 4. ব্যবহারের সময় খাওয়া, পানীয় বস্তু, ধূম্রপান, অথবা চিবোনো কিছু করবেন না। 5. স্প্রে করার পরে সংক্রমিত জামাকাপড় এবং শরীরের অংশকে ভালোভাবে ধুয়ে দিন। 6. ব্যবহার করার সময় নিরাপত্তামূলক পোষাক ব্যবহার করবেন।

বিষক্রিয়া লক্ষণ: মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, ভার্টিগো, বমি বমি ভাব, ঝাপসা দৃষ্টি, ডায়রিয়া, খিঁচুনি, ঘাম, অত্যধিক ল্যাক্রিমেশন এবং লালা ঝরা হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: 1. গিলে ফেললে গলার ভেতরে সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করিয়ে দিন। অচেতন মানুষের মুখে কিছু দেবেন না। বমি করানোর চেষ্টা করাবেন না। 2. দূষিত চামড়া এবং পোষাককে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবেন। 3. ছিটানোর পরে চোখে ভালো ভাবে 10-15 মিনিট থেকে জলের দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন। 4. রোগীর নিশ্বাসের সাথে চলে গেলে, সাথে সাথে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে আসুন।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তা: প্রস্তাবিত মাত্রায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়তা হয় না।

প্রতিষেধক: 1. রোগীকে দ্রুত অ্যাট্রোপিন প্রয়োগ করুন এবং এর পর 2-4 মিগ্রা মাত্রায় 5 থেকে 10 মিনিটের ব্যবধানে শিরার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করুন। এক দিনে অ্যাট্রোপিন সালফেটের সর্বাধিক 25 থেকে 50 মিগ্রা মাত্রা প্রয়োজন হতে পারে। অ্যাট্রোপিন সালফেটের অতিরিক্ত মাত্রা লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অ্যাট্রোপিনের কি মাত্রা দিতে হবে তাঁর জন্য মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লালা একটি লাভজনক উপায়। 2. 1 থেকে 2 গ্রাম 2 পি.এ.এম 10 মিলি পাতিত জলে মিশিয়ে অন্তশিরা পথে খুবই ধীরে ধীরে 10-15 মিনিট ধরে দেওয়া উচিত।

খালি পাত্র বিনষ্ট করণ: 1. এটি কীটনাশক নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে খালি পাত্র বা প্যাকেটের বিনষ্টকরন যাতে সুসংবদ্ধ ভাবে করা যায় তা নিশ্চিত করা। এর থেকে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরী। 2. পুনর্ব্যবহার এড়াতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. প্যাকেজগুলি ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সংরক্ষণের ব্যবস্থা: 1. কীটনাশক ভরা প্যাকেজগুলি অন্য বস্তু বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত ঘর বা বাড়ি থেকে দূরে আলাদা ঘর বা বাড়িতে রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। 2. কীটনাশক মজুত করার নিমিত্ত ঘর বা বাড়ি হবে সুনির্মিত, সুআলোকিত, শুকনো, বাতাস চলাচলের উপযুক্ত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে যথেষ্ট পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক গঠন:

ক্লোরপাইরিফস টেক. (94% ডবলু/ডবলু এর উপর ভিত্তি করে) :	21.50% ডবলু/ডবলু
ইমালসিফায়ার বা দ্রাবক: অ্যানিওনিক (ক্যালসিয়াম অ্যালকাইল আরিল সালফোনেট) ননঅ্যানিওনিক (পলি অক্সিথিলিন ইথার) :	6.00% ডবলু/ডবলু
দ্রাবক (এরোম্যাক্স) :	72.50% ডবলু/ডবলু
মোট:	**100.00% ডবলু/ডবলু**

সতর্কতামূলক বিবৃতি: এই লেবেল/পুস্তিকায় নির্দেশিত ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না। খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক। লিফলেটে নির্দেশিত পদ্ধতিতে পাত্র ব্যবহারের পর নষ্ট করুন।

അഗ്ലോറോ

ക്ലോർപൈറിഫോസ് 20% ഇസി (പ്രാണിനാശിനി)

ഇത് ക്ലോർപൈറിഫോസ് ടെക്നിക്കലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിഷകരമായ സമ്പർക്ക ഉദര പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള കുഴമ്പുരൂപത്തിലാക്കാവുന്ന ഒരു സാന്ദ്രീകരണമാണ്. *മുന്നറിയിപ്പ്: ജലജീവികൾക്ക് വിഷകരമാണ്, അതിനാൽ ജലാശയങ്ങൾക്കും ജലകൃഷി അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നതിനു സമീപവും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷകരമാണ്, തേനീച്ചകൾ ആഹാരം തേടുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഉല്പന്നം പക്ഷികൾക്ക് അത്യന്തം വിഷകരമാണ് അതിനാൽ പക്ഷികൾ പാർക്കുന്നതിനു സമീപത്തുള്ള ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം.

ശുപാർശ:

വിള(കൾ)	കീടത്തിന്റെ പൊതുവായ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ AI (ഗ്രാം %)	രൂപീകരണം (മില്ലി)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന തളിക്കലിനും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിൽ കാത്തിരുപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസങ്ങളിൽ)
കെട്ടിടങ്ങൾ	*(നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഉപചരിക്കൽ)*	1% a.i.	—	—	—
ഗോതമ്പ്	*3 - 4 മില്ലി/കിഗ്രാം വിത്ത്*	—	—	—	—
വനനൽക്കരണം	—	1% a.i.	—	—	—
മണ്ണ് ഉപചരിക്കൽ	—	—	—	—	—
എ - കൃഷിചെയ്യാത്ത സ്ഥലം					
ആപ്പിൾ	*മുഞ്ഞ*	0.05%	3750 - 5000	1500 - 2000	—
ബാർലി	*4 - 6 മില്ലി/കിഗ്രാം വിത്ത്*				
ബി- കൃഷിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം					
ബീൻസ്	*തൊണ്ടു തുരപ്പൻ, കറുത്ത മൂട്ട*	600	3000	500 - 1000	—
വഴുതന	*നാമ്പ് & കായ തുരപ്പൻ*	200	1000	500 - 1000	—
കാബേജ്	*ഡയമണ്ട് ബാക്ക് ശലഭം*	400	2000	500 - 1000	—
പരുത്തി	*മുഞ്ഞ, കായപ്പുഴു, വെള്ളീച്ച*	250	1250	500 - 1000	—
	മുറി പുഴു	750	3750	500 - 1000	—
പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ	*15 - 30 മില്ലി/കിഗ്രാം വിത്ത്*				
സവാള	*വേരിലെ പുഴു*	1000	5000	500 - 1000	—
നെല്ല്	*കാരവണ്ട്*	250	1250	500 - 1000	—
	ഇല ചുരുട്ടി	375	1875	500 - 1000	—
	ഗാൾ മശകം, തണ്ടു തുരപ്പൻ, വോൾ പുഴു	250	1250	500 - 1000	—
കരിമ്പ്	*6.25 ലി/ഹെ*	—	—	—	—
ചിതൽ നിയന്ത്രണം					
ഗോതമ്പ്	*2 - 3 ലി/ഹെ*	—	—	—	—

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം: സ.സം. ഉപകരണം: നാപ്സാക് സ്പ്രേ, ഫൂട്ട് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് ബാറ്ററി സ്പ്രേയർ, ASPEE-HTP പവർ സ്പ്രേയർ.

പ്രയോഗ സമയം:

മുൻകരുതലുകൾ: 1. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തു കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റി വയ്ക്കുക. 2. വായയിലും കണ്ണുകളിലും ചർമ്മത്തിലും പുരളുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുക. 4. സ്പ്രേ ചെയ്തതിനു ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീര ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 5. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുക വലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുകയോ തിന്നുകയോ പുകയില ചവയ്ക്കുകയോ അരുത്. 6. മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: തലവേദന, തലചുറ്റൽ, തലകറക്കം, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, കാഴ്ച മങ്ങൽ, വയറിളക്കം, കോച്ചൽ, വിയർക്കൽ, ധാരാളം കണ്ണുനീരും ഉമിനീരും വരിക എന്നിവ സംഭവിച്ചേക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: 1. വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ, തൊണ്ടയുടെ പിന്നിൽ ഇക്കിളിയാക്കി ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഛർദ്ദി തെളിഞ്ഞത് ആകുന്നതു വരെ ഇത് ആവർത്തിക്കുക. രോഗി അബോധാവസ്ഥയിൽ ആണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. 2. വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും മലിനമായെങ്കിൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് മലിനമായ ചർമ്മം ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. 3. കണ്ണുകൾ മലിനമായെങ്കിൽ, ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ധാരാളം ഉപ്പു വെള്ളം/ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.4. ശ്വസിച്ചെങ്കിൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റുക.

സസ്യവിഷത്വം: വയലിനുള്ള ശുപാർശകൾ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉല്പന്നം സസ്യവിഷത്വമുള്ളതല്ല.

മറുമരുന്ന്: 1. ഉടൻ തന്നെ രോഗിയെ അട്രോപിനൈസ് ചെയ്യുകയും 5 മുതൽ 10 മിനിട്ട് ഇടവേളയിൽ ഞരമ്പിലൂടെ അട്രോപിനെ സൽഫേറ്റിന്റെ 2 മുതൽ 4 മിഗ്രാം ഡോസുകൾ ആവർത്തിച്ച് നൽകി പൂർണ്ണ അട്രോപിനൈസേഷൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം 25 മുതൽ 50 മിഗ്രാം വരെ അട്രോപൈൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നോ എന്നു നോക്കിയാണ് അട്രോപൈൻ നൽകൽ തുടരണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഡോസ് ക്രമീകരണത്തിന് ഉമിനീരിന്റെ തോത് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു മാദണ്ഡമാണ്. 2. 1 - 2 ഗ്രാം 2 PAM 10 മില്ലി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ഞരമ്പിലൂടെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ 10 - 15 മിനിട്ട് നേരം കുത്തിവയ്ക്കുക.

ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കൽ: 1. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകുന്നത് തടയുന്ന വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി പായ്ക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും മെഷീനുകൾ കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർമ്മാതാക്കളുടെയും രൂപീകരണക്കാരുടെയും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ചുമതലയായിരിക്കും. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പായ്ക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് അവ പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. പായ്ക്കറ്റുകൾ തകർത്ത് ആൾപ്പാർപ്പുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം.

സ്റ്റോറേജ് വ്യവസ്ഥകൾ: 1. പ്രാണിനാശിനികളുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കീടനാശിനികൾ അടങ്ങുന്ന പായ്ക്കറ്റുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായി പ്രത്യേകം മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അലമാരകളിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2. പ്രാണിനാശിനികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങൾ കളനാശിനിയിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി കലരുന്നതുമൂലമുള്ള മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പര്യാപ്തമായ അളവുകളുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസ സംയോജനം:

ക്ലോർപൈറിഫോസ് ടെക്ക്. (94% ഭാ/ഭാ യെ അടിസ്ഥാനമാക്കി):	21.50% ഭാ/ഭാ
ഇമൽസിഫയർ: അനിയോണിക് (കാത്സ്യം ആൽകൈൽ അരൈൽ സൽഫൊണേറ്റ്) നോൺഅയോണിക് (പോളി ഓക്സിഇതിലിൻ ഈഥർ):	6.00% ഭാ/ഭാ
സോൾവന്റ് (അരോമെക്സ്):	72.50% ഭാ/ഭാ
ആകെ:	**100% ഭാ/ഭാ**

മുന്നറിയിപ്പുകൾ: ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ മറ്റു വിളകളിന്മേൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.

ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക.

ایگلورو

کلورپائری پوز20% ای سی (دود کش)

یہ لگنے ہی اورپیٹ میں پہنچ کرکام کرنے والا ایک زہریلا املسی فیل کنسنٹریٹ فارمولیشن ہے جو کلورپائری پوزٹکنیکل پر مبنی ہے- ***احتیاط:*** یہ شہد کی مکھیوں کے لئے زہریلا ہے اس لئے جب مکھیاں پھول چوسنے میں سرگرم ہوں اس کا اسپرے نہ کریں- یہ شہد کی مکھیوں کے لئے بھی زہریلا ہے اس لئے جب مکھیاں پھول چوسنے میں سرگرم ہوں تواس کا استعمال نہ کریں- یہ پروڈکٹ چڑیوں کے لئے انتہائی زہریلا ہے اس لئے چڑیوں کے ٹھکانے کے پاس اس کا استعمال نہ کیا جائے-

سفارش:

فصل	بیماری کے عام نام	خوراک/ہکٹر اے آئی (gm %)	محلول (ml)	پانی میں گھول (ltr.)	انتظار کی مدت آخری چھڑکاؤ سے کٹائی تک (دنوں میں)
عمارات	(تعمیر سے قبل اور تعمیر سے بعد کا معالجہ)	1% فعل مادہ	-	-	-
گیہوں	4-3 ملی لیٹر/ کیلوگرام بیج				
جنگل لگانا	-	1% فعل مادہ	-	-	-
مٹی کا معالجہ	-	-	-	-	-
اے- غیرفصلی ایریا					
سیب	رس چوس	0.05%	3750-5000	1500-2000	-
جو	بی – فصلی ایریا				
بینز	پھلی چھیدنے والے اورکالے کیڑے	600	3000	500-1000	-
بیگن	جڑاورپھل چھیدنے والے	200	1000	500-1000	-
پھول گوبھی	ہیرے جیسی پیٹھ والے ٹڈّے	400	2000	500-1000	-
کپاس	رس چوس، سنڈی اور سفید سکھی	250	1250	500-1000	-
	چھوٹے پودوں کو کاٹنے والا کیڑا	750	3750	500-1000	-
چنا	15-30 ملی لیٹر/ کیلوگرام بیج				
پیاز	جڑ کاٹنے والا	1000	5000	500-1000	-
دھان	ہسپا	250	1250	500-1000	
	پتی موڑنے والا	375	1875	500-1000	
	گال مکھی، تنا چھیدنے والے، وہول میگٹ	250	1250	500-1000	
گنا	6.25 لیٹر فی ہکٹر	-	-	-	-
دیمک کا کنٹرول					
گیہوں	2-3 لیٹر فی ہکٹر	-	-	-	-

ترکیب استعمال: اسپرے کے آلات : نیپ سیک اسپریئر، فٹ اسپریئر، کمپریشن نیپ سیک اسپریئر، کمپریشن نیپ سیک بیٹری اسپریئر، اے ایس پی ای ای – ایچ ٹی پی پاور اسپریئر-

استعمال کا وقت: - سی آئی بی کی ہدایت کے مطابق رابطہ کریں-

احتیاط: -1 اسےکھانےپینےکی چیزوں، خالی برتن اورجانوروں کےچارے سےدوررکھیں- -2 اسےمنہ، آنکھ اور جلد پرنہ لگنےدیں- -3 اسپرے کی بھاپ کونگلنےسےبچیں- اورہوا کے رخ کی طرف چھڑکاؤکریں- -4 اسپرے کےبعد آلودہ کپڑوں اورجسم کواچھی طرح دھوئیں- -5 اسپرےکرتےوقت سگریٹ نوشی، کھانے پینےاورکسی چیزکوچبانے سے بچیں- -6 اسپرے کرتےوقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں-

زہرکی علامات: اس کی علامات ہیں: سر درد، چکر، متلی، قئی، آنکھوں میں دھندلاپن، دست، تشنج، زیادہ پسینہ آنا، زیادہ آنسوبہنا اوررال ٹپکنا-

ابتدائی علاج: -1 اگرنگل لیا ہوتوگلے کے پیچھےگدگدی کرکےقئی کرائیں- یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ سارامادہ خارج نہ ہوجائے- اگرمریض بیہوش ہوجائے تو اسے قئی نہ کرائیں- -2 اگر کپڑے اور جلد پرلگ جائےتوآلودہ کپڑےاتاردیں اورجلد کوصابن اورپانی سےاچھی طرح دھوئیں- -3 اگرآنکھوں میں لگ جائےتوان کوسیلائن یا صاف پانی سےلگ بھگ 10 سے15 منٹ تک اچھی طرح دھوئیں- -4 اگرنگل لیاہوتومریض کوتازہ ہوامیں لےجائیں-

پودوں کی سمیت: اگر سفارش کردہ مقدار میں استعمال کی جائے تواس میں کسی قسم کی سمیت نہیں ہے-

تریاق: -1 مریض کو فورا اٹروپین دیں- اٹروپین سلفیٹ کی 2 سے 4 ملی گرام خوراک ہر5 سے 10 منٹ کے وقفے سے رگ میں انجکٹ کرتے رہیں- ایک د ن میں 25 سے 50 ملی گرام اٹروپین کی ضرورت پڑ سکتی ہے- اگرعلامات برقراررہتی ہیں تواس سے بھی زیادہ اٹروپین کی ضرورت پڑسکتی ہے- لعاب کی مقدارخوراک کے تعین میں مددگار ثابت ہوتی ہے- -2 پی اے ایم کی 2-1 گرام 10 ملی لیٹرنتھارے ہوئے پانی میں گھولیں اور بہراسےآہستہ آہستہ رگ میں 10 سے 15 منٹ تک انجکٹ کریں-

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا: -1 یہ دودکش بنانےوالوں اوراستعمال کرنےوالوں کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ خالی ڈبوں اور زائد مواد کواس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اورپانی آلودہ نہ ہو- -2 ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کریں- -3 خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں-

اسٹور کرنے کا طریقہ: -1 دودکش کےڈبوں کوالگ کمرے یا الگ عمارت میں رکھا جائے، ان جگہوں سےدورجہاں دیگرساما ن خاص طورسےکھانے پینےکےسامان رکھےجاتےہیں یا اس دودکش کی مقدار اورکیفیت کےمد نظرانہیں الگ الماری میں تالےچابی کےساتھ رکھا جائے- -2 دودکش کورکھا جانے والا کمرہ یاعمارت کشادہ اورروشن داروالاہونا چاہئےتاکہ اس کی بھاپ کمرے سےنکل جائے-

اجزائے ترکیبی:

کلورپائرپیوزٹکنیکل (94% ڈبلو/ ڈبلوپر مبنی) :	21.50% ڈبلو/ڈبلو
املسی فئر: اینیونک (کیلشیم الکائل ایرائل سلونیٹ) نونیونک (پولی آکسی تھلین ایتھر) :	6.00% ڈبلو/ڈبلو
سولونٹ (ایرومیکس) :	72.50% ڈبلو/ڈبلو
ٹوٹل:	**100.00% ڈبلو/ ڈبلو**

حفاظتی اقدامات: صرف پرچی اور لیبل میں مذکور فصلوں اورکیڑوں مکوڑوں پر ہی اسےاستعمال کیا جائے- خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے- استعمال کے بعد پرچی میں مذکورہدایت کے مطابق ڈبوں کو ضائع کردیا جائے-