ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಮ್ 25% WG
(ಕೀಟನಾಶಕ)

థియామెథోక్సామ్ 25% WG
(పురుగుల మందు)

தியாமெதோக்சாம் 25% WG
(பூச்சிக்கொல்லி)

थायामेथोक्झॅम 25% WG
(कीटकनाशक)

थायामेथोक्झॅम 25% WG हे विस्तृत स्पेक्ट्रम सिस्टमिक कीटकनाशक आहे ज्यामध्ये जलद पोट आणि संपर्क क्रिया आहे आणि हे तुंड बोरर, गॉल मिड्ज, पान फोल्डर, ब्राऊन प्लांट होपर (BHP), वाईट बॅकड प्लांट होपर (WBPH), ग्रीन लीफ होपर (GLH), थ्रिप्स इत्यादींच्या नियंत्रणासाठी वापरण्यासाठी शिफारस केले जाते. भातात; कापूसमध्ये जासिड्स, अफिड्स आणि व्हाइटफ्लाय; आंब्यात होपर; गहू मध्ये अफिड्स; मोहरी मध्ये अफिड्स; टोमॅटो मध्ये व्हाइटफ्लाय; वांगी मध्ये व्हाइटफ्लाय, जासिड्स; चहा मध्ये मच्छर बग, बटाट्यात अफिड्स, सायला सिट्रस मध्ये, जिरे मध्ये अफिड्स, भातात मातीचा ड्रेनेश, जिरे मध्ये अफिड्स आणि GLH थ्रिप्स आणि भातात शॉर्ट मॅगट (नर्सरी). या उत्पादनाच्या 1 किलो मध्ये 250 ग्रॅम थायामेथोक्झॅम सक्रिय घटक म्हणून असते (w/w).

रासायनिक संरचना:

नाही.	घटक	वर्णन	वजन
1.	थायामेथोक्सम a.i.		25.00 % w/w
2.	विखुरणारे एजंट -सोडियम लिग्नोसल्फेट		5.00 % w/w
3.	ओले करणारे एजंट सोडियम लॉरील सल्फेट		3.75 % w/w
4.	प्लॅस्टिकायझर- ब्युटिलेटेड पॉलीव्हिनिल पायरोलिडोइन		1.25 % w/w
5.	वाहक डायटोमेशियस पृथ्वी		5.00 % w/w
6.	बाईंडर कॉर्न स्टार्च		पुरेशी मात्रा % वजन/वजन
		एकूण	100 % w/w

शिफारस:

पिके	कीटकांचे सामान्य नाव	डोस/हे AI (gm)	डोस/हे फॉर्म्युलेशन (gm)	पाण्यात पातळ करणे (लिटर.)	शेवटच्या तुरीपासून काढणीपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
वांगी	व्हाईटफ्लाय, जस्सीड्स	50	200	500	3
मोसंबी	सायला	25	100	1000	20
	सायला (डायफोर्निया सिट्री)	25	100	1000	20
कापूस	जॅसिड्स, ऍफिड्स	25	100	500-750	21
	(पहिली फवारणी 25-30 DAS वर किंवा पहिली कीड दिसण्याच्या वेळी करा आणि 2-3 फवारण्या 15 दिवसांच्या अंतराने किडीच्या तीव्रतेनुसार करा)				
	पांढरी माशी	50	200	500-750	21
जिरे	ऍफिड	25	100	500	15
पर्णासंबंधी अर्ज	(सुरुवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या पातळीनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने 1-2 फवारण्या करा. तीव्रता)				
पर्णासंबंधी अर्ज	(सुरुवातीला कीटक दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या पातळीनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा तीव्रता)				
आंबा	हॉपर्स	25	100	1000	30
	(सुरुवातीला कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा.)				
मोहरी	ऍफिड	12.5-25.0	50-100	500-1000	21
	रेपसीड (सुरुवातीला कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा)				
भेंडी	जॅसिड्स, ऍफिड्स	25	100	500-1000	5
	(सुरुवातीला कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा.)				
	जस्सीद, ऍफिड, थ्रिप्स पांढरी माशी	25	100	500-1000	5
बटाटा	ऍफिड्स (मायझस पर्सिका)	25	100	500	77
	ऍफिड्स (मायझस पर्सिका)	25(पानांवर फवारणी) 50 (माती भिजवणे)	100(पानांवर फवारणी) 200 (माती भिजवणे)	500	77
तांदूळ	स्टेम बोअरर, गॅल मिज, लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हॉपर (बीपीएच), व्हाइट बॅक, ब्राऊन प्लांट हॉपर (बीपीएच) व्हाइट बॅक, प्लांट, हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), ग्रीन लीफहॉपर, थ्रीप्स	-	100	500-750	14
	लीफ फोल्डर				
	तपकिरी वनस्पती हॉपर (BPH), पांढरा समर्थित				
	उशीरा भात किडींचे नियंत्रण जसे की GLH, BPH, WBPH इ.				
	स्टेम बोरर, गॅल मिज आणि इतर फवारणी पानांच्या बुटण्याच्या टप्प्यावर (@ 50 ते 55 DAT) साठी				
	स्टेम बोअरर, गॅल मिज, लीफ फोल्डर, ब्राऊन प्लांट हॉपर (बीपीएच), व्हाईट बॅक्ड प्लांट हॉपर (डब्ल्यूबीपीएच), ग्रीन लीफहॉपर, थ्रिप्स	25	100	500-750	14
	प्लांट हॉपर (WBPH), ग्रीन लीफहॉपर, थ्रीप्स				
	पिकाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत 25-30 DAT ची एक फवारणी लवकर भात किडींच्या नियंत्रणासाठी करा.				
तांदूळ (नर्सरी)	व्हर्ट मॅगॉट	500	2000	250मि.ली./ग्रॅम	86
तांदूळ (मातीनेह)	GLF थ्रिप्स				
माती - भिजवणे	ऍफिड्स	50	200	400-500	77
	(पीक हंगामात एकदा माती भिजत असताना कीटक दिसण्यापूर्वी रूट झोन लावा)				
चहा	डासांचा बग, हेलोपेल्टिस थिव्होरा	25	100	400-500	7
	(प्रारंभिक कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि कीड तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५-२१ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा.)				
टोमॅटो	पांढरी माशी	50	200	500	5
टोमॅटो (माती भिजवणे)	पांढरी माशी	100	400	500	5
गहू	ऍफिड्स	12.5	50	500	21
	(सुरुवातीला कीड दिसल्यावर पहिली फवारणी करा आणि किडीच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा.)				

वापरण्याच्या सूचना: उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजून ती थोड्या प्रमाणात पाण्यात नीट मिसळा. योग्य स्प्रेयरसह पिकांचे एकूण संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्ण हलवून, उर्वरित पाण्याची मात्रा निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे जोडा.

पी.पी. उपकरणे: नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कंप्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कंप्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर, बॅटरी ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर आणि ASPPE-HTP पॉवर स्प्रेयर.

लागवडीचा काळ:

1. आंबा: होप्पर (प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन स्प्रे पुन्हा करा).
2. बटाटा: पर्ण-लागवड - प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने 2-3 स्प्रे पुन्हा करा. माती भिजवणे - कीड दिसण्यापूर्वी मुळाच्या भागात माती भिजवा, पिकांच्या हंगामात एकदा.
3. कापूस: 25-30 DAS मध्ये पहिला स्प्रे करा किंवा प्रथम कीड दिसल्यावर स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने 2-3 स्प्रे पुन्हा करा.
4. गहू: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन स्प्रे पुन्हा करा.
5. चहा: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15-21 दिवसांच्या अंतराने 2-3 स्प्रे पुन्हा करा.
6. टोमॅटो: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने 2-3 स्प्रे पुन्हा करा. माती भिजवणे: कीड दिसण्यापूर्वी मुळाच्या भागात माती भिजवा, पिकांच्या हंगामात एकदा.
7. तांदूळ: पिकाच्या प्रारंभिक टप्प्यात 25-30 DAT मध्ये एक स्प्रे करा आणि लवकर तांदूळ कीड नियंत्रणासाठी स्टेम बोरर, गॉल मिड्ज आणि बूटिंग पानांच्या टप्प्यावर (@ 50 ते 55 DAT) लवकर तांदूळ कीड नियंत्रणासाठी दुसरा स्प्रे करा.
8. वांगी: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 10-15 दिवसांच्या अंतराने 2-3 स्प्रे पुन्हा करा.
9. भेंडी: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन स्प्रे पुन्हा करा.
10. मोहरी: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15 दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन स्प्रे पुन्हा करा.
11. संत्री: प्रथम कीड दिसल्यावर पहिला स्प्रे करा आणि कीडांच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार 15-21 दिवसांच्या अंतराने 2-3 स्प्रे पुन्हा करा.

सावधगिरी:

1. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थ कंटेनर आणि प्राण्यांचे अन्न यांच्यापासून दूर ठेवा.
2. तोंड, डोळे आणि त्वचेसोबत संपर्क टाळा.
3. स्प्रे मिस्टच्या श्वास घेतल्याने टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने स्प्रे करा.
4. स्प्रे केल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग नीट धुवा.
5. स्प्रे करताना धूम्रपान, पिणे, खाणे आणि काहीही चघळणे टाळा.
6. मिक्सिंग करताना आणि स्प्रे करताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधेची लक्षणे: स्वत: ची चळवळ कमी होते, टोनिक कन्वल्शन, पीटोसीस होऊ शकतो.

प्रथमोपचार:

1. गिळल्यास, घशाच्या मागील भागाला गुदगुल्या करून उलटी करवा. उलटी साफ होईपर्यंत ती पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करणे टाळा.
2. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढा आणि दूषित त्वचेला विपुल प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा.
3. डोळे दूषित झाल्यास, सलाइन/शुद्ध पाण्याने 10 ते 15 मिनिटे धुवा.
4. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा.

फायटोटॉक्सिसिटी: सीआयबी मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्या.

प्रतिविष: कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरचे निपटारा:

1. पॅकेजेस किंवा जादा सामग्री आणि यंत्रसामग्री आणि कंटेनर धुण्यासाठी सुरक्षित पद्धतीने निपटारा करावा, जेणेकरून पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण टाळता येईल.
2. पुनर्वापर टाळण्यासाठी वापरलेल्या पॅकेजेस बाहेर ठेवू नका.
3. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरा.

साठवण स्थिती:

1. कीटकनाशक असलेले पॅकेज मूळ कंटेनरमध्ये किंवा इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्यांपासून किंवा परिसरांपासून दूर, स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा परिसरांमध्ये ठेवावे किंवा की आणि लॉक अंतर्गत स्वतंत्र अलमार्यांमध्ये ठेवावे.
2. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर सुस्थितीत असले पाहिजेत, कोरडे, चांगले प्रकाशित आणि वेंटिलेटेड आणि पुरेशा आकारमानाचे असले पाहिजेत.

सूचना: या लेबल/पत्रकावर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

থায়ামেথোক্সাম 25% WG
(কীটনাশক)

থায়ামেথোক্সাম 25% WG হল একটি বিস্তৃত স্পেকট্রাম সিস্টেমিক কীটনাশক যা দ্রুত পেট এবং যোগাযোগ কার্যকলাপ সহ এবং এটি স্টেম বোরার, গল মিজ, লিফ ফোল্ডার, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার (BHP), হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার (WBPH), গ্রীন লিফ হপার (GLH), থ্রিপ্স, ধান; কাপাসে জ্যাসিডস, এফিডস এবং হোয়াইটফ্লাইস; আমের হপারস; গমে এফিডস; সরিষায় এফিডস; টমেটোতে হোয়াইটফ্লাইস; বেগুনে হোয়াইটফ্লাইস, জ্যাসিডস; চায়ের মশার বাগ, আলুতে এফিডস, সাইট্রাসে সিল্লা, জিরায় এফিডস, ধানে মাটি ড্রেন, জিরায় এফিডস এবং GLH থ্রিপ্স, ধানে শার্ট ম্যাগট (নার্সারি) নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত। এই পণ্যের 1 কেজিতে সক্রিয় উপাদান হিসাবে 250 গ্রাম থায়ামেথোক্সাম রয়েছে (w/w)।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ:

না.	উপাদান	বর্ণনা	ওজন
1.	থায়ামেথক্সাম a.i.		25.00 % w/w
2.	বিচ্ছুরণকারী এজেন্ট - সোডিয়াম লিগনোসালফেট		5.00 % w/w
3.	ভেজানো এজেন্ট সোডিয়াম লরিল সালফেট		3.75 % w/w
4.	প্লাস্টিকাইজার- বুটাইলেটেড পলিভিনাইল পাইরোলিডোইন		1.25 % w/w
5.	বাহক ডায়াটোমেশিয়াস পৃথিবী		5.00 % w/w
6.	বাইন্ডার কর্ন স্টার্চ		পর্যাপ্ত পরিমাণ % ওজন/ওজন
		মোট	100 % w/w

সুপারিশ:

AgroStar®

CRUZER

Thiamethoxam 25% WG

(Insecticide)

क्रूज़र

थायोमेथोक्साम २५% डब्ल्यू. जी.,

(कीटनाशक)

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिए।

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सूचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Thiamethoxam 25% WG
(Insecticide)

Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BHP), while Backed Plant Hopper (BPH) Green Leaf Hopper (GLH) , Thrips, in rice; jassids, aphids and whiteflies in cotton; hoppers in mango; aphids in Wheat; aphids in Mustard; Whiteflies in Tomato; Whiteflies, Jassids in Brinjal; mosquito bug in Tea, aphids in Potato, Psylla in citrus, aphid in Cumin, soil drenesh in Rice, Aphid in Cumin and GLH thrips, shorl maggat in Rice (Nursary). It contains 250g Thiamethoxam as an active ingredient in a kg of the product (w/w).

Chemical Composition:

No.	Ingredient	Description	Weight
1.	Thiamethoxam a.i.		25.00 % w/w
2.	Dispersing Agent -sodium Lignosulphate		5.00 % w/w
3.	Weting Agent Sodium Lauryl Sulphate		3.75 % w/w
4.	Plasticiser- Butylated polyvinyl pyrrolidoine		1.25 % w/w
5.	Carrier Diatomaceous earth		5.00 % w/w
6.	Binder corn starch		QS % w/w
Total			100 % w/w

Recommendation:

Crops	Common Name of Pest	Dosages/Ha AI (gm)	Dosages/Ha Formulation (gm)	Dilution in water (ltr.)	Waiting Period Between last spray to Harvest (Days)
Brinjal	Whiteflies, Jassids	50	200	500	3
Citrus	Psylla	25	100	1000	20
	Psylla (Diaphornia citri)	25	100	1000	20
Cotton	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21
	(Apply first spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)				
	White flies	50	200	500-750	21
Cumin	Aphid	25	100	500	15
Foliar application	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 1-2 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)				
Foliar application	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)				
Mango	Hoppers	25	100	1000	30
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)				
Mustard	Aphid	12.5-25.0	50-100	500-1000	21
	Rapeseed(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)				
Okra	Jassids, Aphids	25	100	500-1000	5
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days intervaldepending on the pest intensity)				
	Jassid, Aphid, Thrips White flies	25	100	500-1000	5
Potato	Aphids (Myzus persicae)	25	100	500	77
	Aphids(Myzus persicae)	25 (foliar spray) 50 (Soil drench)	100 (foliar spray) 200 (Soil drench)	500	77
Rice	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper(BPH), White backed, Brown Plant Hopper (BPH)White backed, Plant Hopper (WBPH),Green leafhopper, Thrips	-	100	500-750	14
	Leaf Folder				
	Brown Plant Hopper (BPH),White backed				
	the control of late rice pests such as GLH,BPH,WBPH etc.				
	Stem Borer,Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for				
	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper(BPH),White backed Plant Hopper (WBPH),Green leafhopper, Thrips	25	100	500-750	14
	Plant Hopper (WBPH),Green leafhopper, Thrips				
	One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as.				
Rice (Nursery)	Whort maggot	500	2000	250ml/gm	86
Rice (Soildreneh)	GLF thrips				
Soil -drench	Aphids	50	200	400-500	77
	(Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season)				
Tea	Mosquito bug, Helopeltis theivora	25	100	400-500	7
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity)				
Tomato	Whiteflies	50	200	500	5
Tomato (soil drenching)	White flies	100	400	500	5
Wheat	Aphids	12.5	50	500	21
	(Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)				

Direction of Use: Measure out requred quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity ofwater as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. P.P. Equipment: - Knapsacksprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated kpowers prayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of Application:

1. Mango: Hoppers (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)
2. Potato: Foliar-application- Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity. Soil drench- Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season.
3. Cotton: Apply first spray at 25-30 Days or at the time offirst pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity.
4. Wheat: Apply first sprayduring initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity.
5.Tea: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity.
6. Tomato: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days intervaldepending on the level of pest intensity. Soil drench: Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season.
7. Rice: One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such asStem Borer, Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for the control of late rice pestssuch as GLH, BPH, WBPH etc.
8. Brinjal: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity.
9. Okra: Apply first spray during initial pest appearance and repeatone or two sprays at 15 days interval depending on the pest intensity.
10. Mustard: Apply first spray during initial pestappearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity.
11. Citrus: Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pestintensity.

Precautions:

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and partsof the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothingwhile mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:
Decrease spontaneous movement, tonic conulsion, ptosis may occur.

First Aid:

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induceVomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash theContaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/cleanwater for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: Please Refer CIB Guidelines

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

1. Packages or surplus materials and washing form machines and containers should be dispose of in a safe manner as toprevent environment and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packagesshall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. The package containing the insecticide should be stored in orignal containers inseparate rooms or premises away fromrooms or premises used for storing othe article particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lockand key.
2. The rooms or premises menat for storing the insecticide shall be built, dry,well lit and ventlated and ofsufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

थायामेथोक्साम 25 प्रतिशत डब्ल्यू जी
(कीटनाशक)

थायामेथोक्साम 25 डब्ल्यू जी एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पती टिडडा, सफेद पौधा टिडडा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा, कपास में माहू, तेला, सफेद मक्खी, आम में टिडडो, गेहूँ मे माहू, बैंगन मे सफेद मक्खी व तेला, सरसो मे माहू, टमाटर मे सफेद मक्खी, चाय में मच्छर कीट तथा आलू में माहू नीबू मे सिल्ला, भिन्डी में माँहू व तेला, टमाटर (भूमि उपचार) में सफेद मक्खी, जीरा में एफिड, धान (नर्सरी) में धान का हरा पत्ती फुदका, चुरदा, एवं भरल मैगट की रोकथाम के लिए किया जाता हैं। इसमे उत्पादन के प्रति किलो (व/व) में 250 ग्राम थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में किया जाता है।

रासायनिक संरचना :

क्रमांक	घटक	विवरण	वजन
1.	थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व		25.00 % w/w
2.	छितरानेवाले तत्व सोडियम लिग्नोसलफोनेट		5.00 % w/w
3.	गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल सल्फेट		3.75 % w/w
4.	प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन		1.25 % w/w
5.	संवाहक डायएटोओमेशिअस मिट्टी		5.00 % w/w
6.	बाईन्डर कॉर्न स्टार्च		पर्याप्त मात्रा % भार/भार
		कुल	100 % w/w

उपयोग:

फसल	किट का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो मे)
बैंगन	सफेद मक्खी, तेला	50	200	500	3
नीबू	सिल्ला	25	100	1000	20
	सिल्ला (डायफोर्निया सिट्री)	25	100	1000	20
कपास	माहू, तेला	25	100	500-750	21
	(पहली छिड़काव बुआई के 25-30 दिनो के बाद पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 2-3 छिड़काव 15 दिनो के अंतर से कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				
	सफेद मक्खी	50	200	500-750	21
जीरा	माहू	25	100	500	15
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				
आम	टिडडो	25	100	1000	30
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				
सरसों	माहू	12.5-25.0	50-100	500-1000	21
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				
भिंडी	माहो, तेला	25	100	500-1000	5
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनों के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर)				
	माहू, तेला	25	100	500-1000	5
आलू	माहू	25	100	500	77
	माहू	25(पत्तियों पर छिड़काव) 50 (मिट्टी को भिगोना)	100(पत्तियों पर छिड़काव) 200 (मिट्टी को भिगोना)	500	77
धान	तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा चुरदा				
	तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोडक भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा	25	100	500-750	14
धान नर्सरी	धान का गॉल मिज	500	2000	250मि. ली./ ग्राम	86
धान मृदा उपचार (डरेंथ बनाकर)	धान का हरा फुदका, चुरदा				
मिट्टी को भिगोने की तारीख	माहो	50	200	400-500	77
	कीटो के नजर आने से पहले, पौधो की जड़ की श्रेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें।				
चाय	चाय का मच्छर कीट	25	100	400-500	7
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				
टमाटर	सफेद मक्खी	50	200	500	5
टमाटर (भूमि उपचार)	सफेद मक्खी	100	400	500	5
गेहूँ	माहू	12.5	50	500	21
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर)				

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: उत्पाद का लिखित मात्रा लीजीए उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी चरह मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे कीजिए। निदिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए।

प्रयोग का समय:

1. आम- पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
2. आलू: पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर। भूमि उपचार कीटो के नजर आने से पहले, पौधो की जड़ की क्षेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें।
3. कपास पहली छिड़काव बुआई के 25-30 दिनो के बाद पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 2-3 छिड़काव 15 दिनो के अंतर से कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
4. गेहूँ- पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
5. चाय पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15-21 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
6. टमाटर पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर। भूमि उपचार कीटो के नजर आने से पहले, पौधो की जड़ की श्रेत्र को एक बार कीटनाशक से भिगो दें।
7. धानः रोपाई के 25-30 दिनों के बाद एक छिड़काव फसल पर आने वाले धान के शुरुआती कीटों जैसे कि तना छेदक, माजू मक्खी आदि की रोकथाम के लिए, तत्पश्चात रोपाई के 50-55 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव धान के फसल पर बाद की अवस्था पर आने वाले कीटों जैसे कि भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, आदि की रोकथाम के लिए, कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
8. बैंगन- पहली छिडकाव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 10-15 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
9. भिंडी - पत्ते पर छिड़काव पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
10. सरसों - पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15 दिनो के अंतर से 1-2 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।
11. नींबूः पहली छिड़काव पहली बार कीटो के नजर आने पर और उसके बाद 15-21 दिनो के अंतर से 2-3 छिड़काव कीटो की मौजूदगी के आधार पर।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. खाघसामग्री, खाघ सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये।
3. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करे।
4. छिडकाव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

विष के लक्षण: विष के लक्षण से सरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और टोसिस हे सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा:

1. यदि निगल जायें तो उल्टी न करायें या कोई पदार्थ मुहँ द्रवारा न दें।
2. यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्रवारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें
3. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाएं तो उनको उतार दें और तवचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
4. यदि आखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 तक धोएं।
5. यदि सासं द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्र हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता: सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. प्रर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण पचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनो की धोवन और खाली डिब्बो का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
2. पैकजो/डिब्बो को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।
3. उपयोग किए गए पैकजो/डिब्बो को बाहर न छोडे ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो।

संग्रहण की शर्ते:

1. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर फंफूदनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
2. जिस कमरे या अलमारी में फंफूदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

सावधान: इस लेबल/पर्ची में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।