English | Hindi | Marathi | Gujarati | Punjabi | Oriya | Assamese

English

HOTSURE®

HERBICIDE

SODIUM ACIFLUORFEN 16.5% + CLODINAFOP-PROPARGYL 8% EC

Sodium acifluorfen 16.5% + Clodinafop propargyl 8% EC is a selective post emergence herbicide used for the control of grassy and broad leaf weeds of Soybean, Black gram, Green gram and Groundnut.

CHEMICAL COMPOSITION:

Component		Content (% w/w)
Sodium acifluorfen active ingredient	:	16.50
Clodinafop-propargyl active ingredient	:	8.00
Mixed xylene	:	16.00
Blend of alcohol ethoxylated and alkyl phenol ethoxylate	:	18.25
Calcium dodecyl benzene sulphonate	:	0.75
Cyclohexanone	:	Q.S.
Total	:	**100.00**

RECOMMENDATIONS:

CROP	Target weeds	Dosage per ha			Waiting period from last spray to harvest (days)
		a.i (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (L)	
Soybean	**Grassy weeds:** Barn yard grass *(Echinochloa spp.)*, Crab grass *(Eleusine indica)*, Kangi grass *(Digitaria sanguinalis)*, Crow foot grass *(Dactyloctanium aegyptium)* **Broad leaf weeds:** Copper leaf *(Acalypha indica)*, Hazardana *(Phyllanthus niruri)*, Day flower *(Commelina benghalensis)*, False amaranth *(Digera arvensis)*, Cock's comb *(Celosia argentea)*, Dudhi *(Euphorbia spp.)*, Carrot grass *(Parthenium spp.)*, Papotan *(Physalis minima)*, Carpet weed *(Trianthema monogyna)*, Sticky cleome *(Cleome viscosa)*, Alligator weed *(Alternantheraphiloxeroides)*, Green amaranth *(Amaranthus spp.)*, Chickweed *(Stellaria media)*	165 + 80	1000	500	61
Black Gram	**Grassy weeds:** Barn yard grass *(Echinochloa colona)*, Crab grass *(Eleusine indica)* **Broad leaf weeds:** Hazardana *(Phyllanthus niruri)*, False amaranth *(Digera arvensis)*, Copper leaf *(Acalypha indica)*, Cocks comb *(Celosia argentea)*, Congress grass *(Parthenium hysterophorus)*	165 + 80	1000	500	54
Green Gram	**Grassy weeds:** Barn yard grass (Echinochloa colona), Crab grass (Eleusine indica), Crow foot grass (Dactyloctenium aegyptium) **Broad leaf weeds:** Day flower (Commelina benghalensis), Green amaranth (Amaranthus viridis), False amaranth (Digera arvensis), Trianthema monogyna	165 + 80	1000	500	54
Groundnut	**Grassy weeds:** Barn yard grass (Echinochloa colona), Crab grass (Eleusine indica), Kangi grass (Digitaria sanguinalis) **Broad leaf weeds:** Dudhi (Euphorbia geniculata), Hazardana (Phyllanthus niruri), False amaranth (Digera arvensis)	165 + 80	1000	500	54

WEATHER CONDITIONS: Not to be used during unfavorable conditions.

SOIL & WATER: Light to heavy soil. Clean water to be used for spray.

CROP STAGE FOR APPLICATION: Vegetative stage

APPLICATION TECHNIQUES: Spray.

EQUIPMENT TYPE: Knapsack sprayer.

NOZZLE TYPES: Flat Fan Nozzle

DOSAGE: Refer to the above recommendation.

INSTRUCTIONS FOR MIXING: Take the required quantity of Sodium acifluorfen 16.5% + Clodinafop propargyl 8% EC dilute with a small quantity of water and stir well using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again stirring.

RE-ENTRY PERIOD: 24 hrs.

PRE-HARVEST INTERVAL (Waiting period): Refer to the above recommendation.

MANNER & TIME OF APPLICATION: Spraying, it should be applied preferably in the morning or evening hours.

APPLICATION TIME: Soybean: 20-24 days after sowing when weeds are in 2-4 leaf stage. Black gram: 20-25 days after sowing when weeds are in 2-4 leaf stage. Green gram: 20-25 days after sowing when weeds are in 2-4 leaf stage. Groundnut: 20-25 days after sowing when weeds are in 2-4 leaf stage.

FREQUENCY INCLUDING MAXIMUM NUMBER OF SPRAYS: One-time application.

STAGE DURING WHICH PESTICIDE SHOULD NOT BE APPLIED FOR ON ANY CROP: Refer to the above recommendation.

PRECAUTION TAKE IN TO AVOID HARM TO THE BENEFICIAL: Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock, wild birds and animals.

USAGE OF PESTICIDES IN CONFINED AREA: Not allowed.

WARNING: Dangerous to re-use empty containers.

DIRECTION FOR SAFE DISPOSAL FOR USE CONTAINER : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of Herbicide and operators to dispose off packages or surplus materials and washings in a safe manner to prevent environmental and water pollution. 2.The used packages shall not be left out side to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

SIGNS AND SYMPTOMS OF POISONING: Severe eye irritation, highly skin irritant, respiratory tract irritation, dyspnea, salivation, decreased activity, ataxia, nasal discharge may occur.

STORAGE: 1.The packages containing the herbicide shall be stored in seperate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in seperate Almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

TREATMENT IN CASE OF POISONING: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

FIRST AID MEASURE: If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.

PRECAUTIONS BY USERS: 1. The spray man should use appropriate protective clothing like hat, long sleeved shirt, long pants and shoes. 2. Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrates spray solution. Avoid inhalation of spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not eat, drink or smoke during application. 3. Remove contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse the empty containers. 4. Wash hands & exposed skin with soap and water before meals and after work. 5. After spraying this herbicide the sprayer and utensils should be thoroughly cleaned with plenty of soap and water.

CAUTIONARY STATEMENT : 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3.The product is toxic to aquatic organisms and fish, thus its use in around water bodies should be avoided.

Hindi

हॉटश्योर

खरपतवारनाशक

सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + क्लोडिनाफ़ॉप–प्रोपारजाईल ८% पायसनीय सांद्र

सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल ८% पायसनीय सांद्र एक चयनात्मक खरपतवारनाशक है, जिसका उपयोग सोयाबीन, उरदबीन, मुंगबीन और मूंगफली के घास एवं चौड़ी पत्ती खरपतवार की रोकथाम के लिए किया जाता है।

रासायनिक संघटन:

लसंरचना		प्रमाण (% भार/भार)
सोडियम एसिफ्लोरफेन सक्रिय तत्व	:	१६.५०
क्लोडिनाफॉप–प्रोपार्जाइल सक्रिय तत्व	:	८.००
मिक्स्ड झायलीन	:	१६.००
ब्लँड ओफ अल्कोहॉल एथोक्षिलेट और अल्किल फीनॉल एथोक्षिलेट	:	१८.२५
कॅल्शियम डोडेसायल बेन्जीन सल्फोनेट	:	०.७५
साइक्लोहेक्सानॉन	:	पर्याप्त मात्रा
कुल	:	१००.००

उपयोग:

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टर			खरपतवार छिड़कन और काटने के बीच का अंतर (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्रा.)	संयोजन (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लि.)	
सोयाबीन	**घास जाति के खरपतवार:** सावांक, मांडला, कंधी घास, मेकरा, **चौडी पत्ती वाले खरपतवार:** एकालिपा इंडिका, जंगली अमली, बोकना, लेसुआ, लाल मुर्गा, बडी दूधी, गाजर घास, चिरपटी, पत्थरचट्टा, हुलहुल, मगरमच्छ घास, जंगली चौलाई, बुच–बुचा	१६५ + ८०	१०००	५००	६१
उरदबीन	**घास जाति के खरपतवार:** सावांक, मांडला, **चौडी पत्ती वाले खरपतवार:** एकालिपा इंडिका, जंगली अमली, बोकना, लेसुआ, लाल मुर्गा, बडी दूधी, गाजर घास, चिरपटी, पत्थरचट्टा, हुलहुल, मगरमच्छ घास, जंगली चौलाई, बुच–बुचा	१६५ + ८०	१०००	५००	५४
मुंगबीन	**घास जाति के खरपतवार:** सावांक, मांडला, मेकरा **चौडी पत्ती वाले खरपतवार:** बोकना, जंगली चौलाई, लेसुआ, पत्थरचट्टा,	१६५ + ८०	१०००	५००	५४
मूँगफली	**घास जाति के खरपतवार:** सावांक, मांडला, कंधी घास **चौडी पत्ती वाले खरपतवार:** बडी दूधी, जंगली अमली, लेसुआ	१६५ + ८०	१०००	५००	५४

मौसम की समान्य स्थिति: प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयोग न करें।

मृदा और जल: हल्की से भारी मिट्टी। छिड़काव के लिए साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए।

उपयोग के लिए फसल की अवस्था: पौध वृद्धि अवस्था।

उपयोग तकनीक: छिड़काव करें।

उपस्कर के प्रकार: नैकपैक स्प्रेयर।

नोज़ल प्रकार: फ्लेट फेन नोजल।

मात्रा: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

मिश्रण के लिए अनुदेश: सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल ८% भा/भा. इ.सी की आवश्यक मात्रा में ले, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पतला करें और लकड़ी से अच्छी तरह मिला लें। अब छिड़काव घोल की आवश्यकता के अनुसार बाकी पानी मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए घोल लें।

पुन:प्रविष्टि: २४ घंटे

पूर्व फसल का अंतराल: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

उपयोग का तरीका और समय: सुबह और शाम के समय छिड़काव करना ज्यादा बेहतर होता है।

उपयोग का समय: सोयाबीन: बुआई के २०–२४ दिन बाद जब खरपतवार २–४ पत्ती की अवस्था में हों। उरदबीन: बुआई के २०–२५ दिन बाद जब खरपतवार २–४ पत्ती की अवस्था में हों। मुंगबीन: बुआई के २०–२५ दिन बाद जब खरपतवार २–४ पत्ती की अवस्था में हों। मूँगफली: बुआई के २०–२५ दिन बाद जब खरपतवार २–४ पत्ती की अवस्था में हो।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या: एक अनुप्रयोग।

अवस्था जिसके दौरान कीटनाशी किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।

उपयोगी जीवों को नुकसान न होने के लिए सावधानियां: जिन स्थितियों में मधुमक्खी और मछली, पशु, जंगली पंछियों और जानवरों को नुकसान होने की संभावना है, उन स्थितियों में खरपतवारनाशक का उपयोग न करें।

सीमित क्षेत्र में खरपतवारनाशक का उपयोग: अनुमति नहीं हैं।

चेतावनी: रिक्त आधान पुन: उपयोग के लिए खतरनाक।

उपयोग डिब्बों के लिए सुरक्षित निपटान के लिए दिशा : १. निर्माता, संयोजनकारी एवं दवा का छिड़काव करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो खाली डिब्बे या बची दवा को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकी पर्यावरण और पानी प्रदुषण न हो। २. खरपतवारनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को पुन: उपयोग के लिए बाहर न छोड़े। ३. खाली डिब्बों को नष्ट कर, आबादी से दूर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए।

विषक्तिकरण के लक्षण: आँखो में गंभीर जलन, अत्याधिक त्वचा में जलन, श्वास नलिका में जलन, कष्टश्वास, मुँह से लार टपकना, कार्य में कमी, गतिभ्रंश, नाक बहना आदि लक्षण हो सकते है।

भंडारण: १) खरपतवारनाशक डिब्बों का भंडारण, अलग कमरा, या जगह जहाँ अन्य वस्तु भंडारण न हो अथवा ताला बंद अलमारियों में करें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ से दूर रखें। २) खरपतवारनाशक के भंडारण की जगह अच्छी तरह बनी हो, शीतल, शुष्क और हवादार हो तथा पर्याप्त लम्बी व चौड़ी हो, जिससे कि बाष्प द्वारा प्रदूषण होने का डर न हो।

प्रतिकारक: कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

प्राथमिक उपचार: निगल जाने पर: यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे १ या २ गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दे। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाए। **सांस में जाने से:** मरीज को खुली हवा में लाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मरीज साँस नहीं ले पा रहा या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दे। चिकित्सक से परामर्श करें। **त्वचा के संपर्क से:** अच्छी तरह से साबुन के साथ ज्यादा पानी से बाल और नाखूनों के नीचे सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को ही धो ले। दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़े अलग से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। **आँख के संपर्क से:** आँखें ज्यादा पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोए। अगर दर्द, जलन लाली या फोटोफोबिया जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्वसावधानियां: १. छिड़काव करने वाले टोपी, लम्बी पतलून और जूते पहने। २. इस खरपतवारनाशक के प्रयोग के समय आँख व त्वचा के स्पर्श से बचें। खरपतवारनाशक को सूंघे नही। उपयोग के समय मदिरापान या धूम्रपान मना है। इसके उपयोग पश्चात हाथों को साबून और पर्याप्त पानी से धोये। ३. दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो ले। खाली डिब्बों को इस्तेमाल न करें। ४. काम के बाद और भोजन से पहले हाथों और त्वचा को साबून और पानी से अच्छी तरह धो लें। ५. इस खरपतवार के प्रयोग के बाद स्प्रेयर और बाल्टी को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना चाहिए।

सावधानी कथन: १. केवल लेबल और पर्ची में उल्लिखित फसलों एवं पीड़कों पर ही इसका उपयोग करे। २. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बों) को नष्ट कर दें। ३. यह उत्पाद जलीय जीवों और मछलिओं के लिए जहरीला है, इसलिए इसका उपयोग जलीय क्षेत्र में और इसके आसपास न करें।

Marathi

हॉटश्योर

तणनाशक

सोडियम ॲसिफ्लुओरफेन १६.% + क्लोडिनॅफॉप–प्रोपारजाइल ८% इसी

सोडियम ॲसिफ्लोर्फेन १६५.% + क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जाईल ८% ईसी एक वेचक प्रादुर्भाव पश्चात वापरायचे तणनाशक आहे ज्याचा वापर सोयाबीन, उडीद, मूग आणि भुईमूग या पिकातील गवताळ आणि मोठ्या पानांच्या तणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केला जातो.

रासायनिक रचना:

रचना		प्रमाण (% व/व)
सोडियम ॲसिफ्लुओरफेन सक्रिय तत्व	:	१६.५०
क्लोडिनॅफॉप–प्रोपारजाइल सक्रिय तत्व	:	८.००
मिश्रझायलीन	:	१६.००
अल्कोहोल इथॉक्झिलेट आणि फेनॉल इथॉक्झिलेट यांचे मिश्रण	:	१८.२५
कॅल्शियम डोडेसिल बेन्झीन सल्फोनेट	:	०.७५
सायक्लोहेक्झॅनॉन	:	पर्याप्त प्रमाण
एकूण	:	१००.००

उपयोग:

पीक	लक्ष्य तणे	डोस प्रति हेक्टर			शेवटची फवारणी ते कापणी यातील कालावधी (दिवस)
		स.त. (ग्रा)	संयोजन (मिलि)	पाण्यात सौम्यीकरण (लिटर)	
सोयाबीन	**गवत वर्गीय तणे:** बेर्न यार्ड गवत (इचिगोक्लोआ एसपीपी), कांगी गवत (डिजिटॅरिया सॅन्विनॅलिस), क्रो फूट गवत (डॅक्टीलोक्टॅनियम इजिप्टम) **रूंद पानांची तणे:** कॉपर लीफ (ॲकॅलीफा इंडिका), हझारडाना (फिलिअँथस निरुरी), डे फ्लॉवर (कॉमेलिना बँगालिनसिस), फॉल्स कोम्ब (सिलोसिए अर्जेंटिया), दुधी (युफोर्बिया एसपीपी), कॅरट गवत (पार्थेनियम एसपीपी), पापोटान (फिसॅलिस मिनिमा), कार्पेट वीड (ट्रायअँनथेमा मोनोगायना), स्टिकी क्लिओमे (क्लिओमे व्हिसकोसा), ॲलिगेटर वीड (अल्टरनॅनथेरा फिलोक्झेरॉइड्इस), ग्रीन अमारांथ (अमारांथस एसपीपी), चिकवीड (स्टेल्लारिया मीडिया)	१६५ + ८०	१०००	५००	६१
उडीद	**गवताळ तणे :** बार्न यार्ड ग्रास (एकिनोक्लोआ कोलोना), क्रॅब ग्रास (एल्युसाइन इंडिका) **मोठ्या पानांची तणे :** हजारदाणा (फिलँथस निरुरी), फॉल्स ॲमरँथ (डायजेरा अर्व्हेन्सिस), कॉपर लीफ (अर्कलिफा इंडिका), कॉक्स कोंब (सेलोसिया अर्जेन्टीया), कॉंग्रेस ग्रास (पार्थेनिअम हिस्टेरोफोरस)	१६५ + ८०	१०००	५००	५४
मूग	**गवताळ तणे :** बार्न यार्ड ग्रास (एकिनोक्लोआ कोलोना), क्रॅब ग्रास (एल्युसाइन इंडिका), क्रो फूट ग्रास (डॅक्टिलोक्टेनिअम ॲजिप्टिअम) **मोठ्या पानांची तणे :** डे फ्लॉव्हर (कॉमेलिना बेंघालेन्सिस), ग्रीन ॲमरँथ (ॲमरँथस व्हिरिडिस), फॉल्स ॲमरँथ (डायजेरा अर्व्हेन्सिस), ट्रायँथेमा मोनोजायना	१६५ + ८०	१०००	५००	५४
भुईमूग	**गवताळ तणे :** बार्न यार्ड ग्रास (एकिनोक्लोआ कोलोना), क्रॅब ग्रास (एल्युसाइन इंडिका), कांग्री ग्रास (डिजिटेरिया सेंग्विनालिस) **मोठ्या पानांची तणे :** दुधी (युफोर्बिया जेनिक्युलाटा), हजारदाणा (फायलँथस निरुरी), फॉल्स ॲमरँथ (डायजेरा अर्व्हेन्सिस)	१६५ + ८०	१०००	५००	५४

हवामानाच्या परिस्थिती : प्रतिकूल परिस्थितींत वापर करू नका.

माती आणि पाणी : हलकी ते जड माती. फवारणीसाठी स्वच्छ पाणी वापरा.

वापर करण्यासाठी पिकाचा टप्पा: वानस्पतिक टप्पा

वापराची तंत्रे: फवारणी.

उपकरणाचा प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेयर.

नोझलचे प्रकार: फ्लॅट फॅन नोझल

मात्रा: वरील शिफारशीचा संदर्भ घ्या.

मिश्रण करण्यासाठी सूचना: सोडियम ॲसिफ्लोर्फेन १६५.% + क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जाईल ८% व/व ईसी हे आवश्यक प्रमाणात घ्या, त्यात थोडेसे पाणी मिसळा आणि काठीचा वापर करून मिश्रण व्यवस्थित हलवा. नंतर आवश्यक असलेल्या फवारणी प्रमाणाप्रमाणे उर्वरित पाणी मिसळा आणि पुन्हा एकदा हलवून मिश्रण व्यवस्थित मिसळा.

पुनर्प्रवेश कालावधी: २४ तास

कापणीपूर्व मध्यांतर (प्रतीक्षा कालावधी): वरील शिफारशीचा संदर्भ घ्या.

वापराची वेळ आणि पद्धत : फवारणी, ही शक्यतो सकाळी किंवा संध्याकाली करावी.

वापराची वेळ : सोयाबीन : पेरणीनंतर २० ते २४ दिवस, जेव्हा तणे २–४ पानांच्या अवस्थेत असतात. उडीद : पेरणीनंतर २० ते २५ दिवस, जेव्हा तणे २–४ पानांच्या अवस्थेत असतात. मूग : पेरणीनंतर २० ते २५ दिवस, जेव्हा तणे २–४ पानांच्या अवस्थेत असतात. भुईमूग : पेरणीनंतर २० ते २५ दिवस, जेव्हा तणे २–४ पानांच्या अवस्थेत असतात.

फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारता: एक वेळचा वापर.

कोणत्याही पिकावर कीटनाशक वापरू नये असा टप्पा : वरील शिफारसीचा संदर्भ घ्या

लाभदायक कीटकांना अपाय होणे टाळण्यासाठी घ्यायची खबरदारी : मधमाश्या आणि मासे, पशुधन, जंगली प्राणी आणि पक्षी ह्यांना अपाय होण्याची शक्यता असणाऱ्या परिस्थितींत वापरू नका.

बंदिस्त जागी तणनाशकांचा वापर : निषिद्ध आहे.

सावधान : रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक.

वापरलेल्या कंटेनरची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे निर्देश: १. पॅकेजेस, उर्वरित पदार्थ आणि धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीने, पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादकांचे, तणनाशकांच्या सूत्रीकर्त्यांचे आणि वापरकर्त्यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नये. ३. वापरलेली पॅकेजेस मोडून मानवी वस्तीपासून दूर नेऊन पुरावीत.

विषबाधेची लक्षणे: डोळ्यांची तीव्र जळजळ, त्वचेची तीव्र जळजळ, श्वसनमार्गाचा क्षोम, डिसेप्नीया, लाळ सुटणे, हालचाली मंद होणे, ॲटक्शिया, नाकातून द्रव बाहेर येणे ही असू शकतात.

साठवणीच्या परिस्थिती: १. तणनाशक असणारे पॅकेज इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्याच्या खोल्यांपासून किंवा वास्तूंपासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा वास्तूंमध्ये साठवावे किंवा तणनाशकाच्या प्रमाणानुसार आणि स्वरूपानुसार ते वेगळ्या कपाटामध्ये कुलूपबंद करून ठेवावे. २. तणनाशक साठवणीसाठीच्या खोल्या किंवा वास्तू सुबद्ध, कोरड्या, सुप्रकाशित आणि हवेशीर व पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात.

विषबाधा झाल्यास उपचार : विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

प्रथमोपचार : पोटात गेल्यास : जर माणूस शुद्धीत असेल आणि सावध असेल, तर पाण्याने चूळ भरा आणि १ ते २ पेले पाणी प्यायला द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उलटी काढू नका. **श्वासावाटे आत गेल्यास**, रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याच्या शरीराच्या तापमानाकडे लक्ष द्या. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा रुग्णाला श्वास घेणे कठीण होत असेल, तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडावर. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **त्वचेशी संपर्क झाल्यास:** शरीराचा बाधित भाग, अगदी केस आणि नखांखालीसुद्धा पाण्याने आणि साबणाने व्यवस्थित धुवून काढा. जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ होत राहिली, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी साबणाने व पाण्याने व्यवस्थित धुवून काढा. **डोळ्यांत गेल्यास :** भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे अलगदपणे धूत राहा. जर वेदना, लालसरपणा, प्रकाशसंवेदनशीलता किंवा जळजळ होत राहिली, तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.

वापरकर्त्यांनी घ्यायची खबरदारी: १. फवारणी करणाऱ्या माणसाने हॅट, लांब बाह्याचे शर्ट, मोठी पॅन्ट, आणि शूज यांसारखे योग्य संरक्षणात्मक कपडे परिधान करायला हवेत. २. संहतीयुक्त फवारणी द्रावणाची हाताळणी करताना डोळ्यांशी व त्वचेशी संपर्क टाळा. फवारणी तुषार श्वासावाटे आत घेणे टाळा. हाताळणी केल्यानंतर साबण व पाणी वापरून व्यवस्थितपणे धुवा. वापरादरम्यान काही खाऊ नका, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. ३. दुषित झालेले कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापर करण्यापूर्वी ते धुऊन टाका. रिकामी डब्यांचा पुन्हा वापर करू नका. ४. जेवणापूर्वी व काम केल्यानंतर साबण व पाणी वापरून हात व संपर्कात आलेली त्वचा धुऊन घ्या. ५. या कीटकनाशकाच्या फवारणीनंतर, भांडी भरपूर साबण व पाणी वापरून व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्या.

सावधानतेचा इशारा : १. पत्रकात आणि पुस्तिकेत दिलेल्या हेतुंव्यतिरिक्त इतर कशाहीसाठी वापर करू नये. २. वापरानंतर पुस्तिकेत दिलेल्या निर्देशानुसार कंटेनर नष्ट करा. ३. हे उत्पादन जलीय आणि मासे प्रजातींसाठी विषकारक आहे, म्हणून जलाशयामध्ये व त्या सभोवताली याचा वापर करणे टाळायला हवे.

Gujarati

હોટશ્યોર

નીંદણનાશક

સોડિયમ એસિફ્લોરફેન 15.5% + ક્લોડિનાફોપ-પ્રોપરજાઈલ 8% ઈસી

સોડિયમ એસિફ્લોરફેન 16.5%+ ક્લોડિનેફોપ પ્રોપરજાઈલ 8% ઈસી સોયાબીન, કાળા ચણા, લીલી ચણા અને મગફળીનાં ઘાસિયા અને પહોળાં પાનનાં નિંદણને કાબૂમાં લેવા માટે ઉપયોગ કરાતું ચુનંદું ઉદભવ પછી નિંદણનાશક છે.

રાસાયનિક બંધારણ:

પદાર્થો		પ્રમાણ (% વ/વ)
સોડિયમ એસિફ્લોરફેન સક્રિય તત્વ	:	16. 50
ક્લોડિનાફોપ –પ્રોપરજાઈલ સક્રિય તત્વ	:	8.00
મિક્સ્ડ ઝાયલીન	:	16.00
આલ્કોહોલ ઈથોક્સિલેટ અને આલ્કીલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટનું મિશ્રણ	:	18.25
કેલ્શિયમ ડોડીસાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ	:	0.75
ઊાયક્લોહેક્ઝાનન	:	ક્યુ. એસ
કુલ	:	100.00

ભલામણ:

પાક	લક્ષ્યાંકિત નિંદણ	પ્રતિ હેક્ટર ડોઝેજ			છેલ્લા છંટકાવથી લણાણી સુધીનો પ્રતિક્ષા ગાળો (દિવસો)
		સ.ત. (ગ્રા)	મિશ્રણ (મિ.લિ.)	પાણીમા મિશ્ર કરવું (લિ)	
સોયાબીન	**ઘાસિયા નિંદણો:** બર્ન યાર્ડ ઘાસ (એચિનોકલોઆ એસપીપી), ક્રેબ ઘાસ (એલુસાઇન ઈન્ડિકા), કાંગી ઘાસ (ડિજિટેરિયા સેન્ગુઇનાલિસ), ક્રો છૂટ ઘાસ (ડેક્ટિલોક્ટેનિયમ એજિપ્ટિયમ) **પહોળા પાનના નિંદણો:** કોપર લીફ (એકાલિફા ઈન્ડિકા), ભોંય આંબલી(ફાયલેન્થસ નીરુરી), ડે ફ્લાવર (કોમેલિના બેન્ગાલિન્સિસ), ફોલ્સ અમરનાથ (ડાઇજેરા આર્વેન્સિયા), કોક્સ કોમ્બ (સેલોસિ એજેન્ટિયા( ), દુધી (યુફોર્બિયલ એસપીપી), ગાજર ઘાસ (પાર્થેનિયમ એસપીપી.), પેપોટન (ફિસાલિસ મિનિમા), કાર્પેટ નિંદણ (ટ્રાયેન્થેમા મોનોગાઇના), સ્ટીકી ક્લિઓમ (ક્લિયોમી વિસ્કોસા), એલિગેટર નિંદણ (અલ્ટરનાન્થેરા ફિલોક્સેરાઇડ્સ), લીલું અમરાંથ (અમરાન્થુસ એસપીપી), ચિકવીડ (સ્ટલારિયા મીડિયા)	165 + 80	1000	500	61
કાળા ચણા	**ઘાસિયા નિંદણ:** બર્ન યાર્ડ ઘાસ (એચિનોકલોઆ કોલોના), ક્રેબ ગ્રાસ (એલુયુસાઈન ઈન્ડિકા) **પહોળાં પાનનાં ઘાસ:** ભોંય આમલી (ફાયલેન્થસ નિરુરી), ફોલ્સ એમેરંથ (ડાઇજેરા આર્વેન્સિસ), કોપર લીફ (એકાલિફા ઈન્ડિકા), કોક્સ કોમ્બ (સેલોસિયા આર્જેન્ટિયા), કોંગ્રેસ ઘાસ (પાર્થેનિયમ હિસ્ટેરોફોરસ)	165 + 80	1000	500	54
લીલા ચણા	**ઘાસિયા નિંદણ:** બર્ન યાર્ડ ઘાસ (એચિનોકલોઆ કોલોના), ક્રેબ ઘાસ (એલુયુસાઈનઈન્ડિકા), ક્રો ફૂટ ઘાસ(ડેક્ટિલોક્ટેનિયમ એજિપ્ટિયમ). **પહોળાં પાનનાં નિંદણ:** ડે ફ્લાવર (કોમેલિના બેન્ગાલિન્સિસ), ગ્રીન એમેરન્થ (એમેરેન્થસ વિરાઈડિસ), ફોલ્સ એમેરન્થ (ડાઇજેરા આર્વેન્સિસ), ટ્રાયેન્થેમા મોનોજાયના	165 + 80	1000	500	54
મગફળી	**ઘાસિયા નિંદણ:** બર્ન યાર્ડ ઘાસ (એચિનોકલોઆ કોલોના), ક્રેબ ઘાસ (એલુયુસાઈનઈન્ડિકા), કાંગી ઘાસ (ડિજિટેરિયા સેન્ગુઇનાલિસ) **પહોળાં પાનનાં નિંદણ:** દૂધી (યુફોર્બિયા જેનિક્યુલેટા), ભોંય આમલી (ફાયલેન્થસ નિરુરી), ફોલ્સ એમેરન્થ (ડાઇજેરા આર્વેન્સિસ)	165 + 80	1000	500	54

હવામાન પરિસ્થિતિઓ: પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ઉપયોગ ન કરવો.

માટી અને પાણી: હળવીથી ભારે માટી. છંટકાવ માટે સ્વચ્છ પાણીનો ઉપયોગ કરવો.

છંટકાવ માટે પાકના તબક્કા: વનસ્પતિનો તબક્કો.

છંટકાવની ટેક્નિક્સ: છંટકાવ.

ઉપકરણનો પ્રકાર: ફ્લેટ ફેન નોઝલ.

માત્રા: ઉક્ત ભલામણો જુઓ.

મિશ્રણ માટે સૂચના: આવશ્યક માત્રામાં સોડિયમ એસિફ્લોરફેન 16.5%+ ક્લોડિનેફોપ પ્રોપરજાઈલ 8% ભાર / ભાર ઈસી લો. થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો અને લાકડીથી સારી રીતે હલાવો. આ પછી આવશ્યક છંટકાવના પ્રમાણ અનુસાર બાકી પાણીની માત્રા પણ ઉમેરો અને ફરી હલાવતા રહીને સારી રીતે મિશ્રણ કરો.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો: 24 કલાક.

પૂર્વ-લણણી અંતર (થોભવાનો સમયગાળો): ઉક્ત ભલામણો જુઓ.

છંટકાવની રીત અને સમય: ખાસ કરીને સવારે અથવા સાંજે છંટકાવ કરવો જોઈએ.

છંટકાવનો સમય: સોયાબીન: નિંદણ 2–4 પાનના તબક્કામાં હોય ત્યારે વાવણી પછી 20–24 દિવસે. કાળા ચણા: નિંદણ 2–4 પાનના તબક્કામાં હોયત્યારે વાવણી પછી 20–25 દિવસે. લીલા ચણા: નિંદણ 2–4 પાનના તબક્કામાં હોય ત્યારે વાવણી પછી 20–25 દિવસે. મગફળી: નિંદણ 2–4 પાનના તબક્કામાં હોય ત્યારે વાવણી પછી 20–25 દિવસે.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતા: એક સમયનો છંટકાવ.

લાભકારી કીટકોને હાનિ ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખો: જો મધમાખી અને માછલી, પશુધન, જંગલી પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને હાનિ પહોંચવાની સંભાવના હોય તો એ પરિસ્થિતિઓમાં ઉપયોગ કરશો નહીં.

મર્યાદિત વિસ્તારમાં નિંદણનાશકોનો ઉપયોગ: મંજૂરી નથી.

ચેતવણી: ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે.

કન્ટેનરના ઉપયોગ માટે સલામત નિકાલ માટેના નિર્દેશો: 1. ઉત્પાદકો, નિંદણનાશકના ફોર્મ્યુલેટર અને ઓપરેટરોની ફરજ છે કે તેઓ પેકેજ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણો સલામત રીતે નિકાલ કરે જેથી પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણને અટકાવી શકાય. 2. ઉપયોગમાં લેવાતા પેકેજોને તેમનો પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર રેઢાં છોડવાં નહીં. 3. પેકેજોને તોડીને વસવાટથી દૂર દાટી આવો.

ઝેરી લક્ષણો: આંખમાં તીવ્ર બળતરા, ત્વચામાં બળતરા, શ્વસનમાર્ગમાં બળતરા, શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડવી, લાળ પડવી, કાર્યક્ષમતા ઘટવી, નાકમાં પ્રવાહી આવવું જેવી અસર થઈ શકે છે.

સંગ્રહણ: 1. નિંદણનાશક ધરાવતા પેકેજો અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાધ પદાર્થોના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડાઓ અથવા પરિસરમાંથી અલગ રૂમ અથવા પરિસરમાં સંગ્રહિત કરવાં અથવા નિંદણનાશકના જથ્થા અને પ્રકૃતિના આધારે તાળા અને ચાવી હેઠળ અલગ કબાટમાં રાખવાં. 2. નિંદણનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેના ઓરડાઓ અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે બંધાયેલી, સૂકી અને સારી રીતે પ્રકાશિત અને હવા–ઉજાસ વાળી તથા પર્યાપ્ત મોકળાશ ધરાવતી હોવી જોઈએ.

ઝેરની અસરના કિસ્સામાં સારવાર: કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણોની સારવાર કરો.

પ્રાથમિક સારવાર : જો ગળી જવાયું હોય તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સજાગ હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેશુધ વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડોક્ટરને બોલાવો. ઉપસ્થિત ચિકિત્સક દ્વારા અન્યથા સલાહ આપવામાં આવે ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવશો નહીં. **જો શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો:** દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દી શ્વાસ ન લઈ રહ્યો હોય અથવા કષ્ટપૂર્વક શ્વાસ લઈ રહ્યો હોય તો, તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો, બની શકે તો, મોઢાથી મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો. ડોક્ટરની સલાહ લો. **ત્વચાને સ્પર્શવાના કિસ્સામાં:** શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો, જેમાં વાળ અને નખની નીચેના હિસ્સાનો સમાવેશ થાય છે. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડોક્ટરની સલાહ લો. બધાં દૂષિત કપડાંને અલગ કરી લેવાં જોઈએ અને ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવાં જોઈએ. **આંખને સ્પર્શ થવાના કિસ્સામાં:** ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે ધૂઓ. જો દુખાવો, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.

વપરાશકર્તાઓ દ્વારા સાવચેતીઓ: 1. છંટકાવ કરનારે હેટ, લાંબી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ અને જૂતાં જેવાં યોગ્ય સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવાં જોઈએ. 2. એકાગ્ર છંટકાવનું મિશ્રણ હાથ ધરતી વખતે આંખો અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. છંટકાવની ધૂમ્ર શ્વાસમાં નહીં જાય તેનું ધ્યાન રાખો. હાથ ધર્યા પછી સાબુ અને પાણીથી દૂષિત ભાગોને સાફ ધોઈ નાખો. છંટકાવ કરતી વખતે કશું ખાવું, પીવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઈએ. 3. દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને ધોયાં પછી જ ફરીથી પહેરો. ખાલી પાત્રોને ફરીથી ઉપયોગ નહીં કરો. 4. સન્મુખ હાથ અને ત્વચાને ભોજન લેવા પૂર્વે અથવા કામ કર્યા પછી સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. 5. આ નિંદણનાશક છંટકાવ કર્યા પછી સ્પ્રેયર અને પાત્રોને સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી સાફ ધોઈ નાખવાં જોઈએ.

સાવચેતીભર્યું નિવેદન: 1. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર દર્શાવેલા હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ ન કરવો; 2. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. 3. ઉત્પાદન સમુદ્રિ જીવો અને માછલીઓ માટે ઝેરી છે, જેથી પાણીની નહેરોમાં અને આસપાસ ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

Punjabi

ਹਾਟਸ਼ਿਓਰ

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਫ਼ਲੋਰਫ਼ੇਨ ੧੬.੫% + ਕਲੋਡੀਨਾਫ਼ੋਪ–ਪ੍ਰੋਪਾਰਜਿਲ ੮% ਈ.ਸੀ.

ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਫ਼ਲੋਰਫ਼ੇਨ ੧੬.੫% + ਕਲੋਡੀਨਾਫ਼ੋਪ-ਪ੍ਰੋਪਾਰਜਿਲ ੮% ਈ.ਸੀ. ਇੱਕ ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ, ਹਰੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਮਿਸ਼ਰਨ		ਤੱਤ (% ਵ/ਵ)
ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਫ਼ਲੋਰਫ਼ੇਨ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ	:	੧੬.੫੦
ਕਲੋਡੀਨਾਫ਼ੋਪ–ਪ੍ਰੋਪਾਰਜਿਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ	:	੮.੦੦
ਮਿਕਸਡ ਜ਼ਾਈਲੀਨ	:	੧੬.੦੦
ਅਲਕੋਹਲ ਈਥਾਕਸੀਲੇਟ ਅਤੇ ਅਲਕਾਈਲ ਫ਼ੀਨੋਲ ਈਥਾਕਸੀਲੇਟ	:	੧੮.੨੫
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡੋਡੀਸੀਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	:	੦.੭੫
ਸਾਈਕਲੋਹੇਕਸਾਨੋਨ	:	ਕਿਊ.ਐਸ.
ਕੁੱਲ	:	੧੦੦.੦੦

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ :

ਫ਼ਸਲ	ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰ.ਹੈ.			ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	
ਸੋਇਆਬੀਨ	**ਘਾਹਦਾਰ ਨਦੀਨ:** ਸਵਾਂਕ (ਏਚੀਨੋਕਲੋਆ ਸਪ.), ਮਕੜਾ (ਇਲੂਸੀਨ ਇੰਡੀਕਾ), ਕੇਵ ਘਾਹ (ਡਿਜੀਟਾਰੀਆ ਸੈਂਗੁਈਨਾਲੀਸ), ਕਾਂ ਪੰਜਾ ਘਾਹ (ਡੈਕਟੀਲੋਕਟੇਨੀਅਮ ਏਜੀਪਟੀਅਮ) **ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ:** ਤਾਂਬਰ ਪੱਤੀ (ਐਕਾਲੀਫ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ), ਹਜ਼ਾਰਦਾਣਾ (ਫ਼ਾਈਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ), ਕਾਉਂ.ਮੱਕੀ (ਕਾਮਲੀਨਾ ਬੰਗਾਲੀਨਸਿਸ), ਟਾਂਡਲਾ (ਡੀਜੇਰਾ ਅਰਵੇਨਸਿਸ), ਕੁੱਕੜ ਕਲਗੀ (ਸੀਲੋਸੀ ਅਰਜੇਂਟੇ), ਦੁਧੀ (ਯੂਫ਼ੋਰਬੀਆ ਸਪ.), ਪਾਪੋਟਨ (ਫ਼ਾਈਸਾਲੀਸ ਮਿਨੀਮਾ), ਇਟਸਿਟ (ਟ੍ਰਾਇਨਥੇਮਾ ਮੋਨੋਜੀਨਾ), ਚਿਪਕੂ ਕਲੀਓਮ (ਕਲੀਓਮ ਵਿਸਕੋਸਾ), ਐਲੀਗੇਟਰ ਵੀਡ (ਆਲਟਰਨਾਂਥੇਰਾ ਫ਼ੀਲੋਕਸੇਰਾਇਡਜ਼), ਚੌਲਾਈ (ਅਮਰਾਂਥਸ ਸਪ.), ਚਿੱਕ ਵੀਡ (ਸਟੇਲੀਆਰਾ ਮੇਡੀਆ).	੧੬੫ + ੮੦	੧੦੦੦	੫੦੦	੬੧
ਕਾਲੇ ਚਨੇ	**ਘਾਹਦਾਰ ਨਦੀਨ :** ਸਵਾਂਕ (ਏਚੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ), ਮਕੜਾ (ਇਲੂਸੀਨ ਇੰਡੀਕਾ) **ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ :** ਹਜ਼ਾਰਦਾਣਾ (ਫ਼ਾਈਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ), ਝੂਠੀ ਚੌਲੀ (ਡੀਜੇਰਾ ਅਰਵੇਨਸਿਸ), ਤਾਂਬਰ ਪੱਤੀ (ਐਕਾਲੀਫ਼ਾ ਇੰਡੀਕਾ), ਕੁੱਕੜ ਕਲਗੀ (ਸੀਲੋਸੀ ਅਰਜੇਂਟੇ), ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਗ੍ਰਾਸ (ਪਰਥੇਨਿਅਮ ਹਿਸਟੈਰਾਫੋਰਸ)	੧੬੫ + ੮੦	੧੦੦੦	੫੦੦	੫੪
ਹਰੇ ਚਨੇ	**ਘਾਹਦਾਰ ਨਦੀਨ :** ਸਵਾਂਕ (ਏਚੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ), ਮਕੜਾ (ਇਲੂਸੀਨ ਇੰਡੀਕਾ) ਕਾਂ ਪੰਜਾ ਘਾਹ (ਡੈਕਟੀਲੋਕਟੇਨੀਅਮ ਏਜੀਪਟੀਅਮ) **ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ :** ਕਾਉਂ.ਮੱਕੀ (ਕਾਮਲੀਨਾ ਬੰਗਾਲੀਨਸਿਸ), ਹਰੀ ਚੌਲੀ (ਅਮਰਾਂਥਸ ਵਿਰਿਡਿਸ), ਝੂਠੀ ਚੌਲੀ (ਡੀਜੇਰਾ ਅਰਵੇਨਸਿਸ), ਟ੍ਰਾਇਐਂਥਮਾ ਮੋਨੋਗਿਆਨਾ	੧੬੫ + ੮੦	੧੦੦੦	੫੦੦	੫੪
ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ	**ਘਾਹਦਾਰ ਨਦੀਨ :** ਸਵਾਂਕ (ਏਚੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ), ਮਕੜਾ (ਇਲੂਸੀਨ ਇੰਡੀਕਾ), ਕੰਗੀ ਘਾਹ (ਡਿਜ਼ਿਟੇਰਿਆ ਸੇਂਗੁਇਨਾਲਿਸ) **ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ :** ਦੂਧੀ (ਯੂਫ਼ੋਰਬੀਆ ਜੇਨਿਕੁਲਤਾ), ਹਜ਼ਾਰਦਾਣਾ (ਫ਼ਾਈਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ), ਝੂਠੀ ਚੌਲੀ (ਡੀਜੇਰਾ ਅਰਵੇਨਸਿਸ)	੧੬੫ + ੮੦	੧੦੦੦	੫੦੦	੫੪

ਮੌਸਮ ਹਾਲਤ: ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ: ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸਥਾ : ਬਨਸਪਤੀ ਅਵਸਥਾ

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ : ਸਪ੍ਰੇ

ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਮ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ

ਨੋਜ਼ਲ ਕਿਸਮ : ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ

ਖੁਰਾਕ : ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੇਖੋ।

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਫ਼ਲੋਰਫ਼ੇਨ ੧੬.੫% + ਕਲੋਡੀਨਾਫ਼ੋਪ–ਪ੍ਰੋਪਾਰਜਿਲ ੮% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।

ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ : ੨੪ ਘੰਟੇ

ਪੂਰਵ – ਫ਼ਸਲ ਅੰਤਰਾਲ (ਅੰਤਰਾਲ ਅਵਧੀ) : ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੇਖੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ : ਛਿੜਕਾਅ ਤਰਜੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸੋਇਆਬੀਨ : ਬਿਜਾਈ ਦੇ ੨੦–੨੪ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ੨–੪ ਪੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕਾਲੇ ਚਨੇ : ਬਿਜਾਈ ਦੇ ੨੦–੨੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ੨–੪ ਪੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹਰੇ ਚਨੇ : ਬਿਜਾਈ ਦੇ ੨੦–੨੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ੨–੪ ਪੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ : ਬਿਜਾਈ ਦੇ ੨੦–੨੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ੨–੪ ਪੱਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪ੍ਰੇ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ : ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ।

ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮਿੱਤਰ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ: ਜੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ–ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ: ੧.ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ੨.ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ–ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੩. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ: ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਲਣ, ਤਵਚਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਲਣ, ਸਵਾਸ ਪਥ ਦੀ ਜਲਣ, ਡਿਸਪਨੀ, ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ, ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅੀਾਕਸੀਆ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ।

ਸਟੋਰੇਜ: ੧.ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ੨.ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਦੀਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ: ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ ਐਂਟੀਡੋਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ੧ ਜਾਂ ੨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਹੋਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। **ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:** ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਿਓ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸਵਰਾ ਕਰੋ। **ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:** ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। **ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:** ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ, ਲੰਬੀ ਸਲੀਵਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਤੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਕਾਂਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਸਪ੍ਰੇ ਸਾੱਲਯੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਛਿੜਕਾਅ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ – ਪੀਓ, ਨਾ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਓ। ੩. ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਡਿਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ੪. ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ੫. ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਆਨ : ੧.ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨.ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਨਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੩. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Oriya

ହଟଶ୍ୟୋର

କ୍ଷୁପନାଶକ

ସୋଡିୟମ ଏସିଫ୍ଲୁଅରଫେନ୍ 16.5% + କ୍ଲୋଡ଼ିନାଫପ୍–ପ୍ରୋପାର୍ଗିଲ୍ 8% ଇସି

ସୋଡିୟମ ଆସିଫ୍ଲୁରୋଫେନ୍ 16.5% କ୍ଲୋଡିନାଫପ୍ ପ୍ରୋପାରଜିଲ୍ 8% ଇସି ହେଉଛି ଏକ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏମରଜେନ୍ସ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଯାହାକୁ ସୋୟାବିନ, ବିରି, ମୁଗ ଓ ଚିନାବାଦାମର ଘାସ ଓ ଓସାରିଆପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଅନାବନା ଘାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ରସାୟନିକ ସଂରଚନା		ନିହିତ ପଦାର୍ଥ (%ଓଜନ/ଓଜନ)
ସୋଡିୟମ ଏସିଫ୍ଲୁଅରଫେନ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ	:	16.50
କ୍ଲୋଡିନାଫପ୍–ପ୍ରୋପାର୍ଗିଲ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ	:	8.00
ମିକ୍ସଡ୍ ଜାଇଲିନ୍	:	16.00
ଆଲକୋହଲ୍ ଇଥୋକ୍ସିଲେଟ୍ ଓ ଆଲକାଇଲ୍ ଫେନଲ୍ ଇଥୋକ୍ସିଲେଟର ମିଶ୍ରଣ	:	18.25
କ୍ୟାଲସିୟମ ଡୋଡ଼େସିଲ୍ ବେଞ୍ଜିନ ସଲଫୋନେଟ୍	:	0.75
ସାଇକ୍ଲୋହେକସାନନ୍	:	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
ମୋଟ୍	:	100.00

ସୁପାରିଶ୍ :

ଫସଲ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଳୁଙ୍ଗା	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା			ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ପରଠୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେସନ (ମି.ଲି.)	ମିଶାଇବା ପାଣି ପରିମାଣ (ଲି.)	
ସୋୟାବିନ୍	**ଘାସୁଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ଖଳାବାଡ଼ି ଘାସ (ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ ଏସପିପି), କ୍ରାବ୍ ଗ୍ରାସ (ଏଲ୍ୟୁସାଇନ ଇଣ୍ଡିକା), କାଙ୍ଗ ଘାସ (ଡିଜିଟାରିଆ ସାଙ୍ଗୁଇନାଲିସ୍), କ୍ରୋ ଫୁଟ୍ ଗ୍ରାସ (ଡାକ୍ଟିଲୋକଟାନିୟମ ଏଜିପଟିୟମ) **ଚଉଡ଼ାପତ୍ରିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** କପର ଲିଫ୍ (ଏକାଲାଇଫା ଇଣ୍ଡିକା), ହାଜାର୍ଡାନା (ଫିଲାନ୍ଥସ ନିରୁରି), ଡେ ଫ୍ଲାୱାର (କମେଲିନା ବେଙ୍ଗାଲିନ୍ସିସ୍), ଫଲସ ଅମରନ୍ଥ (ଡାଇଜେରା ଅର୍ଭେନସିସ୍), କକସ କମ୍ବ (ସେଲୋସିଆ ଅର୍ଜେନସିଆ), ଦୁଧି (ୟୁଫୋର୍ବିଆ ଏସପିପି), କ୍ୟାରଟ ଗ୍ରାସ (ପାର୍ଥେନିୟମ ଏସପିପି), ପାପୋଟେନ୍ (ଫିସାଲିସ୍ ମିନିମା), କାର୍ପେଟ୍ ୱିଡ୍ (ଟ୍ରିଆନଥେମା ମୋନୋଗାଇନା), ଷ୍ଟିକୀ କ୍ଲେଓମ୍ (କ୍ଲେଓମ୍ ଭିସକୋସା), ଆଲିଗେଟର ୱିଡ୍ (ଆଲ୍ଟରନନଥେରା ଫିଲୋକ୍ସିରଏଡସ), ଗ୍ରୀନ ଅମରନ୍ଥ (ଅମରାନ୍ଥସ ଏସପିପି), ଚିକୱିଡ୍ (ଷ୍ଟେଲାରିଆ ମିଡିଆ)	165 + 80	1000	500	61
ବିରି	**ଘାସୁଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ଖଳାବାଡ଼ି ଘାସ (ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ କଲୋନା), କ୍ରାବ୍ ଗ୍ରାସ (ଏଲ୍ୟୁସାଇନ ଇଣ୍ଡିକା) **ଚଉଡ଼ାପତ୍ରିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ହାଜାରଡାନା (ଫଇଲାନ୍ଥସ ନିରୁରି), ଫଲ୍ସ ଆମାରନ୍ଥ (ଡାଇଜେରା ଆର୍ଭେନସିସ୍), କପର ଲିଫ୍ (ଆକାଲଫା ଇଣ୍ଡିକା), କକ୍ସ କମ୍ବ (ସେଲୋସିଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିଆ), କଂଗ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାସ (ପାରେଥେନିୟମ ହିଷ୍ଟେରୋଫରସ୍)	165 + 80	1000	500	54
ମୁଗ	**ଘାସୁଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ଖଳାବାଡ଼ି ଘାସ (ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ କଲୋନା), କ୍ରାବ୍ ଗ୍ରାସ (ଏଲ୍ୟୁସାଇନ ଇଣ୍ଡିକା), କ୍ରୋ ଫୁଟ୍ ଗ୍ରାସ (ଡାକ୍ଟିଲୋକଟାନିୟମ ଏଜିପଟିୟମ) **ଚଉଡ଼ାପତ୍ରିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ଡେ ଫ୍ଲାୱାର (କମେଲିନା ବେଂଘାଲେନ୍ସିସ୍), ଗ୍ରୀନ୍ ଆମାରନ୍ଥ (ଆମାରନ୍ଥସ ଭିରିଡିସ୍), ଫଲ୍ସ ଆମାରନ୍ଥ (ଡାଇଜେରା ଆର୍ଭେନସିସ୍), ଟ୍ରିଆନଥେମା ମନୋଗାଇନା	165 + 80	1000	500	54
ଚିନାବାଦାମ	**ଘାସୁଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ଖଳାବାଡ଼ି ଘାସ (ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ କଲୋନା), କ୍ରାବ୍ ଗ୍ରାସ (ଏଲ୍ୟୁସାଇନ ଇଣ୍ଡିକା), କାଙ୍ଗି ଘାସ (ଡିଜିଟାରିଆ ସାଙ୍ଗୁଇନାଲିସ୍) **ଚଉଡ଼ାପତ୍ରିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା :** ଦୁଧି (ୟୁଫୋରବିଆ ଜେନିକୁଲାଟା), ହାଜାରଡାନା (ଫାଇଲାନ୍ଥସ ନିରୁରି), ଫଲ୍ସ ଆମାରନ୍ଥ (ଡାଇଜେରା ଆର୍ଭେନସିସ୍)	165 + 80	1000	500	54

ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା: ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ମାଟି ଓ ପାଣି: ହାଲୁକାରୁ ଭାରି ମାଟି, ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପତ୍ର ଧରିବା ଠାରୁ ଫଳ ଧରିବା ସ୍ତର।

ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ: ଫୋଲିୟର ସ୍ପ୍ରେ

ଉପକରଣ ପ୍ରକାର: କଂପ୍ରେସନ ନାପସାକ ସ୍ପ୍ରେୟର, କଂପ୍ରେସନ ନାପସାକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେୟର

ନୋଜଲ ପ୍ରକାର: ହଲୋ କୋନ

ମାତ୍ରା: ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ

ମିଶ୍ରଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ସୋଡିୟମ ଆସିଫ୍ଲୁରୋଫେନ୍ 16.5% କ୍ଲୋଡିନାଫପ୍ ପ୍ରୋପାରଜିଲ୍ 8% ଇସିକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ଏକ କାଠି ସହାୟତାରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣିକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଭଲ୍ୟୁମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଳାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।

ପୁନଃପ୍ରୟୋଗ ଅବଧି: ୨୪ ଘଣ୍ଟା

ଅମଳ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବଧାନ: (ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି): ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ

ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ : ସିଞ୍ଚନ, ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ସୋୟାବିନ୍ : ଅନାବନା ଘାସ 2–4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଣିବା ପରେ 20–24 ଦିନ। ବିରି : ଅନାବନା ଘାସ 2–4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଣିବା ପରେ 20–25 ଦିନ। ମୁଗ : ଅନାବନା ଘାସ 2–4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଣିବା ପରେ 20–25 ଦିନ। ଚିନାବାଦାମ : ଅନାବନା ଘାସ 2–4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୁଣିବା ପରେ 20–25 ଦିନ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ: କୀଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଫୋଲିୟର ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାରେ

ବାରମ୍ବାରତା ସହ ସର୍ବାଧିକ ସିଞ୍ଚନ ସଂଖ୍ୟା: ୨ ସ୍ପ୍ରେ, କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି

ଯେକୌଣସି ଫସଲରେ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ: ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବା ଲାଗି ସାବଧାନତା: ମହୁମାଛି, ମାଛ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ବନ୍ୟ ଜୀବ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଆବଦ୍ଧିତ ସ୍ଥାନରେ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର: ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ

ସତର୍କତା: ଖାଲିପାତ୍ରକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ସୁରକ୍ଷିତ ନିଷ୍କାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ : ୧. ଏହା ତୃଣନାଶକର ନିର୍ମାତା, ସଂରଚନାକାରୀ ଓ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଯେପରି ଧୋଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବଳକା ପଦାର୍ଥକୁ ନିରାପଦ ଉପାୟରେ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଏହାର ପୁନଃବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ୩. ପ୍ୟାକେଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ସାଂଘାତିକ ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା, ତ୍ୱଚାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତି, ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଡିସପନିଆ, ଲାଳ ବୋହିବା, କାମ କରିବା କମିଯିବା, ଆଟାକ୍ସିଆ, ନାକରୁ ପାଣି ଗଡ଼ିବା ଲକ୍ଷଣ ଘଟିପାରେ।

ଭଣ୍ଡାରଣ : ୧.ତୃଣନାଶକ ରହିଥିବା ପ୍ୟାକେଜକୁ ଏକ ପୃଥକ ଗୃହ କିମ୍ବା ପରିସରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ତୃଣନାଶକ ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାହାକୁ ଏକ ପୃଥକ ଆଲମିରାରେ ତାଲା ଚାବି ଦେଇ ଚାବି ରଖନ୍ତୁ। ୨.ତୃଣନାଶକ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହ କିମ୍ବା ପରିସରଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟି ଶୁଷ୍କ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ବିଷକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷନାଶକ ଜଣାନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ଯଦି ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତ ଓ ସଜାଗ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଧୋଇ ତାଙ୍କ ୧ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀ ଜଣକ ଅଚେତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡ଼ାକ୍ତରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଡ଼ାକ୍ତର ନଚାହଁଛିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। **ଯଦି ନିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ,** ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରୁନଥିବେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ପାଟିରେ ପାଟି ଲଗାଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। **ଯଦି ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ:** ଶରୀରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ସହ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଓ ନଖକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ଜଣେ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୂଷିତ ପୋଷାକକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। **ଯଦି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥାଏ:** ହାଲକା ଭାବରେ ଆଖିକୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣି ଛାଟି ଧୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଦାହ, ଲାଲ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଫଟୋଫୋବିଆ ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଚକ୍ଷୁ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା: 1. ସିଞ୍ଚନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ଯଥା ଟୋପି, ଲମ୍ବା ହାତ ଥିବା ସାର୍ଟ, ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍। 2. ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ରବଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଖି ଓ ଚର୍ମରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ରବଣକୁ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିଚାଳନା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଓ ଶରୀରର ଅଂଶକୁ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ବା ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ଦୂଷିତ ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। କଦାପି ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବା ପରେ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହାତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଚର୍ମକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। 5. ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପରେ ସ୍ପ୍ରେୟର ଏବଂ ପାତ୍ରକୁ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ୍।

ସତର୍କତାମୂଳକ ବିବରଣୀ: ୧.ଲେଭଲ ଓ ଲିଫଲେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ନଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୨.ଲିଫଲେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ୩. ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଓ ମାଛ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ୍।

Assamese

হটশ্যোৰ

অপতৃণনাশক

চ'ডিয়াম এচিফ্লু অ'ৰেফেন 16.5% + ক্লোডিনাফপ-প্ৰ'পাৰজাইল ৪% ইচি

চ'ডিয়াম এচিফ্লুঅ'ৰেফেন 16.5% + ক্লোডিনাফপ-প্ৰ'পাৰজাইল ৪% ইচি হৈছে এবিধ নিৰ্বাচিত পাছত প্ৰয়োগ কৰা অপতৃণনাশক যিবিধ চ'য়াবীন, ৰাজ্‌মা, সেউজীয়া গোটা মগুমাহ আৰু চীনা বাদাম খেতিত হোৱা ঘাঁহজাতীয় আৰু বহল পাতৰ অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হয়।

ৰাসায়নিক গঠন:

উপাদান :		সূচী (% ডব্লিউ / ডব্লিউ)
চ'ডিয়াম এচিফ্লুঅ'ৰেফেন সক্ৰিয় উপাদান	:	16.50
ক্লোডিনাফপ-প্ৰ'পাৰজাইল সক্ৰিয় উপাদান	:	8.00
মিক্সড জাইলেন	:	16.00
এলক'হল ইথক্সিলেটেড আৰু এল্কাইল ফেনল ইথক্সিলেটৰ মিশ্ৰণ	:	18.25
কেলচিয়াম ডডিচাইল বেঞ্জিন চালফোনেট	:	0.75
চাইক্লোহেক্সান'ন	:	পৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণে
মুঠ	:	100.00

অনুমোদনসমূহ:

ফচল	লক্ষিত অপতৃণ	মাত্ৰা প্ৰতি হেক্টৰত			শেষৰবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা শস্য চপোৱালৈকে প্ৰতীক্ষা ম্যাদ (দিন)
		সক্ৰিয় উপাদান (গ্ৰাম)	সূত্ৰবদ্ধ (মিঃলিঃ)	পানীত মিশ্ৰণ (লিঃ)	
চ'য়াবীন	**ঘাঁহজাতীয় অপতৃণসমূহ:** বাৰ্ন য়াৰ্ড গ্ৰাছ *(একিনোক্লোৱা এচপিপি.)*, ক্ৰেব গ্ৰাছ *(ইলিউশ্বাইন ইণ্ডিকা)*, কংগি গ্ৰাছ *(ডিজিটেৰিয়া চেংগুইনালিচ)*, ক্ৰ' ফুট গ্ৰাছ *(ডেক্টিলক্টেনিয়াম এজিপ্টিয়াম)* **বহল পাতৰ অপতৃণসমূহ :** ক'পাৰ লীফ *(একালিফা ইণ্ডিকা)*, হাজাৰদানা *(ফাইলানথাচ নিৰুৰি)*, ডে' ফ্লাৱাৰ *(কোমেলিনা বেংঘালেনচিচ)*, ফল্‌চ আমাৰনাথ *(ডিগেৰা আৰ্ভেনচিচ)*, কোক্‌চ কোম্ব *(চেল'চিয়া আৰ্জেন্টিয়া)*, ডুধি *(ইউফৰ্বিয়া এচপিপি.)*, কেৰট গ্ৰাছ *(পাৰ্থেনিয়াম এচপিপি.)*, পাপোটান *(ফাইচালিচ মিনিমা)*, কাৰ্পেট অপতৃণ *(ট্ৰিয়ানথেমা মনোজাইনা)*, ষ্টিকী ক্লেঅ'ম *(ক্লেঅ'ম ভিস্কোচা)*, এলিগেটৰ অপতৃণ *(অল্টাৰনেন্থাৰএফিলক্সাৰোআইডিচ)* গ্ৰীণ আমাৰনাথ *(আমাৰাছাচ এচপিপি.)*, চিচকউইড *(ষ্টেলাৰিয়া মেডিয়া)*	165 + 80	1000	500	61
ৰাজ্‌মা	**ঘাঁহজাতীয় অপতৃণসমূহ :** বাৰ্ন য়াৰ্ড গ্ৰাছ *(একিনোক্লোৱা কোলোনা)*, ক্ৰেব গ্ৰাছ *(ইলিউশ্বাইন ইণ্ডিকা)* **বহল পাতৰ অপতৃণসমূহ :** হাজাৰদানা *(ফাইলেছাচ নিৰুৰি)*, ফল্‌চ আমাৰনাথ *(ডিগেৰা আৰ্ভেনচিচ)*, ক'পাৰ লীফ *(একালিফা ইণ্ডিকা)*, কোক্‌চ কোম্ব *(চেল'চিয়া আজেন্টিয়া)*, কংগ্ৰেছ গ্ৰাছ *(পাৰ্থেনিয়াম হাইষ্টৈৰ'ফোৰাচ)*	165 + 80	1000	500	54
সেউজীয়া গোটা মগুমাহ	**ঘাঁহজাতীয় অপতৃণসমূহ :** বাৰ্ন য়াৰ্ড গ্ৰাছ *(একিনোক্লোৱা কোলোনা)*, ক্ৰেব গ্ৰাছ *(ইলিউশ্বাইন ইণ্ডিকা)*, ক্ৰ' ফুট গ্ৰাছ *(ডেক্টিলক্টেনিয়াম এজিপ্টিয়াম)* **বহল পাতৰ অপতৃণসমূহ :** ডে' ফ্লাৱাৰ *(কোমোলিনা বেংঘালেনচিচ)*, গ্ৰীণ আমাৰনাথ *(আমাৰাছাচ ভিৰদিচ)*, ফল্‌চ আমাৰনাথ *(ডিগেৰা আৰ্ভেনচিচ)*, *ট্ৰিয়ানথেমা মনোজাইনা)*	165 + 80	1000	500	54
চীনা বাদাম	**ঘাঁহজাতীয় অপতৃণসমূহ :** বাৰ্ন য়াৰ্ড গ্ৰাছ *(একিনোক্লোৱা কোলোনা)*, ক্ৰেব গ্ৰাছ *(ইলিউশ্বাইন ইণ্ডিকা)*, কংগি গ্ৰাছ *(ডিজিটেৰিয়া চেংগুইনালিচ)* **বহল পাতৰ অপতৃণসমূহ :** দুধি *(ইউফৰ্বিয়া জেনিকোলাটা)*, হাজাৰদানা *(ফাইলেছাচ নিৰুৰি)*, ফল্‌চ আমাৰনাথ *(ডিগেৰা আৰ্ভেনচিচ)*	165 + 80	1000	500	54

বতৰৰ অৱস্থা : প্ৰতিকুল অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।

মাটি আৰু পানী : লঘুৰ পৰা গধুৰ মাটি। স্প্ৰে'ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্কাৰ পানী।

প্ৰয়োগৰ বাবে শস্যৰ অৱস্থা: বনস্পতি অৱস্থা।

প্ৰয়োগৰ পদ্ধতি: স্প্ৰে'।

সঁজুলিৰ প্ৰকাৰ: নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ।

নজলৰ প্ৰকাৰ: ফ্লেট ফেন নজল।

মাত্ৰা : ওপৰৰ পৰামৰ্শলৈ চাওক।

মিশ্ৰণৰ বাবে নিৰ্দেশসমূহ: আৱশ্যকীয় পৰিমাণৰ চ'ডিয়াম এচিফ্লুঅ'ৰেফেন 16.5% + ক্লোডিনাফপ-প্ৰ'পাৰজাইল ৪% ইচি লৈ তাক অলপমান পানীত মিহলাওঁক আৰু এডাল মাৰিৰে ভালদৰে লৰাওঁক। আৱশ্যকীয় স্প্ৰে' আয়তন অনুসৰি বাকী থকা পানীখিনি ঢালি দিয়ক আৰু ভালদৰে মিলাই লওঁক।

পুনৰ প্ৰৱেশৰ সময় : 24 ঘন্টা।

চপোৱাৰ পূৰ্বৰ ব্যৱধান (অপেক্ষাৰ সময়) : ওপৰৰ পৰামৰ্শলৈ চাওক।

প্ৰয়োগৰ পদ্ধতি আৰু সময়: ছটিয়াওঁক, বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি বেলিকা ছটিয়াব লাগে।

প্ৰয়োগৰ সময়: চ'য়াবীন: সিঁচাৰ পাছত 20-24 দিনত যেতিয়া অপতৃণবোৰৰ 2-4 পাত ওলায়। ৰাজ্‌মা: সিঁচাৰ পাছত 20-25 দিনত যেতিয়া অপতৃণবোৰৰ 2-4 পাত ওলায়। সেউজীয়া গোটা মগুমাহ: সিঁচাৰ পাছত 20-25 দিনত যেতিয়া অপতৃণবোৰৰ 2-4 পাত ওলায়। চীনা বাদাম: সিঁচাৰ পাছত 20-25 দিনত যেতিয়া অপতৃণবোৰৰ 2-4 পাত ওলায়।

সৰ্বাধিক সংখ্যাৰ স্প্ৰে' সহ বাৰম্বাৰতা: এবাৰ প্ৰয়োগ।

যিটো পৰ্য্যায়ত কোনো শস্যত কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে : ওপৰৰ পৰামৰ্শলৈ চাওক।

উপকাৰীজনৰ ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ লোৱা সাৱধানতা : মৌ-মাখি আৰু মাছ, পশুধন, বনৰীয়া চৰাই আৰু জীৱ-জন্তুৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিলে সেই পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ নকৰিব।

সীমাবদ্ধ অঞ্চলত কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰ : অনুমতি দিয়া হোৱা নাই।

সতৰ্কবাণী : খালী পাত্ৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বিপদজনক।

ব্যৱহৃত কণ্টেইনাৰৰ সুৰক্ষিত নিষ্পত্তিৰ বাবে দিশ: 1. এয়া নিৰ্মাতা, অপতৃণনাশক প্ৰস্তুতকাৰী, অপাৰেটৰৰ দায়িত্ব হ'ব যে বৈ যোৱা বোৰ যাতে সুৰক্ষিত ভাৱে ধুই পেলায় বা নষ্ট কৰে যাতে প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষণ আৰু জল প্ৰদূষণৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যায়। 2. ব্যৱহৃত কণ্টেইনাৰ বোৰ বাহিৰত পেলাই থোৱা অনুচিত যাতে তাৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহয়। 3. কণ্টেইনাৰ বোৰ নষ্ট কৰি দূৰত গাত খান্দি পুতি পেলাওঁক।

বিষক্ৰিয়াৰ সংকেত আৰু লক্ষণসমূহ: চকুত বিৰক্তি লগা, ছালত বেছিকৈ বিৰক্তি লগা, শ্বসন নলীত অস্বস্তি লগা, অপশ্বাস, লেলাউটি ওলোৱা, নিষ্ক্ৰিয় হোৱা, গতিবিভ্ৰম, নাকেৰে পানী বৈ অহা আদি লক্ষণসমূহে দেখা দিব পাৰে।

সংগ্ৰহালয়: 1. অপতৃণনাশক থকা পেকেটবোৰ টানকৈ বন্ধ কৰি, অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা দূৰৈত, ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নোপোৱা ঠাইত আৰু জীৱ-জন্তুৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত বা অপতৃণনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত। 2. অপতৃণনাশকবোৰ ভাণ্ডাৰিত কৰিবৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কোঠা বা চৌহদসমূহ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰা, শুকান আৰু ভালদৰে পোহৰ আৰু বায়ু চলাচল কৰা আৰু পৰ্য্যাপ্ত মাত্ৰাৰ হ'ব লাগিব।

বিষাক্ত হ'লে ল'বলগীয়া চিকিৎসা : কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষনাশক নাই। লক্ষণগত ভাৱে চিকিৎসা কৰাওঁক।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা : যদি গিলা গৈছে : মানুহজন যদি সজাগ আৰু সচেতন হৈ আছে, মুখখন পানীৰে আখলি দিয়ক আৰু 1 বা 2 গিলাছ পানী খাবলৈ দিয়ক। অজ্ঞান হৈ থাকিলে ৰোগীজনক মুখেৰে কিবা খুওৱাৰ চেষ্টা নকৰিব। ততালিকে এগৰাকী চিকিৎসকক মাতক। তাত থকা চিকিৎসকৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে ৰোগীজনক বমি কৰোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব। **যদি উশাহত গৈছে :** ৰোগীজনক বিশুদ্ধ বতাহ চলাচল কৰা ঠাইলৈ লৈ যাওঁক আৰু শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ প্ৰতি যত্ন লওঁক। যদি ৰোগীজনে উশাহ লোৱা নাই বা উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে, তেন্তে তেখেতক কৃত্ৰিম শ্বাস প্ৰশ্বাস দিয়ক, যদি 'মাউথ টু মাউথ' দিব পাৰে সেয়া ভাল হয় আৰু ততালিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওঁক। **যদি ছালত লাগি আছে :** চুলি আৰু নখকে ধৰি দূষিত হোৱা শৰীৰৰ অংগবোৰ চাবোন আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ভালদৰে ধুই পেলাওঁক। যদি অস্বস্তি, ৰঙা পৰা আৰু বিষ হৈয়েই থাকে, এগৰাকী চিকিৎসকক মাতক। সকলো প্ৰদূষিতকাপোৰ আদি সঠিকভাৱে পানী আৰু চাবোনেৰে ভালদৰে ধুই পৰিস্কাৰ কৰাৰ পিছহে মাথো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। **চকুত লাগি প্ৰদূষিত হ'লে :** পৰ্য্যাপ্ত পৰিস্কাৰ পানীৰে অতিকমেও 15 মিনিটৰ বাবে মৃদুভাৱে পখালি ধুই লওঁক। যদি একেৰাহে বিষ হয়, বিৰক্তি লাগে, ৰঙা পৰে বা চকুত পোহৰে চাট মাৰি ধৰে তেন্তে আপোনাৰ চকুৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওঁক।

ব্যৱহাৰকাৰীৰ দ্বাৰা ল'বলগীয়া সতৰ্কতাসমূহ : 1. স্প্ৰে' ছটিওৱা ব্যক্তিজনে সঠিক সুৰক্ষামূলক পোছাক যেনে টুপি, দীঘল হাতৰ শ্বাৰ্ট, দীঘল পেণ্ট আৰু জোতা পিন্ধি ল'ব লাগে। 2. যেতিয়া অৱদ্ৰৱ স্প্ৰে' মিশ্ৰণ কাম কৰা হয়, তেতিয়া চকু আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব। স্প্ৰে' কুঁহুৰিকণা উশাহত পেটৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব। ছটিওৱাৰ পাছত চাবোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুই পেলাওক। প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত কোনো বস্তু নাখাব, পানীয় নাখাব বা ধূমপান নকৰিব। 3. দূষিত হোৱা কাপোৰবোৰ সলাই পেলাব আৰু পুনৰ সেইবোৰ পৰিধান কৰাৰ আগতে ধুই ল'ব। খালী পাত্ৰবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। 4. কাম হোৱাৰ পাছত আৰু খোৱাৰ আগতে চাবোন আৰু পানীৰে হাত আৰু ওলাই থকা শৰীৰৰ অংগবোৰ ভালদৰে ধুই ল'ব। 5. এই অপতৃণনাশক ছটিওৱাৰ পাছত স্প্ৰেয়াৰ আৰু বাচন-বৰ্তনবোৰ চাবোন আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'ব।

সতৰ্কতামূলক বিবৃতি: 1. লিফলেট আৰু লেবেলত দেখুওৱা ধৰণৰ বাহিৰে অন্য কোনো উদ্দেশ্যত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। 2. ব্যৱহাৰৰ পিছত লিফলেটত দেখুওৱা ধৰণে কৰ্ণেইনাৰ বোৰ নষ্ট কৰি পেলাওক। 3. এই উৎপাদন মাছ আৰু জলজ সম্পদৰ বাবে অতিশয় বিষাক্ত আৰু সেইবাবে জলাশয়ৰ আশে-পাশে এই উৎপাদন প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত।

Bengali

হটশ্যোর

আগাছানাশক

ঋসোডিয়াম অ্যাসিফ্লুয়রফেন ১৬.৫% ও ক্লডিনাফপ-প্রপারজিল ৮% ইসি

সোডিয়াম অ্যাসিফ্লুয়রফেন ১৬.৫% ও ক্লডিনাফপ-প্রপারজিল ৮% ইসি হল, সয়াবিন, মাষকলাই, মুগ ডাল এবং চিনাবাদামের ক্ষেত্রে ঘাস জাতিয় এবং চওড়া পাতার আগাছা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, নির্বাচনভিত্তিক উদ্ভব পরবর্তী আগাছানাশক।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ:

সংমিশ্রণ:	:	উপাদান (% ওজন ⁄ ওজন)
সোডিয়াম অ্যাসিফ্লুয়রফেন সক্রিয় উপাদান	:	১৬.৫০
কল্ডিনাফপ-প্রোপারজিল সক্রিয় উপাদান	:	৮.০০
মিশ্রিত জাইলিন	:	১৬.০০
অ্যালকোহল ইথক্সিলেট এবং অ্যালকাইল ফেনল ইথক্সিলেটের মিশ্রণ	:	১৮.২৫
ক্যালসিয়াম ডোডেসিল বেঞ্জিন সালফোনেট	:	০.৭৫
সাইক্লোহেক্সানন	:	যথেষ্ট পরিমাণ
মোট	:	১০০.০০

সুপারিশ:

ফসল	চিহ্নিত আগাছা	হেক্টর পিছু মাত্রা: সঃউঃ (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	তরলীকরণের জল (লিঃ)	বশেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
সয়াবিন	**ঘাসজ আগাছা:** শ্যামা ঘাস (এচিনোক্লোয়া স্পাঃ), কোদাই (ইলিউসাইন ইন্ডিকা), কেওয়াই (ডিজিটারিয়া স্যাঙ্গুনালিস), মাকড়া (ড্যাক্টাইলক্টিনিয়াম এজিপ্টাম) **চওড়া পাতাযুক্ত আগাছা:** কপার লিফ (অ্যাকাইলিফা ইন্ডিকা), হাজারদানা (ফাইলান্থাস নিরুরি), কাঁশিরা (কমেলিনা বেঙ্গালিনসিস), লাটামারি (ডিগেরো আর্ভেন্সিস), কুকস কম্ব (সিলোসিয়া আর্জেন্টিনা), দুধিয়া (ইউফোর্বিয়া স্পাঃ), ক্যারট গ্রাস (পার্থেনিয়াম স্পাঃ), বনটেপারি (ফাইসালিস মিনিমা), পুনর্ণভা (ত্রিয়াস্থিমা মোনোগায়না), হুরহুর (ক্লিওমা ভিসকোসা), ছাঁচি (অল্টারনান্থেরা ফিলক্সিরইডস), জংলী নটে (অ্যামারান্থাস স্পাঃ), চিকউইড (স্টেলারিয়া মিডিয়া)	১৬৫ ও ৮০	১০০০	৫০০	৬১
মাষকলাই ডাল	**ঘাস জাতিয় আগাছা:** শ্যামা ঘাস (এচিনোক্লোয়া স্পাঃ), কোদাই (ইলিউসাইন ইন্ডিকা) **চওড়া পাতা আগাছা:** হাজারদানা (ফাইল্যান্থাস নাইরুরি), লাটামারি (ডিগেরো আর্ভেন্সিস), কপার লিফ (অ্যাকালাইফা ইন্ডিকা), ককস কম্ব (সেলোসিয়া আর্জেন্টি), কংগ্রেস গ্রাস (পার্থেনিয়াম হিস্টেরোফোরাস)	১৬৫ ও ৮০	১০০০	৫০০	৫৪
মুগ ডাল	**ঘাস জাতিয় আগাছা:** শ্যামা ঘাস (এচিনোক্লোয়া স্পাঃ), ক্র্যাব গ্রাস (এলিউসাইন ইন্ডিকা), মাকড়া (ড্যাক্টাইলক্টিনিয়াম এজিপ্টাম) **চওড়া পাতা আগাছা:** কাঁশিরা (কমেলিনা বেঙ্গালিনসিস), জংলী নটে (অ্যামারান্থাস স্পাঃ), লাটামারি (ডিগেরো আর্ভেন্সিস), পুনর্ণভা (ত্রিয়াস্থিমা মোনোগায়না)	১৬৫ ও ৮০	১০০০	৫০০	৫৪
চিনাবাদাম	**ঘাস জাতিয় আগাছা:** শ্যামা ঘাস (এচিনোক্লোয়া স্পাঃ), কোদাই (ইলিউসাইন ইন্ডিকা), কেওয়াই (ডিজিটারিয়া স্যাঙ্গুনালিস), **চওড়া পাতা আগাছা:** দুধি (ইউফোর্বিয়া জেনিকিউলাটা), হাজারদানা (ফাইলান্থাস নিরুরি), ফল্স অ্যামারান্থাস (ডাইজেরিয়া আর্ভেনসিস)	১৬৫ ও ৮০	১০০০	৫০০	৫৪

স্বহাওয়ার অবস্থা: অসুবিধাজনক অবস্থার সময়ে ব্যবহার করা যাবে না।

মাটি এবং জল: হালকা থেকে ভারী মাটি। স্প্রে করার জন্য পরিস্কার জল ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগের জন্য উদ্ভিদের পর্যায়: উদ্ভিজ্জ পর্যায়

প্রয়োগ পদ্ধতি: স্প্রে।

প্রয়োগ সরঞ্জামের ধরন: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার।

নজল টাইপ: ফ্ল্যাট ফ্যান নজল

মাত্রা: উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ প্রস্তুত করার নির্দেশাবলী: সোডিয়াম অ্যাসিফ্লুয়রফেন ১৬.৫% ও ক্লডিনাফপ-প্রপারজিল ৮% ও/ও ইসি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে পাতলা করে নিন এবং এটিকে ভালোভাবে মেশানোর জন্য একটি কাঠির সাহায্যে ভালোভাবে নাড়ুন। তারপরে প্রয়োজনীয় স্প্রে পরিমাণ অনুযায়ী অবশিষ্ট পরিমাণ জল যোগ করুন এবং পুনরায় নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভালোভাবে মেশান।

পুনঃপ্রবেশের সময়কাল: ২৪ ঘন্টা।

ফসল তোলার পূর্বে বিরতি (অপেক্ষার সময়কাল): উপরোক্ত সুপারিশ দেখে নিন।

প্রয়োগ পদ্ধতি এবং সময়: স্প্রে করা, এটি প্রয়োগ করতে হবে বাঞ্ছনীয়ভাবে ভোর অথবা সন্ধ্যাবেলা।

প্রয়োগের সময়: সয়াবিন: রোপণের ২০-২৪ দিন পরে, যখন আগাছাগুলি ২-৪টি পাতার স্তরে থাকে। মাষকলাই ডাল: রোপণের ২০-২৫ দিন পরে, যখন আগাছাগুলি ২-৪টি পাতার স্তরে থাকে। মুগডাল: রোপণের ২০-২৫ দিন পরে, যখন আগাছাগুলি ২-৪টি পাতার স্তরে থাকে। চিনাবাদাম: রোপণের ২০-২৫ দিন পরে, যখন আগাছাগুলি ২-৪টি পাতার স্তরে থাকে।

ফ্রিকোয়েন্সি সহ সর্বাধিক সংখ্যক স্প্রে: একবার প্রয়োগ।

যে পর্যায়ে কোন শস্যের উপরের ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়: উপরের সুপারিশ দেখুন।

উপকারী প্রাণীগুলির ক্ষতি এড়ানোর জন্য গ্রহণীয় সাবধানতা: সেই সকল পরিস্থিতিগুলিতে ব্যবহার করবেন না যদি মৌমাছি এবং মাছ, গবাদি পশু, বন্য পাখি এবং পশুগুলির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিষাক্ততা: সুপারিশ অনুসারে ব্যবহার করা হলে পণ্যটি উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত নয়।

বদ্ধ স্থানে ছত্রাকনাশকগুলির ব্যবহার: অনুমোদিত নয়।

সতর্কতা: খালি কন্টেনারগুলি পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

ব্যবহৃত কন্টেনার নিরাপদভাবে নষ্ট করার জন্য নির্দেশিকা: ১. ছত্রাকনাশকটির প্রস্তুতকর্তা, উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারীদের দায়িত্ব হবে প্যাকেজগুলিকে অথবা অতিরিক্ত উপাদান এবং ধোয়া জলগুলিকে একটি নিরাপদ উপায়ে নষ্ট করা যাতে পরিবেশ এবং জল দূষণের প্রতিরোধ করা যায়। ২. প্যাকেজগুলির পুনর্ব্যবহার রোধ করার জন্য, সেগুলিকে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। ৩. প্যাকেজগুলিকে ভেঙে ফেলতে হবে এবং লোকালয়ের থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি: তীব্র চোখের অস্বস্তি, প্রচণ্ড ত্বকের অস্বস্তি, শ্বাসনালীর অস্বস্তি, অজীর্ণতা, লালা ঝরা, সক্রিয়তা কমা, দুর্বলতা, নাক দিয়ে জল পড়া ঘটতে পারে।

মজুতকরণ: ১. ছত্রাকনাশক থাকা প্যাকেজগুলিকে, ছত্রাকনাশকগুলির পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলভাবে অন্যান্য উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে খাদ্য উপাদানগুলিকে মজুত করার স্থান থেকে দূরে একটি পৃথক ঘর অথবা স্থানে অথবা পৃথক আলমারিতে তালা-বদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। ২. বাষ্পের দ্বারা দূষণ এড়ানোর উদ্দেশ্যে, ছত্রাকনাশক রাখার ঘর অথবা স্থানটি হবে সুগঠিত, উত্তম আলোযুক্ত, শীতল, বাতাসযুক্ত এবং পর্যাপ্ত মাপের।

বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা: কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নাই। উপসর্গের ভিত্তিতে চিকিৎসা করুন।

প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি খেয়ে ফেলা হয়ে থাকে: যদি ব্যক্তিটি সচেতন এবং সতর্ক থাকেন, তাহলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে দিন এবং পান করার জন্য ১ অথবা ২ গ্লাস জল দিন। কখনওই একজন অচেতন ব্যক্তির মুখের মাধ্যমে কোন কিছু দেবেন না। একজন চিকিৎসককে ডাকুন। যদি না চিকিৎসাকারী চিকিৎসকের দ্বারা নির্দেশিত হয়, তাহলে জোর করে বমি করাবেন না। **যদি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়ে থাকে:** রোগীকে তাজা বাতাসযুক্ত স্থানে নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার উপর নজর রাখুন। যদি রোগী শ্বাস না নেন অথবা কষ্ট করে শ্বাস নেন, তাহলে কৃত্রিম শ্বাস প্রদান করুন, বাঞ্ছনীয়ভাবে মুখের থেকে মুখের মাধ্যমে। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **ত্বকের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে:** সাবান এবং প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে, চুল এবং নখের নীচগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, শরীরের প্রভাবিত হওয়া স্থানগুলিকে ধুয়ে দিন। যদি যন্ত্রণা, লালভাব অথবা অস্বস্তি চলতে থাকে, তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দূষিত হওয়া সকল পোশাকগুলিকে পৃথক করে এবং ব্যবহারের পূর্বে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে কেচে নিতে হবে। **চোখের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে:** কমপক্ষে ১৫ মিনিট যাবত প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে চোখ ধুয়ে দিন। যদি যন্ত্রণা, অস্বস্তি, লালভাব অথবা আলোর ক্ষেত্রে অসুবিধা চলতে থাকে, তাহলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ব্যবহারকারীদের দ্বারা সাবধানতা: ১. যে ব্যক্তি স্প্রে করবেন তাকে উপযুক্ত সুরক্ষামূলক পোশাক যেমন টুপি, ফুল হাতা জামা, ফুল প্যান্ট এবং জুতো ব্যবহার করতে হবে। ২. ঘনীভূত স্প্রে দ্রবণ প্রয়োগ করার সময় চোখ এবং ত্বকের সাথে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। স্প্রে ধোঁয়াশায় শ্বাস নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ব্যবহার করার পরে সাবান এবং জল দিয়ে যথাযথভাবে ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োগ করার সময় কোনো কিছু খাবেন না, পান করবেন না বা ধূমপান করবেন না। ৩. দূষিত পোশাক আলাদা করে রাখুন এবং পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। খালি কৌটো পুনরায় ব্যবহার করবেন না। ৪. খাবার খাওয়ার পূর্বে এবং কাজ সম্পন্ন করার পূর্বে সাবান এবং জল দিয়ে হাত এবং শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ৫. এই ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরে স্প্রেয়ার এবং ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে প্রচুর পরিমাণে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে।

সতর্কতামূলক বিবৃতি: ১. লেবেল এবং তথ্যপত্রে বিবৃত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ২. তথ্যপত্রে নির্দেশিত অনুসারে, ব্যবহারের পরে কন্টেনারটিকে নষ্ট করে দিন। ৩. পণ্যটিকে মাছ, জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং মৌমাছির ক্ষেত্রে বিষাক্ত হিসাবে জানানো হয়েছে। জলাশয়ের আশ-পাশে এবং মৌমাছিগুলির সক্রিয়ভাবে মধু সংগ্রহের সময়ে এটির ব্যবহার এড়িয়ে যেতে হবে।

Tamil

ஹாட்ஷ்யோர்

களைக்கொல்லி

சோடியம் அசிஃபுளோர்ஃபென் 16.5% + குளோடினாஃபோப்-புரபார்கைல் 8% இசி

சோடியம் அசிஃபுளூவோர்ஃபென் 16.5% குளோடினாஃபோப் புரொபார்கைல் 8% இசி முளைவிட்டு வளர்ந்திருக்கும் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் ஒரு தேர்நிலை களைக்கொல்லி, சோயாபீன், உளுந்து, பச்சைப் பயறு மற்றும் நிலக்கடலை பயிர்களில் புல்வகை மற்றும் அகன்ற இலைக் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும்.

வேதியியல் கூட்டு:

கூட்டுப்பொருட்கள்	:	சேர்க்கை அளவு (% எ/எ)
சோடியம் அசிஃபுளோர்ஃபென் வீரியப் பொருள்	:	16.50
குளோடினாஃப்போஃப் - புரஜார்கைல் வீரியப் பொருள்	:	8.00
மிக்ஸ்ட் கிஸைலீன்	:	16.00
பிளெண்ட் ஆஃப் அல்கஹால் இதோக்ஸைலேட் மற்றும் அல்கைல் ஃபினோல் இதோக்ஸைலேட்	:	18.25
கால்சியம் டோடிசைல் பென்ஜீன் சல்ஃபோனேட்	:	0.75
சைக்ளோஹெக்ஸனோன்	:	கி.கு.
மொத்தம்	:	100.00

பரிந்துரை:

பயிர்	களைகள்	மருந்தளவு / ஹெக்.: ஏ.ஐ. கிராம்)	தயாரிப்பு (மிலி)	கரைசல் தண்ணீரில் (லி)	கடைசி தெளிப்புக்கும் பிறகு அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
சோயாபீன்	**புல் வகை களைகள்:** பண்ணை முற்ற புல் அரிசிப்புல் (எகினோக்லோவா எஸ்பிபி.) நண்டு புல் (எலுசைன் இண்டிகா) மாதங்கி புல் (டிஜிடாரியா சங்குனலிஸ்) மாதங்கி புல் (டாக்டைலோக்டானியம் ஏஜிப்டியம்) **அகன்ற இலை களைகள்:** குப்பைமேனி (அகலிஃபா இண்டிகா) கீழாநெல்லி (ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி) ஆண்டு தின்னா தனை (கமிலினா பெங்கலின்சிஸ்) பூக்கீரை (டைஜிரா அர்வென்சிஸ்) பண்ணைக்கீரை (செலோசியா அர்ஜெண்டியே) கள்ளி (இஃபோபியா எஸ்பிபி.) சிறுதக்காளி (பைசாலிஸ் மினிமா) (டிரையந்திமா மோனோகைனா), நாய்வேளை (கிளியோன் விஸ்கோசா) (அல்டெர்னந்திரா பிலோக்ஸெராய்டிஸ்) பச்சை முளைக்கிரை (அமரந்தஸ் எஸ்பிபி.) சிக்வீட் (ஸ்டெல்லாரியா மீடியா)	165 + 80	1000	500	61
உளுந்து	**புல் வகை களைகள்:** பண்ணை முற்ற புல் அரிசிப்புல் (எகினோக்லோவா கோலோனா), நண்டு புல், (எலுசின் இண்டிகா) **அகன்ற இலைக் களைகள்:** கீழாநெல்லி (ஃபிலாந்தஸ் நிரூரி), பூக்கீரை (டைகொரா அர்வென்சிஸ்), கோழிப்பூண்டு (அகலைஃபா இண்டிகா), பண்ணைக்கீரை (செலோசிஅ அர்ஜெண்டியே) கேரட் புல் (பார்த்தீனியம் ஹிஸ்டிரோபோரஸ்)	165 + 80	1000	500	54
பச்சைப் பயறு	**புல் வகை களைகள்:** பண்ணை முற்ற புல் அரிசிப்புல் (எகினோக்லோவா கோலோனா,), நண்டு புல் (எலுசின் இண்டிகா) மாதங்கி புல் (டாக்டைலோக்டினியம் ஏஜிப்டிகம் **அகன்ற இலைக் களைகள்:** ஆடு தின்னா தனை (கம்மலினா பெங்கலென்சிஸ்), பச்சை முளைக்கீரை(அமரந்தஸ் விரிடிஸ்), பூக்கீரை (டைகொரா அர்வென்சிஸ்) டிரையந்திமா மோனோகைனா	165 + 80	1000	500	54
நிலக்கடலை	புல் வகை களைகள்: பண்ணை முற்ற புல் அரிசிப்புல் (எகினோக்லோவா கோலோனா,), நண்டு புல் (எலுசின் இண்டிகா) மாதங்கி புல் (டிஜிடாரியா சன்குயினலிஸ்) அகன்ற இலைக் களைகள்: சுரைக்காய் (இபோர்பியா ஜெனிகுலாடா) ஹஜார்தானா (பைலாந்தஸ் நிரூரி), பூக்கீரை (டைகொரா அர்வென்சிஸ்)	165 + 80	1000	500	54

பருவ நிலைகள்: சாதகமற்ற நிலைகளின் போது பயன்படுத்தக் கூடாது.

மண் மற்றும் தண்ணீர்: இலகுவானது முதல் அடர்ந்த மண். தெளிப்புக்கு சுத்தமான தண்ணீரை தான் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மருந்து தெளிப்பும் பயிர் பருவமும்: இலை தழைகளுடன் வளரும் கட்டம்

மருந்து தெளிக்கும் முறை: தெளிப்பு.

கருவி வகை: நாப்சாக் ஸ்பிரேயர்

கூம்பு வகைகள்: தட்டை விசிறி கூம்பு முனை

மருந்தளவு: மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.

மருந்து தயாரிக்கும் குறிப்புகள்: சோடியம் அசிஃபுளூவோர்ஃபென் 16.5% குளோடினாஃபோப் புரொபார்கைல் 8% எ/எ இசி மருந்துடன் சிறிதளவு நீரைச் சேர்த்து தாய்க்கரைசலாக ஒரு குச்சியைப் பயன்படுத்தி நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். அதனுடன், மீதமிருக்கும் நீரையும் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கி தெளிப்புக் கரைசலைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: 24 மணி நேரம்

அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி (காத்திருக்கும் காலம்): மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.

தெளிக்கும் முறையும் காலமும்: இலை தெளிப்பு, பொதுவாகக் காலை அல்லது மாலை நேரத்தில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்தும் காலம்: பயன்படுத்தும் காலம்: சோயாபீன்: களைகள் 2-4 இலைகளுடன் வளர்ந்திருக்கும் போது அதாவது விதைத்த 20-24 நாட்களுக்குப் பிறகு மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். உளுந்து: களைகள் 2-4 இலைகளுடன் வளர்ந்திருக்கும் போது அதாவது விதைத்த 20-25 நாட்களுக்குப் பிறகு மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். பச்சைப் பயறு களைகள் 2-4 இலைகளுடன் வளர்ந்திருக்கும் போது அதாவது விதைத்த 20-25 நாட்களுக்குப் பிறகு மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். நிலக்கடலை : களைகள் 2-4 இலைகளுடன் வளர்ந்திருக்கும் போது அதாவது விதைத்த 20-25 நாட்களுக்குப் பிறகு மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

தெளிப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் அதிக பட்ச தெளிக்கும் தடவைகள்: ஒரு பயன்பாட்டிற்கு.

எந்தவொரு பயிருக்கும் களைக்கொல்லி தெளிக்கக் கூடாத கட்டம்: மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பரிந்துரைப்பை பார்க்கவும்.

நன்மை தருபவைகளுக்கு தீங்கை தவிர்க்க எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை: தேனீக்கள், மீன், கால்நடைகள், காட்டுப் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு தீங்கு ஏற்படும் சாத்தியமுள்ள சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் களைக்கொல்லிகள் பயன்பாடு: அனுமதிக்கப்படாது.

எச்சரிக்கை: காலி கொள்கலன்களை திரும்ப பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தும் வழிமுறை: 1. பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் கழுவும் தண்ணீரை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்க ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவது களைக்கொல்லி தயாரிப்பாளர்கள், ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் அதை தெளிப்பவர்கள் ஆகியோரின் கடமை ஆகும். 2. பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்களை திரும்பவும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க வெளியே அப்படியே விடக்கூடாது. 3. பேக்கேஜ்களை உடைத்து மற்றும் குடியிருப்பில் இருந்து தூரமாக புதைக்க வேண்டும்.

நச்சு ஏறியதன் அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்: தீவிர கண் எரிச்சல், தாங்க முடியாத சரும அரிப்பு, சுவாச வழிகளில் அசௌகரியங்கள், சுவாச சிரமம், உமிழ்நீர் சுரத்தல், மந்த நிலை, உடல் தள்ளாட்டம், மூக்கு ஒழுகுதல், ஆகியவை தோன்றும்.

சேமித்தல்: 1. களைக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட வேறு பொருட்களை சேமித்து வைக்க பயன்படுத்தும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமித்து வைக்க வேண்டும் அல்லது களைக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையை பொறுத்து பூட்டு சாவி உள்ள தனி அலமாரியில் வைக்கப்பட வேண்டும். 2. களைக்கொல்லியை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த மற்றும் நல்ல வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும், மற்றும் போதிய பரிமாணம் கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

நச்சு ஏறியிருந்தால் சிகிச்சை: பிரத்யேக நச்சுமுறிவு அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

முதலுதவி நடவடிக்கை: விழுங்கியிருந்தால்: நபர் சுயநினைவுடன் மற்றும் விழிப்புடன் இருந்தால், வாயை கொப்பளிக்க தண்ணீர் கொடுக்கவும் மற்றும் குடிப்பதற்கு 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுக்கவும். சுயநினைவற்ற ஒரு நபருக்கு வாய்வழியே எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரை அழைக்கவும். கவனிக்கும் மருத்துவர் கூறும் வரை மற்றும் கூறினால் ஒழிய அவரை வாந்தி எடுக்கச் செய்யக் கூடாது. **உட்சுவாசித்திருந்தால்:** நோயாளியை காற்றோட்டமான பகுதிக்கு கொண்டு செல்லவும் மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை கவனித்தில் எடுக்கவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமப்பட்டு சுவாசிக்கிறார் என்றால் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும், வாயில் வாயை வைத்து காற்றை ஊதுவது உசிதமானது. ஒரு மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும். **சருமத்தில் பட்டிருந்தால்:** தலைமுடி மற்றும் விரல் நகங்களுக்கு அடியில் உள்பட பாதிக்கப்பட்ட உடல் பாகங்களை சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீரால் நன்கு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால், ஒரு மருத்துவருடன் ஆலோசிக்கவும். மாசுபட்ட துணிகள் அனைத்தையும் தனியாக வைக்கவும் மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தனியாக சோப்பு போட்டு மற்றும் தண்ணீரில் அலசவும். **கண்ணில் பட்டு விட்டால்:** குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு நிறைய தண்ணீரில் இதமாக கண்களை கழுவவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல், அல்லது போட்டோபோபியா நீடித்தால் கண் நிபுணருடன் ஆலோசிக்கவும்.

பயன்படுத்துவோருக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைத் தெளிப்பவர் பொருந்தும் பாதுகாப்பு ஆடைகளாக தலை தொப்பி, முழுக்கை சட்டை, முழுக்கால் பேன்ட் மற்றும் ஷூ அணிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். 2. கரைசல் செறிவு திரவத்தைக் கையாளும் போது அது தெறித்து கண்களில் மற்றும் சருமத்தில் பட்டுவிடாமல் கவனமாகக் கையாள வேண்டும். மருந்து காற்றைச் சுவாசிக்கக் கூடாது. மருந்தைக் கையாண்ட பிறகு, சோப்பு போட்டு நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். மருந்தைத் தெளிக்கும் போது சாப்பிடுதல், குடித்தல், மெல்லுதல் கூடாது. 3. மாசுபட்ட ஆடைகளைக் கழற்றி துவைத்து உலர்த்திய பிறகே மறுபடியும் அணிய வேண்டும். காலி கொள்கலன்களை ஒருபோதும் மறுஉபயோகம் செய்யக்கூடாது. 4. மருந்தைக் கையாண்ட பிறகு கைகால்களை சோப்பு போட்டு சுத்தம் செய்துகொண்ட பிறகே சாப்பிட வேண்டும். 5. களைக்கொல்லி மருந்தைத் தெளித்த பிறகு தெளிப்பான்களையும் மற்ற பாத்திரங்களையும் சோப்பு போட்டு சுத்தமாக அலம்பி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

எச்சரிக்கை அறிக்கை: 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளது தவிர இதர நோக்கம் எதற்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது; 2. பயன்படுத்தியப் பிறகு துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டப்படி கொள்கலனை அழித்து விடவும். 3. இந்த தயாரிப்பு நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் மீன்களுக்கும் கொடிய நஞ்சாகும் என்பதால் நீர்நிலை அருகில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

Telugu

హాట్‌ష్యూర్

కలుపుమొక్కల నాశిని

సోడియమ్ ఆసిఫ్లోరఫెన్ 16.5% + క్లోడినాఫాప్- ప్రొపర్‌జల్ 8% ఇసి

సోడియమ్ ఆసిఫ్లోరఫెన్ 16.5% + క్లోడినాఫాప్- ప్రొపర్‌జల్ 8% ఇసి సోయాబీన్, మినుము, పెసర మరియు వేరుశనగ పంటల్లో గడ్డి జాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులున్న కలుపుమొక్కలను మొలకెత్తిన తరువాత ఎంచుకుని నాశనం చేయడానికి వాడే కలుపునాశిని.

రసాయనిక మిశ్రణం:

మిశ్రమం	:	కలిగివుయున్నది (% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు)
సోడియమ్ ఆసిఫ్లోరఫెన్ క్రియాశీల పదార్థం	:	16.50
క్లోడినాఫాప్- ప్రొపర్‌జల్ క్రియాశీల పదార్థం	:	8.00
మిక్స్‌డ్ క్సైలీన్	:	16.00
ఆల్కహాల్ ఎథాక్సైలేట్ మరియు ఆల్కయిల్ ఫెనాల్ ఎథాక్సైలేట్ యొక్క మిశ్రమం	:	18.25
కాల్షియమ్ డోడెసైల్ బెంజెన్ సల్ఫొనేట్	:	0.75
సైక్లోహెక్సానన్	:	కావలసినంత
మొత్తం	:	100.00

సిఫారసులు:

పంట	లక్ష్యంగా చేసుకున్న కలుపుమొక్కలు	హెక్టారుకు మోతాదు: ఎ.ఐ. (గ్రా)	మిశ్రణం (మి.లీ)	నీటిలో కలుపవలసినది (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి పంట కోత వరకు వేచియుండవలసిన సమయం (రోజులు)
సోయాబీన్	**గడ్డి మొక్కలు:** ఊద గడ్డి (ఎకినోక్లోవా ఎస్‌పిపి) కావలి గడ్డి (ఎల్యూసిన్ ఇండికా) చెంచలికూర (డిజిటేరియా సాంగుయినాలిస్) నక్షత్రగడ్డి (డాక్టిలోక్టేనియమ్ ఆజిప్టియమ్) **వెడల్పాటి ఆకులున్న కలుపుమొక్కలు:** రాగి ఆకు (అకాలైఫ్ ఇండికా) హజార్దానా (ఫైలాంథస్ నిరురి) వెన్నదీవి కూర (కామెలినా బంగాలిసెన్సిస్) పిచ్చితోటకూర (డిజెరా అర్వెన్సిస్) గురుగు (సెలోసియా అర్జెంటీయా)80+ చేమకు (యుఫోర్బియా ఎస్‌పిపి) మార్చర్ల కంప (పార్థీనియమ్ ఎస్‌పిపి) పాపొటన్ (ఫైసాలిస్ మినిమా) గలిజేరు (ట్రియాంథెమా మోనోగైనా) స్టికీ స్టియోమ్ (క్లోస్ విస్కొసా) అలిగేటర్ కలుపుమొక్క (ఆల్టెర్నాంథెరా ఫిలోక్సెరోయిడెస్) చిలక తోటకూర (అమరాంథస్ ఎస్‌పిపి) చిక్ వీడ్ (స్టెల్లారియా మీడియా)	165 + 80	1000	500	61
మినుము	**గడ్డిజాతి కలుపులు:** బార్న్ యార్డ్ గ్రాస్ (ఇకినోక్లోవా కోలోన) క్రాబ్ గ్రాస్ (ఎలూసిన్ ఇండికా) **వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులు:** హజార్దానా (ఫైలాంథస్ నిరురి) పిచ్చితోటకూర (డిజెరా అర్వెన్సిస్) రాగి ఆకు (అకాలైఫ్ ఇండికా) గురుగు (సెలోసియా అర్జెంటీయా) కాంగ్రెస్ గ్రాస్ (పార్థీనియమ్ హిస్టెరోఫొరస్)	165 + 80	1000	500	54
పెసర	**గడ్డిజాతి కలుపులు:** బార్న్ యార్డ్ గడ్డి (ఎకినోక్లోవా కోలోన), కావలి గడ్డి (ఎల్యూసిన్ ఇండికా), నక్షత్రగడ్డి (డాక్టిలోక్టేనియమ్ ఆజిప్టియమ్) **వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులు:** వెన్నదీవి కూర (కామెలినా బంగాలిసెన్సిస్), గ్రీన్ అమరంథ్ (అమరాంథస్ విరిడిస్), పిచ్చితోటకూర (డిజెరా అర్వెన్సిస్), గలిజేరు (ట్రయాంథెమా మోనోగైనా)	165 + 80	1000	500	54
వేరుశనగ	**గడ్డిజాతి కలుపులు:** బార్న్ యార్డ్ గ్రాస్ (ఇకినోక్లోవా కోలోన), క్రాబ్ గ్రాస్ (ఎలూసిన్ ఇండికా) చెంచలికూర (డిజిటేరియా సాంగుయినాలిస్) **వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులు:** దూధి (యుఫోర్బియా జెనికులాటా), హజార్దానా (ఫైలాంథస్ నిరురి) పిచ్చితోటకూర (డిజెరా అర్వెన్సిస్)	165 + 80	1000	500	54

వాతావరణ పరిస్థితులు: పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఉపయోగించకూడదు.

నేల మరియు నీరు: తేలికపాటి నుంచి భారీ నేలలు. పిచికారి చేసేందుకు పరిశుభ్రమైన నీటిని ఉపయోగించాలి.

వినియోగించేందుకు పంట దశ: పైరు దశ

వినియోగించవలసిన టెక్నిక్‌లు: పిచికారి

పరికరం రకం: న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్

నాజిల్ రకాలు: ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్

మోతాదులు: పై సిఫారసు చదవండి.

Kannada

ಹಾಟ್‌ಶ್ಯೋರ್

ಕಳೆನಾಶಕ

ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಫ್ಲುರ್‌ಫೆನ್ 16.5%+ ಕ್ಲೊಡಿನಾಫೋಪ್ - ಪ್ರೊಪರ್‌ಗೈಲ್ 8% ಇಸಿ

ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಫ್ಲುರ್‌ಫೆನ್ 16.5%+ ಕ್ಲೊಡಿನಾಫೋಪ್ – ಪ್ರೊಪರ್‌ಗೈಲ್ 8% ಇಸಿ ಆಯ್ದ ಬೆಳೆದ ಕಳೆಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲ್ಲಿನಂತಹ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಪ್ರಮಾಣ	:	(% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು)
ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಫ್ಲುರ್‌ಫೆನ್ ಸಕ್ರೀಯ ಘಟಕಾಂಶ	:	16.50
ಕ್ಲೊಡಿನಾಫೋಪ್ – ಪ್ರೊಪರ್‌ಜಿಲ್ ಸಕ್ರೀಯ ಘಟಕಾಂಶ	:	8.50
ಮಿಶ್ರ ಕ್ಸೈಲಿನ್	:	16.00
ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫೆನೋಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ	:	18.25
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೊಡಿಸಿಲ್ ಬೆನ್‌ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	:	0.75
ಸೈಕ್ಲೊಹೆಕ್ಸನೋನ್	:	ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	:	100.00

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಲಕ್ಷಿತ ಕಳೆಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಸಂ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಸೋಯಾಬೀನ್	**ಹುಲ್ಲು ಕಳೆಗಳು:** ಬೇರ್ನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಂಡಿಗೆ ಹುಲ್ಲು (ಎಚಿನೊಕ್ಲೊವಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ.), ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಾಸ್ (ಇಲಿಯೂಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ), ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಕಾಡು ಹರಕು ಹುಲ್ಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಫೆಲೋ ಗ್ರಾಸ್ (ಪನಿಕಂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್), ಕ್ರೌವ್ ಫೂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಊಡಲು ಹುಲ್ಲು **ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು:** ಕುಪ್ಪೆಗಿಡ ಕಿರುನೆಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹರಕು ಹುಲ್ಲು ಕಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಬ್ (ಸೆಲೊಸಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿಯಾ), ಅಚ್ಚೆಗಿಡ, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಗುಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಮುಚ್ಚುಗೊಣ ನಾಯಿಬಾಲ, ಒಣಗೊಣಸೊಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಅಮರಾಂಥ್ ಕೀಳು ಅರಿವೆಸೊಪ್ಪು ಚೆಕ್ ವೀಡ್ (ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರಿಯಾ ಮೆಡಿಯಾ)ಅರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು	165 + 80	1000	500	61
ಉದ್ದು	**ಹುಲ್ಲು ಕಳೆಗಳು:** ಬೇರ್ನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಂಡಿಗೆ ಹುಲ್ಲು (ಎಚಿನೊಕ್ಲೊವಾ ಕೊಲೊನಾ). ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಾಸ್ (ಇಲಿಯೂಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ), **ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು:** ಕಿರುನೆಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಮರಂಥ (ಡೈಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್), ಕುಪ್ಪೆಗಿಡ ಕಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಬ (ಸಿಲೊಸಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿಯಾ), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸ (ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಹಿಸ್ಟೆರೊಫರಸ್)	165 + 80	1000	500	54
ಹೆಸರು	**ಹುಲ್ಲು ಕಳೆಗಳು:** ಬೇರ್ನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಂಡಿಗೆ ಹುಲ್ಲು (ಎಚಿನೊಕ್ಲೊವಾ ಕೊಲೊನಾ). ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಾಸ್ (ಇಲಿಯೂಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ), ಕ್ರೌವ್ ಫೂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಊಡಲು ಹುಲ್ಲು **ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು:** ಕಾಡು ಹರಕು ಹುಲ್ಲು ಕೀಳು ಅರಿವೆಸೊಪ್ಪು ಫಾಲ್ ಅಮರಂಥಸ್ (ಡೈಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್), ಟ್ರೈಯಂಥಿಮಾ ಮೊನೊಜಿನಾ	165 + 80	1000	500	54
ಶೇಂಗಾ	**ಹುಲ್ಲು ಕಳೆಗಳು:** ಬೇರ್ನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಂಡಿಗೆ ಹುಲ್ಲು (ಎಚಿನೊಕ್ಲೊವಾ ಕೊಲೊನಾ). ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗ್ರಾಸ್ (ಇಲಿಯೂಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ), ಗಾಂಗಿ ಗ್ರಾಸ್ (ಡಿಜಿಟರಿಯಾ ಸಂಗುನಲಿಸ್) **ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು:** ದೂಧಿ (ಇಯುಫೊರ್ಬಿಯಾ ಜೆನಿಕುಲಾಟಾ), ಕಾಡು ಹರಕು ಹುಲ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಮರಂಥಸ್ (ಡೈಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್)	165 + 80	1000	500	54

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು: ಲಘು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಣ್ಣು, ಸಿಂಪಡಣೆಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಅಳವಡಿಸಲು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ

ಅಳವಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳು: ಸ್ಪ್ರೇ.

ಸಲಕರಣೆ ವಿಧ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ನಾಜಲ್ ವಿಧಗಳು: ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಜಲ್

ಡೋಸೇಜ್‌ಗಳು: ಮೇಲಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

Malayalam

ഹാട്ട്ഷ്യോർ

കളനാശിനി

സോഡിയം അസിഫ്ലൂർഫെൻ 16.5% + ക്ലോഡിനാഫോപ്പ്-പ്രോപാർജിൽ 8% ഇസി

ഘടകം:

		അളവ് (% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ)
സോഡിയം അസിഫ്ലൂർഫെൻ സജീവ ഘടകം	:	16.50
ക്ലോഡിനാഫോപ്പ്-പ്രോപാർജിൽ സജീവ ഘടകം	:	8.00
മിക്സഡ് സൈലിൻ	:	16.00
ആൽക്കഹോൾ എത്തോക്സിലേറ്റഡ്, ആൽക്കൈൽ ഫിനോൾ എത്തോക്സിലേറ്റഡ്, മിശ്രിതം	:	18.25
കാൽസ്യം ഡോഡിസൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫോണേറ്റ്	:	0.75
സൈക്ലോഹെക്സനോൺ	:	ക്യൂഎസ്
ആകെ	:	100.00

ഉപയോഗത്തിനുള്ള ശുപാർശ:

വിള	ലക്ഷ്യ കളകൾ	ഡോസേജ് പ്രതി ഹെക്ടർ: എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന തളിക്കും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസം)
സോയാബീൻ	**പുൽ കളകൾ:** ബാൺ യാർഡ് ഗ്രാസ്സ് (എക്കിനോക്ലോവ എസ്പിപി), ക്രാബ് ഗ്രാസ്സ് (എല്യൂസിൻ ഇൻഡിക്ക), കാക്കി പുല്ല് (ഡിജിറ്റാരിയ സാംഗ്വിനാലിസ്), കാക്കകാൽപുല്ല് (ഡാക്റ്റിലോക്റ്റാനിയം ഈജിപ്റ്റിയം) **വിശാലമായ ഇലകളുള്ള കളകൾ:** കോപ്പർ ലീഫ് (അകാലിഫ ഇൻഡിക്ക), ഹസാർഡാന (ഫിലാന്തസ് നിരൂരി), ഡേ ഫ്ലവർ (കൊമ്മെലിന ബെംഘലെൻസിസ്), ഫാൾസ് അമരന്ത് (ഡിഗെര അർവെൻസിസ്), കോക്ക്സ് കോമ്പ് (സെലോസിയ അർജന്റിയ), ദൂധി (യൂഫോർബിയ ഇനങ്ങൾ), കാരറ്റ് ഗ്രാസ്സ് (പാർത്തീനിയം എസ്പിപി), പപ്പോട്ടൻ (ഫിസാലിസ് മിനിമ), കാർപെറ്റ് വീഡ് (ട്രയാന്തെമ മോണോഗൈന), സ്റ്റിക്കി ക്ലിയോം (ക്ലിയോം വിസ്കോസ), അലിഗേറ്റർ വീഡ് (ആൾട്ടർനാന്തെറ ഫിലോക്സെറോയിഡുകൾ), ഗ്രീൻ അമരന്ത് (അമരന്ത്സ് എസ്പിപി), ചിക്ക്‌വീഡ് (സ്റ്റെല്ലാരിയ മീഡിയ)	165 + 80	1000	500	61
ഉഴുന്ന്	**പുല്ല് കളകൾ:** ബാൺ യാർഡ് ഗ്രാസ്സ് (എക്കിനോക്ലോവ കൊളോണ), ക്രാബ് ഗ്രാസ്സ് (എല്യൂസിൻ ഇൻഡിക്ക) **വിശാലമായ ഇലകളുള്ള കളകൾ:** ഹസാർഡന (ഫിലാന്തസ് നിരൂരി), ഫാൾസ് അമരന്ത് (ഡിഗെര അർവെൻസിസ്), കോപ്പർ ലീഫ് (അകാലിഫ ഇൻഡിക്ക), കോക്ക്സ് കോമ്പ് (സെലോസിയ അർജന്റിയ), കോൺഗ്രസ് ഗ്രാസ്സ് (പാർത്തീനിയം ഹിസ്റ്ററോഫോറസ്)	165 + 80	1000	500	54
ചെറുപയർ	**പുല്ല് കളകൾ:** ബാൺ യാർഡ് ഗ്രാസ്സ് (എക്കിനോക്ലോവ കൊളോണ), ക്രാബ് ഗ്രാസ്സ് (എല്യൂസിൻ ഇൻഡിക്ക), ക്രൌ ഫൂട്ട് ഗ്രാസ്സ് (ഡാക്റ്റിലോക്റ്റിനിയം ഈജിപ്റ്റിയം) **വിശാലമായ ഇലകളുള്ള കളകൾ:** ഡേ ഫ്ലവർ (കൊമ്മെലിന ബെംഘലെൻസിസ്), ഗ്രീൻ അമരന്ത് (അമരന്ത് വിരിഡിസ്), ഫാൾസ് അമരന്ത് (ഡിഗെര അർവെൻസിസ്), ട്രയാന്തമ മോണോഗൈനെ.	165 + 80	1000	500	54
നിലക്കടല	**പുല്ല് കളകൾ:** ബാൺ യാർഡ് ഗ്രാസ്സ് (എക്കിനോക്ലോവ കൊളോണ), ക്രാബ് ഗ്രാസ്സ് (എല്യൂസിൻ ഇൻഡിക്ക), കാക്കി ഗ്രാസ്സ് (ഡിജിറ്റേറിയ സാംഗ്വിനാലിസ്) **വിശാലമായ ഇലകളുള്ള കളകൾ:** ദൂധി (യൂഫോർബിയ ജെനിക്കുലേറ്റ), ഹസാർഡാന (ഫിലാന്തസ് നിരൂരി), ഫാൾസ് അമരന്ത് (ഡിഗെര അർവെൻസിസ്)	165 + 80	1000	500	54

കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

മണ്ണും വെള്ളവും: നേരിയതോ കനത്തതോ ആയ മണ്ണ്. തളിക്കാൻ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിക്കുക.

പ്രയോഗത്തിനുള്ള വിള ഘട്ടം: സസ്യ വളർച്ചാ ഘട്ടം

പ്രയോഗ രീതികൾ: സ്പ്രേ.

ഉപകരണ തരം: നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ.

നോസിൽ തരങ്ങൾ: ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ നോസിൽ

ഡോസേജ്: മുകളിലുള്ള ശുപാർശ കാണുക.

കാലയളവ്: 24 മണിക്കൂർ.

പരമാവധി എണ്ണം സ്പ്രേകൾ ഉൾപ്പെടെ ആവൃത്തി: ഒറ്റത്തവണ പ്രയോഗം.

പരിമിതമായ പ്രദേശത്ത് കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം: അനുവദനീയമല്ല.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.

Urdu

ہاٹشیور

آئیرس

سوڈیم ایکفلورفین 16.5%+ کلوڈینافوپ پروپارگل 8% ای سی

کیمیائی مرکب:

مقدار (%وزن/وزن)	:	اجزاء
16.50	:	سوڈیم ایسی فلورفین فعال جزو
8.00	:	کلوڈینافوپ پروپارگل فعال جزو
16.00	:	مرکب زائلین
18.25	:	الکحل ایتھوکسی لیٹ اینڈ الکائل فینول ایتھوکسی لیٹ کا مرکب
0.75	:	کیلشیم ڈوڈیسائل بینزین سلفونیٹ
کیو.ایس.	:	سائکلوہیکزانون
100.00	:	کل

سفارشات:

آخری چھڑکاؤ سے کٹائی تک انتظار کا وقفہ (دن)	پانی میں محلول (لیٹر)	فارمولیشن (گرام)	اے.آئی. (گرام)	ہدف نباتات	فصل
61	500	1000	165 + 80	گھاس دار نباتات	سویابین
54	500	1000	165 + 80	گھاس دار نباتات / چوڑے پتوں والی گھاس	سیاہ چنا
54	500	1000	165 + 80	گھاس دار نباتات / چوڑے پتوں والی گھاس	سبز چنا
54	500	1000	165 + 80	گھاس دار نباتات / چوڑے پتوں والی گھاس	مونگ پھلی

موسمی کیفیت: غیر موافق موسمی حالات میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مٹی اور پانی: ہلکی سے بھاری مٹی۔ چھڑکاؤ کے لئے صاف پانی کا استعمال کیا جانا چاہیے۔

چھڑکاؤ کے لئے فصل کا مرحلہ: پودا اُگنے کا مرحلہ۔

چھڑکاؤ کی تکنیک: اسپرے۔

آلات کی قسم: نیپ سیک اسپریئر۔

نوزل کی قسم: فلیٹ فین نوزل۔

مقدار: مندرجہ بالا سفارشات دیکھیں۔

دوبارہ چھڑکاؤ کا وقفہ: 24 گھنٹے۔

کٹائی سے پہلے کا وقفہ (انتظار کا وقفہ): مندرجہ بالا سفارشات دیکھیں۔

چھڑکاؤ کی زیادہ سے زیادہ تعداد بسمیت تواتر: ایک مرتبہ چھڑکاؤ کریں۔

محدود رقبے میں حشرات کش کا استعمال: اجازت نہیں ہے۔

انتباہ: خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے۔

زہر خوراکی کی صورت میں علاج: کسی مخصوص تریاق کا علم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

ابتدائی طبی امداد:

![AgroStar]

AgroStar®

HOTSURE®

SODIUM ACIFLUORFEN 16.5% + CLODINAFOP-PROPARGYL 8% EC

HERBICIDE

हॉटश्योर

सोडियम ॲसिफ्लोरफेन १६.५%+ क्लोडिनाफॉप-प्रोपारजाईल ८% ईसी

तणनाशक

For Agricultural Use Only

केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

MANUFACTURED BY :
UPL LIMITED, UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (WEST), MUMBAI - 400 052

MARKETED BY: ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos 001, 002, 003 and 004, Ground Floor, Wing A & Wing B, Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune, MH - 411014

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, युनिफोस हाऊस, मधु पार्क, 11 वा रोड, खार (प), मुंबई-400 052

विपणनकर्ता
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय सं. 001, 002, 003 एवं 004, ग्राउंड फ्लोर, विंग A एवं विंग B, न्याती टेक पार्क, वडगांव शेरी, पुणे, महाराष्ट्र - 411014

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address