INSTRUCTIONS

READ BEFORE USE

Imidacloprid 18.5% + Hexaconazol 1.5%FS (Insecticide)

Chemical Composition

1	Imidacloprid a.i. content	18.50 % w/w
2	Hexaconazole a.i. content	1.50 % w/w
3	Polyoxyethylene polyaryl phenol	1.50 % w/w
4	Polymethyl methacrylate	4.50 % w/w
5	Sodium carboxymethyl cellulose	0.80 % w/w
6	Silicon Defoamer	0.50 % w/w
7	Propane 1.2.3 Triol	8.00 % w/w
8	Sodium salt of 1,2-benzisothiazolin-3 one	0.20 % w/w
9	Red dye	0.70 % w/w
10	Modified polysachharide	0.19 % w/w
11	Dimineralised water	Q.s. to make %
	Total	100 % w/w

Marketed & Manufactured by:
Ulink Agritech Private Limited.
Reg. Office No. 106 (B&C), 6th Floor, E-Space IT Park,
A1 Building, 46/1, Nagar Road, Pune,
Maharashtra 411014

Factory Address:
Shed no. 73/B, Survey no. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, District- Vadodara, Gujarat- 391240, India.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

ইমিডাক্লোপ্রিড 18.5%+ হেক্সাকোনাজল 1.5% FS(কীটনাশক)

ইমিডাক্লোপ্রিড 18.5% + হেক্সাকোনাজল 1.5% এফএস হল কীটনাশক + ছত্রাকনাশকের সংমিশ্রণ যা পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বীজ চিকিত্সা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন তিরমিট, থ্রিপস, জাসিড, চিনাবাদাম এবং উইপোকাগুলির মূল গ্রাব। গমের উপর এফিডস এবং রোগ যেমন কলার পচা, কান্ড পচা, টিক্কা পাতার দাগ, এবং চিনাবাদামে মরিচা এবং গমে মরিচা।

ফসল	পোকামাকড় স্বাভাবিক নাম	ডোজ/হেক্টর AI ছোলা	ডোজ/হেক্টর গঠন	পানিতে তরলীকর (লিটার)	অপেক্ষার প্রহর ফসল কাটা শেষ স্প্রে করার মধ্যে (দিন)
চিনাবাদাম	টেরমাইটস, থ্রিপস, জাসিডস, রুট গ্রাবস, কলার পচা, কান্ড পচা। টিক্কা পাতার দাগ, মরিচা	ইমিডাক্লোপ্রিড: 37& হেক্সাকোনাজল:3	200	প্রযোজ্য নয়	এটি বীজ ড্রেসার হিসাবে ব্যবহৃত হয়
গম	টেরমাইটস, এফিডস, স্মাট, মরিচা	ইমিডাক্লোপ্রিড: 37& হেক্সাকোনাজল:3	200		

ব্যবহারের দিকনির্দেশ
বীজ শোধন: খামারে যে কোনো অল্প পরিমাণ বীজ সহজেই শোধন করা যায়। একটি বদ্ধ মিশ্রণ ড্রাম বা একটি কংক্রিট মধ্যে এই সংমিশ্রণ গঠন এবং বীজ সঠিক পরিমাণ মিক্সার প্রতিটি দানা ফর্মুলেশনের সাথে সমানভাবে লেপা না হওয়া পর্যন্ত বীজটি রোল করুন। বীজ শোধন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশেষ বীজ ড্রেসিং কোম্পানি দ্বারা বাহিত হতে পারে জন্য কীটনাশক + ইমিডাক্লোপ্রিড 18.5% + হেক্সাকোনাজল 1.5% এফএস-এর ছত্রাকনাশক স্পেকট্রামের অপ্টিমাইজেশন।

আবেদনের সময়
উদ্ভিদ সুরক্ষা সরঞ্জাম: ম্যানুয়ালি/যান্ত্রিকভাবে চালিত বীজ ড্রেসিং ঘোরানো ড্রাম।

সতর্কতা
মিশ্রণ এবং স্প্রে করার সময় প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করা উচিত। দূষিত কাপড় ধোয়া এবং প্রয়োগের পরে শরীরের অংশ। শ্বাস-প্রশ্বাস এড়িয়ে চলুন, ধূমপান করবেন না, পান করবেন না, কিছু খাবেন এবং চিববেন না আবেদন

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
উদাসীনতা, মায়াটানিয়া, কাঁপুনি, শ্বাসকষ্ট এবং মায়োস্পাজম

প্রাথমিক চিকিৎসা
যদি খাওয়া হয়: যদি ব্যক্তি সচেতন এবং সতর্ক থাকে, তাহলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন এবং 1 বা 2 গ্লাস পান করুন পান করার জন্য জল। অচেতন ব্যক্তিকে মুখে কিছু দেবেন না। ডাক্তার ডাকো. করো না উপস্থিত চিকিত্সকের দ্বারা ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত বমি করান।
যদি শ্বাস নেওয়া হয়: রোগীকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার যত্ন নিন। রোগী না থাকলে শ্বাস নিতে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিন, বিশেষত মুখ দিয়ে মুখের শ্বাস। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে: শরীরের ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলি সাবান এবং প্রচুর পরিমাণে দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন চুল এবং আঙুলের নিচে মেইল সহ জল। যদি ব্যথা, লালভাব বা জ্বালা অব্যাহত থাকে, তাহলে কডাক্তার সমস্ত দূষিত জামাকাপড় আলাদা করতে হবে এবং সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে ব্যবহারের আগে আলাদাভাবে।
চোখের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে: কমপক্ষে 15 মিনিটের জন্য প্রচুর পানি দিয়ে আলতোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা হলে জ্বালা, লালভাব বা ফটোফোবিয়া অব্যাহত থাকলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ফাইটোটক্সিসিটি
ইমিডাক্লোপ্রিড 18.5% + হেক্সাকোনাজল 1.5% এফএস সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহার করলে ফাইটোক্সিক নয়।

প্রতিষেধক
নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক নেই। লক্ষণগতভাবে চিকিত্সা করুন।

ব্যবহৃত কন্টেইনার নিষ্পত্তি
1. মেশিন এবং পাত্র থেকে প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপাদান এবং ওয়াশিং নিষ্পত্তি করা হবে একটি নিরাপদ পদ্ধতিতে বন্ধ যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।
2. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে তাদের পুনরায় ব্যবহার রোধ করতে বাইরে ফেলে রাখা হবে না।
3. প্যাকেজগুলি ভাঙ্গা এবং বাসস্থান থেকে দূরে কবর দেওয়া হবে।
4. খালি কন্টেইনার পুনরায় ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

জমা শর্ত
1. কীটনাশক সম্বলিত প্যাকেজগুলিকে দূরে আলাদা কক্ষ বা প্রাঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হবে অন্যান্য জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা প্রাঙ্গণ বা রাখা হবে কীটনাশকের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তালা এবং চাবির নীচে আলাদা আলমিরায়।
2. স্টোর রুমগুলি ভালভাবে নির্মিত, ভালভাবে আলোকিত, বায়ুচলাচল এবং পর্যাপ্ত মাত্রার হওয়া উচিত। দোকানের অবস্থা শুষ্ক এবং ঠান্ডা হতে হবে।

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 18.5% + హెక్సాకోనజోల్ 1.5% (పురుగుల మందు)

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 18.5% + హెక్సాకోనజోల్ 1.5% ఎఫ్ఎస్ అనేది క్రిమిసంహారక + శిలీంద్ర సంహారిణిని కలిపి విత్తన చికిత్సగా ఉపయోగిస్తారు, అవి చెదపురుగులు, త్రిప్స్, జాసిడ్‌లు, వేరుశెనగ మరియు చెదపురుగులపై వేరు గ్రబ్‌లు. గోధుమలపై అఫిడ్స్ మరియు కాలర్ తెగులు, కాండం తెగులు, టిక్కా ఆకు మచ్చ, మరియు వేరుశెనగపై తుప్పు మరియు గోధుమలపై స్మట్ & తుప్పు వంటి వ్యాధులు

పంట	కీటకాల జనరల్ వేరు	మోతాదు/హె AI గ్రాము	మోతాదు/హె సూత్రీకరణ	నీటి లో పలుచన (లీటర్)	నిరీక్షణ కాలం హార్వెస్టింగ్ చివరి స్ప్రేయింగ్ మధ్య (రోజులు)
వేరుశనగ	చెదపురుగులు, త్రిప్స్, జాసిడ్స్, రూట్ గ్రబ్స్, కాలర్ తెగులు, కాండం తెగులు. టిక్కా ఆకు మచ్చ, తుప్పు	ఇమిడాక్లోప్రిడ్: 37& హెక్సాకోనజోల్: 3	200	వర్తించదు	ఇది సీడ్ డ్రస్సర్‌గా ఉపయోగించబడుతుంది
గోధుమ	చెదపురుగులు, అఫిడ్స్, స్మట్, రస్ట్	ఇమిడాక్లోప్రిడ్: 37& హెక్సాకోనజోల్: 3	200		

ఉపయోగం యొక్క దిశ
విత్తన శుద్ధి: ఏదైనా చిన్న పరిమాణంలో ఉన్న విత్తనాన్ని పొలంలో సులభంగా శుద్ధి చేయవచ్చు.
క్లోజ్డ్ మిక్సింగ్ డ్రమ్ లేదా కాంక్రీటులో ఈ కలయిక సూత్రీకరణ మరియు విత్తనం యొక్క సరైన మొత్తం మిక్సర్. ప్రతి గింజను సూత్రీకరణతో ఏకరీతిలో పూత పూయబడే వరకు విత్తనాన్ని రోల్ చేయండి. విత్తన చికిత్స వాణిజ్య ప్రాతిపదికన ప్రత్యేక సీడ్ డ్రెస్సింగ్ కంపెనీలచే నిర్వహించబడుతుంది
క్రిమిసంహారక ఆప్టిమైజేషన్ + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 18.5% + హెక్సాకోనజోల్ 1.5% FS యొక్క శిలీంద్రనాశకాల స్పెక్ట్రం.

దరఖాస్తు సమయం
మొక్కల రక్షణ పరికరాలు: మానవీయంగా/యాంత్రికంగా నిర్వహించబడే సీడ్ డ్రెస్సింగ్ తిరిగే డ్రమ్.

ముందుజాగ్రత్తలు
మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. కలుషితమైన బట్టలు కడగడం మరియు అప్లికేషన్ తర్వాత శరీర భాగం. పీల్చడం మానుకోండి, పొగ త్రాగకండి, త్రాగకండి, తినకండి & నమలకండి అప్లికేషన్.

విషం యొక్క లక్షణాలు
ఉదాసీనత, మైటానియా, వణుకు, కష్టం శ్వాస మరియు మైయోస్పాస్మ్స్

ప్రథమ చికిత్స
తీసుకున్నట్లయితే: వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసులను ఇవ్వండి త్రాగడానికి నీరు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. వద్దు హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునే వరకు వాంతిని ప్రేరేపించండి.
పీల్చినట్లయితే: రోగిని తాజా గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి లేకపోతే శ్వాస తీసుకోవడం లేదా కష్టంతో శ్వాస తీసుకోవడం, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి, ప్రాధాన్యంగా నోటితో నోటి శ్వాస. వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
చర్మం సంపర్కం విషయంలో: సబ్బు మరియు పుష్కలంగా శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాలను పూర్తిగా కడగాలి వెంట్రుకలు మరియు అండర్ ఫింగర్ మెయిల్‌లతో సహా నీరు. నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, సంప్రదించండి a వైద్యుడు. కలుషిత బట్టలన్నింటినీ వేరు చేసి సబ్బుతో బాగా కడిగి ఉతకాలి ఉపయోగం ముందు విడిగా.
కంటిచూపు విషయంలో: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి ఉంటే చికాకు, ఎరుపు లేదా ఫోటోఫోబియా కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 18.5% + హెక్సాకోనజోల్ 1.5% ఎఫ్ఎస్ సిఫార్సుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు ఫైయోటాక్సిక్ కాదు.

విరుగుడు
తెలిసిన నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ పారవేయడం
1.ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు మెటీరియల్ మరియు యంత్రాలు మరియు కంటైనర్‌ల నుండి వాషింగ్‌లు పారవేయబడతాయి పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి సురక్షితమైన పద్ధతిలో ఆఫ్ చేయండి.
2.ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయట ఉంచరాదు.
3.ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేయబడతాయి మరియు నివాసం నుండి దూరంగా పాతిపెట్టబడతాయి.
4.ఖాళీ కంటైనర్‌ను మళ్లీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

నిల్వ పరిస్థితులు
1.పురుగుమందు ఉన్న ప్యాకేజీలను వేరు వేరు గదులు లేదా ప్రాంగణంలో భద్రపరచాలి ఇతర వస్తువులను ముఖ్యంగా ఆహార వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలు లేదా ఉంచబడతాయి పురుగుమందుల పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మిరాలో.
2.స్టోర్ రూమ్‌లు బాగా నిర్మించబడాలి, బాగా వెలుతురు, వెంటిలేషన్ మరియు తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండాలి. దుకాణం యొక్క పరిస్థితి పొడిగా మరియు చల్లగా ఉండాలి.

ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 18.5% + ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 1.5% (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 18.5% + ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 1.5% ಎಫ್ಎಸ್ ಎಂಬುದು ಕೀಟನಾಶಕ + ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೀಟಗಳ ಕೀಟಗಳಾದ ಗೆದ್ದಲು, ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು, ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೇರು ಗ್ರಬ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಿಡಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರಳಕಾಯಿ ಕೊಳೆತ, ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ, ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟರ್ AI ಗ್ರಾಂ	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟರ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ನಡುವೆ (ದಿನಗಳು)
ನೆಲಗಡಲೆ	ಗೆದ್ದಲು, ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಜ್ಯಾಸಿಡ್ಸ್, ಬೇರು ಹುಳುಗಳು, ಕಾಲರ್ ಕೊಳೆತ, ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತ. ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ, ತುಕ್ಕು	ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್: 37& ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್: 3	200	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	ಇದನ್ನು ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಗೋಧಿ	ಗೆದ್ದಲುಗಳು, ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಸ್ಮಟ್, ತುಕ್ಕು	ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್: 37& ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್: 3	200		

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ
ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜವನ್ನು ನನ್ನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ಮುಚ್ಚಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೂತ್ರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಲೇಪಿಸುವವರೆಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸಬಹುದು
ಕೀಟನಾಶಕದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 18.5% ನ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ವರ್ಣಪಟಲ + ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 1.5% FS.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆ: ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ/ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೀಡ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ತಿರುಗುವ ಡ್ರಮ್.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂತರ ದೇಹದ ಭಾಗ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಮೈಟಾನಿಯಾ, ನಡುಕ, ಕಷ್ಟ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಮಯೋಸ್ಪಾಸ್ಮ್ಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಸೇವಿಸಿದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀಡಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಹಾಜರಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತನಕ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಳು. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ a ವೈದ್ಯರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ.
ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಕೆರಳಿಕೆ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಫೋಟೊಫೋಬಿಯಾ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ
ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 18.5% + ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 1.5% ಎಫ್ಎಸ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಫೈಯೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ
ತಿಳಿದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ
1.ಪಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು.
4.ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
1.ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇಡಬೇಕು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾದಲ್ಲಿ.
2. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು.

इमिडाक्लोप्रिड 18.5% + हेक्साकोनाझोल 1.5% (कीटकनाशक)

इमिडाक्लोप्रिड 18.5% + हेक्साकोनाझोल 1.5% एफएस हे कीटकनाशक + बुरशीनाशक यांचे मिश्रण आहे जे कीटक कीटकांच्या नियंत्रणासाठी बीजप्रक्रिया म्हणून वापरले जाते जसे की दीमक, थ्रिप्स, जॅसिड्स, भुईमूग आणि दीमकांवरील रूट ग्रब्स. गव्हावर ॲफिड्स आणि कॉलर रॉट, स्टेम रॉट, टिक्का पानांचे ठिपके, आणि भुईमुगावर गंज आणि गव्हावर गंज

पीक	कीटक सामान्य नाव	डोस/हे AI ग्राम	डोस/हे फॉर्म्युलेशन (मिली)	पाणी मर्यादा (लिटर)	शेवटच्या फवारणी पासून कापणीपर्यंतचा काळ (दिवस)
भुईमूग	दीमक, थ्रिप्स, जॅसिड्स, रूट ग्रब्स, कॉलर रॉट, स्टेम रॉट. टिक्काच्या पानावर ठिपके, गंज	इमिडाक्लोप्रिड: 37& हेक्साकोनाझोल:3	200	लागू नाही	हे सीड ड्रेसर म्हणून वापरले जाते
गहू	दीमक, ॲफिड्स, स्मट, गंज	इमिडाक्लोप्रिड: 37& हेक्साकोनाझोल:3	200		

वापरण्याची दिशा
बीजप्रक्रिया: कोणत्याही लहान प्रमाणात बियाण्याची प्रक्रिया माझ्या शेतात मिसळून करता येते.
बंद मिक्सिंग ड्रम किंवा काँक्रिटमध्ये या संयोजनाची योग्य मात्रा आणि बियाणे मिक्सर प्रत्येक दाणे फॉर्म्युलेशनसह एकसारखे लेप होईपर्यंत बियाणे रोल करा. बियाणे उपचार व्यावसायिक आधारावर विशेष बियाणे ड्रेसिंग कंपन्यांद्वारे चालते
कीटकनाशक + इमिडाक्लोप्रिड 18.5% + हेक्साकोनाझोल 1.5% एफएसचे बुरशीनाशक स्पेक्ट्रमचे ऑप्टिमायझेशन.

अर्ज करण्याची वेळ
वनस्पती संरक्षण उपकरणे: मॅन्युअली/यांत्रिकरित्या चालवलेले सीड ड्रेसिंग फिरणारे ड्रम.

सावधगिरी
मिश्रण आणि फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावेत. दूषित कपडे धुवा आणि अर्ज केल्यानंतर शरीराचा भाग. इनहेलेशन टाळा, धुम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका अर्ज

विषबाधाची लक्षणे
उदासीनता, मायटॅनिया, थरथर, श्वास घेणे कठीण आणि मायोस्पाझम

प्रथमोपचार
जर सेवन केले असेल तर: जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल तर, तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास द्या. पिण्यासाठी पाणी. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. करू नका उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेनुसार आणि तोपर्यंत उलट्या करा.
श्वास घेतल्यास: रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. रुग्ण नसल्यास श्वास घेणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे, कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडाने श्वास घेणे. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
त्वचेशी संपर्क झाल्यास: शरीराचे प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर प्रमाणात धुवा केस आणि बोटांखालील मेल्ससह पाणी. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास, सल्ला घ्या डॉक्टर सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि साबणाने पूर्णपणे धुवावेत आणि धुवावेत. वापरण्यापूर्वी स्वतंत्रपणे.
डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. जर वेदना चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटोटोक्सिसिटी
इमिडाक्लोप्रिड 18.5% + हेक्साकोनाझोल 1.5% एफएस शिफारशींनुसार वापरल्यास फायटोक्सिक नाही.

उतारा
कोणतेही ज्ञात विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे
1.पॅकेज किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि मशीन आणि कंटेनरमधील वॉशिंगची विल्हेवाट लावली जाईल पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी सुरक्षित रीतीने बंद करा.
2. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये.
3. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.
4.रिक्त कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक.

स्टोरेज अटी
1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस वेगळ्या खोलीत किंवा आवारात साठवून ठेवली पाहिजेत इतर वस्तू विशेषतः खाद्यपदार्थ ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसर किंवा ठेवल्या जातील कीटकनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये.
2.स्टोअर रूम चांगल्या प्रकारे बांधलेल्या, चांगल्या प्रकाशाच्या, हवेशीर आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात. स्टोअरची स्थिती कोरडी आणि थंड असावी.