मॅड्रिड
ॲसिटामिमिप्रिड 20% SP
(कीटकनाशक)

ॲसिटामिमिप्रिड 20% SP हे पाण्यात विद्रव्य पावडर स्वरूपातील फॉर्म्युलेशन असून त्यामध्ये 20% सक्रिय घटक ॲसिटामिमिप्रिड आहे. ॲसिटामिमिप्रिड 20% SP हे अत्यंत प्रभावी सिस्टेमिक कीटकनाशक असून ते कापूस पिकामध्ये एफिड्स, जॅसिड्स आणि व्हाइटफ्लाय नियंत्रणासाठी, कोबीमध्ये एफिड आणि भेंडी (भिंडी)मध्ये एफिड्स नियंत्रणासाठी वापरले जाते.

शिफारस:

पिके	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टरी AI (ग्रॅम)	मात्रा/हेक्टरी फॉर्म्युलेशन (ग्रॅम)	पाण्यात मिसळण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीनंतर कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
कोबी	एफिड्स	15	75	500-600	7
मिरची	थ्रिप्स	10-20	50-100	500-600	3
कापूस	व्हाइटफ्लाय जॅसिड्स एफिड्स	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
भेंडी (भिंडी)	एफिड्स	15	75	500-600	3
तांदूळ	ब्राऊन प्लांट हॉपर	10-20	50-100	500-600	7

वापरण्याची पद्धत: नॅपसॅक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि ASPEE-HTP पॉवर स्प्रेयर वापरता येईल.

वापरण्याचा वेळ: CIB मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ घ्या.

सावधगिरी: 1. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थांचे डबे आणि जनावरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. 3. फवारणीच्या धुराचा श्वास घेऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग नीट धुवा. 5. फवारणी करताना धूम्रपान, खाणे किंवा पिणे करू नका. 6. मिश्रण आणि फवारणी करताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे परिधान करा.

विषबाधेची लक्षणे: मळमळ, उलटी, डोकेदुखी, चक्कर येणे आणि पोटदुखी होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार: 1. गिळल्यास, घशाच्या मागील भागाला हलक्या स्पर्शाने उलटी करायला लावा. उलटी स्वच्छ होईपर्यंत पुनरावृत्ती करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करू देऊ नका. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढून टाका आणि त्वचा साबण व भरपूर पाण्याने नीट धुवा. 3. डोळ्यात गेल्यास सुमारे 10 ते 15 मिनिटे पुरेशा सलाईन/स्वच्छ पाण्याने नीट धुवा. 4. श्वसावाटे शरीरात गेल्यास रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा.

फायटोटॉक्सिसिटी: शेतातील शिफारशीप्रमाणे वापरल्यास हे उत्पादन पिकांसाठी हानिकारक नाही.

प्रतिविष: कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: 1. रिकामे कंटेनर फोडून राहत्या ठिकाणापासून दूर पुरून टाकावे. 2. वापरलेले कंटेनर किंवा पॅकेज पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडू नयेत. 3. पॅकेज, उरलेला पदार्थ आणि धुण्याचे पाणी पर्यावरण व पाणी प्रदूषण टाळण्यासाठी सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी.

साठवण अटी: 1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा ठिकाणांपासून दूर असलेल्या स्वतंत्र खोल्या किंवा जागेत साठवावीत, किंवा कीटकनाशकाच्या प्रमाण व स्वरूपानुसार स्वतंत्र कपाटात कुलूप लावून सुरक्षित ठेवावीत. 2. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा मजबूत बांधकामाच्या, कोरड्या, पुरेशा प्रकाशमान, हवेशीर आणि वायूंमुळे दूषितता टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक संघटन:

ॲसिटामिप्रिड a.i.	20.00% w/w
सोडियम डोडेसिल बेंझीन सल्फोनेट मिश्रण	4.50% w/w
सोडियम सल्फेट व सोडियम अल्कायलेट मिश्रण	% w/w
सोडियम सिट्रेट डायहायड्रेट	30.00% w/w
कॅल्शियम हायड्रोजन फॉस्फेट डायहायड्रेट	0.10% w/w
रंगद्रव्य (ब्रिलियंट ब्लू)	0.05% w/w
लॅक्टोज मोनोहायड्रेट	Q.S. %
एकूण:	**100% w/w**

सूचना: या लेबल/पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पिकांवर वापर करू नये.

મેડ્રિડ
એસિટામિપ્રિડ 20% SP
(કીટનાશક)

એસિટામિપ્રિડ 20% SP પાણીમાં દ્રાવ્ય પાઉડર સ્વરૂપનું ફોર્મ્યુલેશન છે, જેમાં 20% સક્રિય ઘટક એસિટામિપ્રિડ છે. એસિટામિપ્રિડ 20% SP એક ખૂબ જ અસરકારક સિસ્ટમિક કીટનાશક છે, જે કપાસના પાકમાં એફિડ્સ, જાસિડ્સ અને વ્હાઇટફ્લાયના નિયંત્રણ માટે, કોબીમાં એફિડ અને ભીંડા (ભીંડી)માં એફિડ્સના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

ભલામણ:

પાક	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર AI (ગ્રામ)	માત્રા/હેક્ટર ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રામ)	પાણીમાં ભેળવવાની માત્રા (લિટર)	છેલ્લા સ્પ્રે પછી કાપણી સુધીનો રાહ સમય (દિવસોમાં)
કોબી	એફિડ્સ	15	75	500-600	7
મરચાં	થ્રિપ્સ	10-20	50-100	500-600	3
કપાસ	વ્હાઇટફ્લાય જાસિડ્સ એફિડ્સ	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
ભીંડા (ભીંડી)	એફિડ્સ	15	75	500-600	3
ચોખા	બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર	10-20	50-100	500-600	7

વાપરવાની રીત: નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર અને ASPEE-HTP પાવર સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

વાપરવાનો સમય: CIB માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો.

સાવચેતીઓ: 1. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાલી ખાદ્ય પાત્રો અને પશુઓના ખોરાકથી દૂર રાખો. 2. મોઢું, આંખો અને ત્વચા સાથેનો સંપર્ક ટાળો. 3. સ્પ્રેની ધુમ્મસ શ્વાસ દ્વારા અંદર ન લો. પવનની દિશામાં સ્પ્રે કરો. 4. સ્પ્રે કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. 5. સ્પ્રે કરતી વખતે ધુમ્રપાન, પીવું કે ખાવું નહીં. 6. મિશ્રણ અને સ્પ્રે કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષા વસ્ત્રો પહેરો.

ઝેર લાગવાના લક્ષણો: મિતલી, ઉલ્ટી, માથાનો દુખાવો, ચક્કર અને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. ગળી લેવાય તો ગળાના પાછળના ભાગને હળવેથી સ્પર્શ કરીને ઉલ્ટી કરાવો. ઉલ્ટી સાફ ન થાય ત્યાં સુધી પુનરાવર્તન કરો. દર્દી બેભાન હોય તો ઉલ્ટી કરાવશો નહીં. 2. કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય તો કપડાં દૂર કરો અને ત્વચાને સાબુ અને પૂરતા પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. 3. આંખમાં જાય તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ સુધી પૂરતા સેલાઇન/સ્વચ્છ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. 4. શ્વાસ દ્વારા અંદર જાય તો દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ.

ફાઇટોટોક્સિસિટી: ખેતર માટેની ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવાથી આ ઉત્પાદન પાક માટે હાનિકારક નથી.

પ્રતિઝેર: કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિઝેર જાણીતું નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

વપરાયેલ કન્ટેનરનું નિકાલ: 1. ખાલી કન્ટેનરો તોડી નિવાસસ્થાનથી દૂર દાટી દેવા. 2. વપરાયેલ કન્ટેનરો અથવા પેકેજોને ફરી ઉપયોગથી રોકવા માટે બહાર ન મૂકવા જોઈએ. 3. પેકેજો, બચેલ સામગ્રી અને ધોવાનું પાણી પર્યાવરણ અને પાણીના પ્રદૂષણને રોકવા માટે સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો.

સંગ્રહની શરતો: 1. કીટનાશક ધરાવતા પેકેજોને અન્ય વસ્તુઓ સંગ્રહ માટે વપરાતી જગ્યાથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સ્થળમાં સંગ્રહ કરવા જોઈએ અથવા કીટનાશકની માત્રા અને સ્વભાવ મુજબ અલગ અલમારીમાં તાળા અને ચાવી સાથે રાખવા જોઈએ. 2. કીટનાશક સંગ્રહ માટેની જગ્યાઓ મજબૂત બનેલી, સુકી, સારી રીતે પ્રકાશિત, હવા પ્રવાહવાળી અને વરાળથી પ્રદૂષણ ન થાય તે માટે પૂરતી જગ્યાવાળી હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક રચના:

એસિટામિપ્રિડ a.i.	20.00% w/w
સોડિયમ ડોડેસાઇલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટનું મિશ્રણ	4.50% w/w
સોડિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ આલ્કાઇલેટનું મિશ્રણ	% w/w
સોડિયમ સિટ્રેટ ડાઇહાઇડ્રેટ	30.00% w/w
કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન ફોસ્ફેટ ડાઇહાઇડ્રેટ	0.10% w/w
રંગ આપનાર પદાર્થ (બ્રિલિયન્ટ બ્લુ)	0.05% w/w
લેક્ટોઝ મોનોહાઇડ્રેટ	Q.S. %
કુલ:	**100% w/w**

ચેતવણી: આ લેબલ/લીફલેટમાં દર્શાવેલ પાકો સિવાય અન્ય કોઈ પણ પાકમાં ઉપયોગ કરશો નહીં.

ਮੈਡ੍ਰਿਡ
ਐਸੀਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ 20% SP
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਐਸੀਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ 20% SP ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ ਐਸੀਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ 20% SP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਐਫਿਡਸ, ਜੈਸਿਡਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟਫਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਪੱਤਾਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਐਫਿਡ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਫਿਡਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ AI (ਗ੍ਰਾਮ)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਾਰ-ਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕੱਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਪੱਤਾਗੋਭੀ	ਐਫਿਡਸ	15	75	500-600	7
ਮਿਰਚ	ਥ੍ਰਿਪਸ	10-20	50-100	500-600	3
ਕਪਾਹ	ਵਾਈਟਫਲਾਈ, ਜੈਸਿਡਸ, ਐਫਿਡਸ	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
ਭਿੰਡੀ	ਐਫਿਡਸ	15	75	500-600	3
ਧਾਨ	ਬ੍ਰਾਊਨ ਪਲਾਂਟ ਹੋਪਰ	10-20	50-100	500-600	7

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਮਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਮਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ASPEE-HTP ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: CIB ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। 3. ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। 4. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ। 5. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। 6. ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: 1. ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਛੂਹ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਉਲਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। 2. ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। 3. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। 4. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਫਾਈਟੋਟਾਕਸਿਸਿਟੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਿਵਿਸ਼: ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤਿਵਿਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। 2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। 3. ਪੈਕੇਜ, ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਿਆਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਐਸੀਟਾਮਿਪ੍ਰਿਡ a.i.	20.00% w/w
ਸੋਡੀਅਮ ਡੋਡੇਸਾਇਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ	4.50% w/w
ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲਕਾਇਲੇਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ	% w/w
ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ	30.00% w/w
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਾਸਫੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ	0.10% w/w
ਰੰਗਦਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਬ੍ਰਿਲਿਅੰਟ ਬਲੂ)	0.05% w/w
ਲੈਕਟੋਜ਼ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ	Q.S. %
ਕੁੱਲ:	**100% w/w**

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

मेड्रिड
ऐसिटामिप्रिड 20 प्रतिशत एस.पी.
(कीटनाशक)

एसिटामिप्रिड 20 प्रति. घुलनशील पाउडर कपास के माहू/तेला और सफेद मक्खी; बंदगोभी में माहू; भिन्डी में माहू की रोकथाम के लिये प्रयोग किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
बन्द गोभी	चेंपा या माहू	15	75	500-600	7
मिर्च	चुरदा	10-20	50-100	500-600	3
कपास	सफेद मक्खी हरा तेला चेंपा या माहू	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
भिन्डी	चेंपा या माहू	15	75	500-600	3
धान	भुरा फुदका	10-20	50-100	500-600	7

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश : उपयोग में आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोग का समय : सीआईबी दिशा–निर्देश देखें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : 1. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : मितली, उल्टी, सिर–दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4. यदि खरपतवारनाशक सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : 1. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों या पात्रों को तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिये। 2. प्रयोग किये गये डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें। 3. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला न हों।

संग्रहण की शर्तें : 1. कीटनाशक के डिब्बों को अलग–अलग कमरों या अलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते है से दूर अन्य कमरों से दूर अलग–अलग कमरों में या अलमारियों में ताला चाबी में बंद रखे। 2.जिन कमरें अथवा अलमारियों में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाश युक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये ताकि कीटनाशक भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हों।

रासायनिक संरचना :

ऐसिटामिप्रिड सक्रि. तत्व	20.00% भा / भा
सोडियम डोडिसाइल बेन्ज़ीन सल्फोनेट	4.50% भा / भा
सोडियम सल्फेट एण्ड सोडियम एल्काईलेट	% भा / भा
सोडियम साइट्रेट, डाईहाइड्रेट	30.00% भा / भा
कैलशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाईहाइड्रेट	0.10% भा / भा
रंग लाने वाले घटक (ब्रिलीयन्ट ब्लू)	0.05% भा / भा
लैक्टोज मोनोहाइड्रेट	पर्याप्त मात्रा %
कुल :	**100% भा / भा**

चेतावनी : लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है।

MADRID®
Acetamiprid 20% SP
(Insecticide)

Acetamiprid 20% SP is a soluble powder formulation containing 20% of the active ingredient Acetamiprid. Acetamiprid 20% SP is a highly effective systemic insecticide for the control of aphids, jassids and whiteflies in cotton crop; Aphid in Cabbage; Aphids in Okra.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha AI (gm)	Dosage/Ha Formulation (gm)	Dilution in water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Cabbage	Aphids	15	75	500-600	7
Chilli	Thrips	10-20	50-100	500-600	3
Cotton	Whiteflies Jassids Aphids	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
Okra (Bhindi)	Aphids	15	75	500-600	3
Rice	Brown Plant Hopper	10-20	50-100	500-600	7

Direction Of Use : Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of Application : Refer CIB guidelines.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Nausea, vomiting, headache, dizziness and stomach-ache may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. Empty containers shall be broken and burried away from habitation. 2. The used containers or package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition :

Acetamiprid a.i.	20.00% w/w
Blend of Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate	4.50% w/w
Sodium Sulphate & Sodium alkylate Mixture	% w/w
Sodium Citrate, Dihydrate	30.00% w/w
Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate	0.10% w/w
Colouring agent (Brilliant Blue)	0.05% w/w
Lactose Monohydrate	Q.S. %
Total :	**100% w/w**

Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet.

AgroStar®

MADRID®
Acetamiprid 20% SP
(Insecticide)

मेड्रिड
ऐसिटामिप्रिड 20 प्रतिशत एसपी
(कीटनाशक)

FOR AGRICULTURAL USE ONLY
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
Read the leaflet before use

सूचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें

Manufactured & Marketed by :
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos. 001 and 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No. 73/B, Survey No. 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch, Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, Teh. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
info@agrostar.in **9503095030**
or **customer service team** at the above address

మ్యాడ్రిడ్
అసెటామిప్రిడ్ 20% SP
(కీటకనాశిని)

అసెటామిప్రిడ్ 20% SP అనేది నీటి లో కరిగే పొడి రూపంలోని ఫార్ములేషన్, ఇందు లో 20% క్రియాశీల పదార్థమైన అసెటామిప్రిడ్ ఉంటుంది. అసెటామిప్రిడ్ 20% SP ఒక అత్యంత ప్రభావవంతమైన సిస్టమిక్ కీటకనాశిని, ఇది పత్తి పంట లో ఆఫిడ్లు, జాసిడ్లు మరియు వైట్‌ఫ్లైలను నియంత్రించడానికి, క్యాబేజీ లో ఆఫిడ్ మరియు బెండకాయ (భిండి) లో ఆఫిడ్లను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

సిఫారసు:

పంట (లు)	పురుగు సాధారణ పేరు	మోతాదు/హె. AI (గ్రా)	మోతాదు/హె. ఫార్ములేషన్ (గ్రా)	నీటి లో కలపాల్సిన పరిమాణం (లీటర్)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత వరకు వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
క్యాబేజీ	ఆఫిడ్లు	15	75	500-600	7
మిరపకాయ	త్రిప్స్	10-20	50-100	500-600	3
పత్తి	వైట్‌ఫ్లైలు, జాసిడ్లు, ఆఫిడ్లు	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
బెండకాయ (భిండి)	ఆఫిడ్లు	15	75	500-600	3
వరి	బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్	10-20	50-100	500-600	7

వాడే విధానం: న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కాంప్రెషన్ న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్, కాంప్రెషన్ న్యాప్‌స్యాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ASPEE-HTP పవర్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగించవచ్చు.

వాడే సమయం: CIB మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశువుల ఆహారం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్లతో మరియు చర్మం తో సంపర్కాన్ని నివారించండి. 3. స్ప్రే మబ్బు ను శ్వాసలోకి తీసుకోకండి. గాలి దిశ లో స్ప్రే చేయండి. 4. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగండి. 5. స్ప్రే చేసే సమయం లో పొగ త్రాగడం, తినడం లేదా తాగడం మరియు నమలడం చేయకండి. 6. మిశ్రమం మరియు స్ప్రే చేసే సమయం లో పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించండి.

విషప్రభావ లక్షణాలు: వాంతి భావం, వాంతులు, తలనొప్పి, తల తిరగడం మరియు కడుపునొప్పి కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగితే, గొంతు వెనుక భాగాన్ని తాకి వాంతి చేయించండి. వాంతి స్పష్టంగా వచ్చే వరకు పునరావృతం చేయండి. రోగి అపస్మారక స్థితి లో ఉంటే వాంతి చేయించవద్దు. 2. బట్టలు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలు తీసివేసి చర్మాన్ని సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటి తో బాగా కడగండి. 3. కళ్ల లో పడితే, సుమారు 10 నుండి 15 నిమిషాలు ఉప్పు నీరు/శుభ్రమైన నీటి తో బాగా కడగండి. 4. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళితే, రోగి ను స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్లండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ: ఫీల్డ్ సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు ఈ ఉత్పత్తి పంటలకు హానికరం కాదు.

ప్రతివిషం: ప్రత్యేకమైన ప్రతివిషం తెలియదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స చేయాలి.

వాడిన కంటైనర్ల నిర్వాహణ: 1. ఖాళీ కంటైనర్లను పగలగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2. వాడిన కంటైనర్లు లేదా ప్యాకేజీలను మళ్లీ ఉపయోగించకుండా బయట వదిలి పెట్టకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు, మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీటి ను పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యం నివారించడానికి సురక్షితంగా నిర్వహించాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. కీటకనాశకాలను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువులు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ప్రదేశాల నుండి దూరంగా వేరు గదుల్లో లేదా ప్రాంగణాల్లో నిల్వ చేయాలి, లేదా కీటకనాశక పరిమాణం మరియు స్వభావం ఆధారంగా వేరు అల్మారా లో తాళం వేసి భద్రపరచాలి. 2. కీటకనాశకాలను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బలంగా నిర్మించబడి, పొడిగా, మంచి వెలుతురు ఉండేలా, గాలి ప్రసరణ తో మరియు ఆవిరి వల్ల కాలుష్యం జరగకుండా తగిన పరిమాణం లో ఉండాలి.

రసాయనిక సమ్మేళనం:

అసెటామిప్రిడ్ a.i.	20.00% w/w
సోడియం డోడెసైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ మిశ్రమం	4.50% w/w
సోడియం సల్ఫేట్ మరియు సోడియం ఆల్కైలేట్ మిశ్రమం	% w/w
సోడియం సిట్రేట్ డైహైడ్రేట్	30.00% w/w
కాల్షియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ డైహైడ్రేట్	0.10% w/w
రంగు పదార్థం (బ్రిలియంట్ బ్లూ)	0.05% w/w
లాక్టోజ్ మోనోహైడ్రేట్	Q.S. %
మొత్తం:	**100% w/w**

హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లెట్ లో సూచించిన పంటల తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

மாட்ரிட்
அசிடாமிப்ரிட் 20% SP
(பூச்சிக்கொல்லி)

அசிடாமிப்ரிட் 20% SP என்பது நீரில் கரையக்கூடிய தூள் வடிவிலான கலவை ஆகும், இதில் 20% செயலில் இருக்கும் மூலப்பொருளான அசிடாமிப்ரிட் உள்ளது. அசிடாமிப்ரிட் 20% SP என்பது மிகவும் பயனுள்ள சிஸ்டமிக் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும், இது பருத்தி பயிரில் அஃபிட்ஸ், ஜாஸிட்ஸ் மற்றும் வைட்ஃபிளைகளை கட்டுப்பாட்டிற்கும், முட்டைக்கோசில் அஃபிட் மற்றும் வெண்டைக்காய் (பிண்டி)யில் அஃபிட்ஸ் கட்டுப்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப்பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர் AI (கிராம்)	அளவு/ஹெக்டேர் பொருள் வடிவம் (கிராம்)	நீரில் கலக்கும் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
முட்டைக்கோஸ்	அஃபிட்ஸ்	15	75	500-600	7
மிளகாய்	த்ரிப்ஸ்	10-20	50-100	500-600	3
பருத்தி	வைட்ஃப்ளை ஜாஸிட்ஸ் அஃபிட்ஸ்	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
வெண்டைக்காய் (பிண்டி)	அஃபிட்ஸ்	15	75	500-600	3
நெல்	பிரௌன் பிளாண்ட் ஹாப்பர்	10-20	50-100	500-600	7

பயன்பாட்டு வழிமுறை: நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர், கம்பிரஷன் நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், கம்பிரஷன் நாப்சாக் பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்ப்ரேயர் பயன்படுத்தலாம்.

பயன்பாட்டு நேரம்: CIB வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றவும்.

எச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், காலியான உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனத்திலிருந்து தூரத்தில் வைத்திருக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு வராமல் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை சுவாசிக்க வேண்டாம். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு களங்கமான ஆடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், குடித்தல் அல்லது உண்பதை தவிர்க்கவும். 6. கலவை மற்றும் தெளிக்கும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

நஞ்சு தாக்கத்தின் அறிகுறிகள்: வாந்தி உணர்வு, வாந்தி, தலைவலி, தலைச்சுற்றல் மற்றும் வயிற்றுவலி ஏற்படலாம்.

முதல் உதவி: 1. விழுங்கப்பட்டால், தொண்டையின் பின்புறத்தை மெதுவாகத் தொட்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். வாந்தி தெளிவாக வரும் வரை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளர் மயக்க நிலையில் இருந்தால் வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம். 2. உடைகள் மற்றும் தோல் பாதிக்கப்பட்டால், உடைகளை அகற்றி, பாதிக்கப்பட்ட தோலை சோப்பு மற்றும் அதிகளவு நீரால் நன்றாக கழுவவும். 3. கண்களில் பட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை போதுமான உப்பு நீர்/தூய நீரால் நன்றாக கழுவவும். 4. மூச்சு வழியாக சென்றால், நோயாளியை சுத்தமான காற்றுக்கு கொண்டு செல்லவும்.

பைட்டோடாக்ஸிசிட்டி: புலத் பரிந்துரைகளின்படி பயன்படுத்தினால் இந்த தயாரிப்பு பயிர்களுக்கு சேதம் விளைவிக்காது.

எதிர்விஷம்: குறிப்பிட்ட எதிர்விஷம் எதுவும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னர்களின் அகற்றம்: 1. காலியான கன்டெய்னர்களை உடைத்து குடியிருப்பிடங்களிலிருந்து தூரத்தில் புதைத்து விட வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட கன்டெய்னர்கள் அல்லது பொதிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் இருக்க வெளியே விடக்கூடாது. 3. பொதிகள், மீதமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாடு ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொதிகள், பிற பொருட்கள் சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது இடங்களிலிருந்து விலகி தனியான அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும், அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்ப தனித்த அலமாரிகளில் பூட்டு மற்றும் சாவியுடன் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட வேண்டும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது இடங்கள் வலுவாக கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நல்ல வெளிச்சம் கொண்ட, காற்றோட்டம் உள்ள மற்றும் வாயு மூலம் மாசுபாடு ஏற்படாமல் போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

ரசாயனக் கலவை:

அசிடாமிப்ரிட் a.i.	20.00% w/w
சோடியம் டோடெசைல் பென்சீன் சல்ஃபோனேட் கலவை	4.50% w/w
சோடியம் சல்பேட் மற்றும் சோடியம் ஆல்கைலேட் கலவை	% w/w
சோடியம் சிட்ரேட் டைஹைட்ரேட்	30.00% w/w
கால்சியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் டைஹைட்ரேட்	0.10% w/w
நிறப்பொருள் (பிரில்லியன்ட் ப்ளூ)	0.05% w/w
லாக்டோஸ் மோனோஹைட்ரேட்	Q.S. %
மொத்தம்:	**100% w/w**

எச்சரிக்கை: இந்த லேபல்/லீஃப்லெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களைத் தவிர மற்ற எந்த பயிர்களிலும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್
ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% SP
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% SP ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪುಡಿ ರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 20% ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾದ ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಇದೆ. ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% SP ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಫಿಡ್‌ಗಳು, ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕೋಸುದಲ್ಲಿ ಅಫಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (ಭಿಂಡಿ) ಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಮಾತ್ರೆ/ಹೆ. AI (ಗ್ರಾ)	ಮಾತ್ರೆ/ಹೆ. ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ವರೆಗೆ ಇರುವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಕೋಸು	ಅಫಿಡ್‌ಗಳು	15	75	500-600	7
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	10-20	50-100	500-600	3
ಹತ್ತಿ	ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈಗಳು, ಜಾಸಿಡ್‌ಗಳು, ಅಫಿಡ್‌ಗಳು	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (ಭಿಂಡಿ)	ಅಫಿಡ್‌ಗಳು	15	75	500-600	3
ಅಕ್ಕಿ	ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್	10-20	50-100	500-600	7

ಬಳಕೆ ವಿಧಾನ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ASPEE-HTP ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ರಯೋಗ ಸಮಯ: CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸಾವಧಾನಿಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜಿನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆಳೆಯಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. 4. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಚವೆಯುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ-ನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಕೈ ಹಾಕಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಇರುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಯುಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ a.i.	20.00% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡೆಸೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	4.50% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕೈಲೇಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	% w/w
ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್	30.00% w/w
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್	0.10% w/w
ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಏಜೆಂಟ್ (ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಲೂ)	0.05% w/w
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮೊನೋಹೈಡ್ರೇಟ್	Q.S. %
ಒಟ್ಟು:	**100% w/w**

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ম্যাড্রিড
অ্যাসিটামিপ্রিড 20% SP
(কীটনাশক)

অ্যাসিটামিপ্রিড 20% SP একটি দ্রবণীয় পাউডার ফর্মুলেশন, যাতে 20% সক্রিয় উপাদান অ্যাসিটামিপ্রিড রয়েছে। অ্যাসিটামিপ্রিড 20% SP একটি অত্যন্ত কার্যকর সিস্টেমিক কীটনাশক, যা তুলা ফসলে এফিড, জ্যাসিড ও হোয়াইটফ্লাই নিয়ন্ত্রণে, বাঁধাকপিতে এফিড এবং ঢেঁড়সে (ভেন্ডি) এফিডসমূহ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

সুপারিশ:

ফসল	পোকার সাধারণ নাম	ডোজ/হেক্টর AI (গ্রাম)	ডোজ/হেক্টর ফর্মুলেশন (গ্রাম)	জলে মিশ্রণের পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল (দিন)
বাঁধাকপি	এফিড	15	75	500-600	7
লঙ্কা	থ্রিপস	10-20	50-100	500-600	3
তুলা	হোয়াইটফ্লাই, জ্যাসিড, এফিড	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
ঢেঁড়স (ভেন্ডি)	এফিড	15	75	500-600	3
ধান	ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার	10-20	50-100	500-600	7

ব্যবহারের নির্দেশ: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কমপ্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কমপ্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার এবং ASPEE-HTP পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রয়োগের সময়: CIB নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

সতর্কতা: 1. খাবারদাবার, খালি খাবারের পাত্র এবং পশু খাদ্য থেকে দূরে রাখুন। 2. মুখ, চোখ এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। 3. স্প্রের কুয়াশা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন না। বাতাসের দিকেই স্প্রে করুন। 4. স্প্রে করার পর দূষিত কাপড় এবং শরীরের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। 5. স্প্রে করার সময় ধূমপান, খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত থাকুন। 6. মিশ্রণ এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: বমি বমি ভাব, বমি, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং পেটব্যথা হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: 1. গিলে ফেললে গলার পেছনে হালকা স্পর্শ দিয়ে বমি করান। বমি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। রোগী অচেতন থাকলে বমি করাবেন না। 2. কাপড় ও ত্বক দূষিত হলে কাপড় খুলে ফেলুন এবং ত্বককে সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে নিন। 3. চোখে গেলে পরিষ্কার জল বা স্যালাইন দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ভালোভাবে ধুয়ে নিন। 4. শ্বাসের মাধ্যমে ঢুকে গেলে রোগীকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান।

ফাইটোটক্সিসিটি: মাঠের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহার করলে এই প্রোডাক্ট ফসলের জন্য ক্ষতিকর নয়।

প্রতিষেধক: নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

ব্যবহৃত কন্টেইনারের নিষ্পত্তি: 1. খালি কন্টেইনার ভেঙে বসবাসের এলাকা থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। 2. ব্যবহৃত কন্টেইনার বা প্যাকেট পুনরায় ব্যবহার রোধ করার জন্য বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। 3. প্যাকেট, অবশিষ্ট উপাদান এবং ধোয়ার জল নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জল দূষণ না ঘটে।

সংরক্ষণের শর্ত: 1. কীটনাশকযুক্ত প্যাকেটগুলি অন্য কোনো সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ঘর বা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে, অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথক আলমারিতে তালা ও চাবি দিয়ে সুরক্ষিতভাবে রাখতে হবে। 2. কীটনাশক সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ঘর বা স্থানটি মজবুতভাবে নির্মিত, শুষ্ক, পর্যাপ্ত আলোযুক্ত, সঠিকভাবে বায়ুচলাচলযুক্ত এবং পর্যাপ্ত আয়তনের হওয়া উচিত, যাতে বাষ্পের মাধ্যমে কোনো দূষণ না ঘটে।

রাসায়নিক গঠন:

অ্যাসিটামিপ্রিড a.i.	20.00% w/w
সোডিয়াম ডোডেসাইল বেনজিন সালফোনেটের মিশ্রণ	4.50% w/w
সোডিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম অ্যালকাইলেটের মিশ্রণ	% w/w
সোডিয়াম সিট্রেট ডাইহাইড্রেট	30.00% w/w
ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ডাইহাইড্রেট	0.10% w/w
রঙ (ব্রিলিয়ান্ট ব্লু)	0.05% w/w
ল্যাকটোজ মনোহাইড্রেট	Q.S. %
মোট:	

সতর্কীকরণ: এই লেবেল/লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

മാഡ്രിഡ്
അസെറ്റാമിപ്രിഡ് 20% SP
(കീടനാശിനി)

അസെറ്റാമിപ്രിഡ് 20% SP ഒരു വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഫോർമുലേഷൻ ആണ്, ഇതിൽ 20% സജീവ ഘടകമായ അസെറ്റാമിപ്രിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അസെറ്റാമിപ്രിഡ് 20% SP വളരെ ഫലപ്രദമായ സിസ്റ്റമിക് കീടനാശിനിയാണ്, ഇത് പരുത്തി വിളയിൽ ആഫിഡുകൾ, ജാസിഡുകൾ, വൈറ്റ്ഫ്ലൈകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ, കാബേജിൽ ആഫിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ, വെണ്ട (ഭിണ്ടി)യിൽ ആഫിഡുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശ:

വിള(കൾ)	കീടത്തിന്റെ പൊതുപേര്	മാത്ര/ഹെക്ടർ AI (ഗ്രാം)	മാത്ര/ഹെക്ടർ ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ കലർക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാലയളവ് (ദിവസങ്ങൾ)
കാബേജ്	ആഫിഡുകൾ	15	75	500-600	7
മുളക്	ത്രിപ്സ്	10-20	50-100	500-600	3
പരുത്തി	വൈറ്റ്ഫ്ലൈകൾ, ജാസിഡുകൾ, ആഫിഡുകൾ	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
വെണ്ട (ഭിണ്ടി)	ആഫിഡുകൾ	15	75	500-600	3
നെല്ല്	ബ്രൗൺ പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ	10-20	50-100	500-600	7

ഉപയോഗ വിധി: നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, ഫൂട്ട് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് ബാറ്ററി സ്പ്രേയർ, ASPEE-HTP പവർ സ്പ്രേയർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രയോഗ സമയം: CIB മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.

ജാഗ്രതകൾ: 1. ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ, ശൂന്യമായ ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലെയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. 2. വായ്, കണ്ണ്, ചർമ്മം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ മഞ്ഞ് ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. 4. സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 5. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കൽ, കുടിക്കൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചവയ്ക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യരുത്. 6. കലർക്കുന്നതിനും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനും സമയത്ത് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ഛർദ്ദിവേദന, ഛർദ്ദി, തലവേദന, തലചുറ്റൽ, വയറുവേദന എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ: 1. വിഴുങ്ങിയാൽ, കഴുത്തിന്റെ പിന്നിൽ സാവധാനം സ്പർശിച്ച് ഛർദ്ദി വരുത്തുക. ഛർദ്ദി തെളിഞ്ഞുവരുന്നതുവരെ ആവർത്തിക്കുക. രോഗി ബോധരഹിതനാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്. 2. വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും മലിനമായാൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കി ചർമ്മം സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. 3. കണ്ണിൽ പതിച്ചാൽ, ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഉപ്പുവെള്ളം/ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. 4. ശ്വാസം വഴി ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധമായ വായുവിലേക്ക് മാറ്റുക.

ഫൈറ്റോട്ടോക്സിസിറ്റി: ഫീൽഡ് ശുപാർശകൾ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിളകൾക്ക് ഹാനികരമല്ല.

പ്രതിരോധ മരുന്ന്: പ്രത്യേകമായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നിർമാർജനം: 1. ശൂന്യമായ കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർത്തു താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ അടക്കം ചെയ്യണം. 2. ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പുറത്തുവെക്കരുത്. 3. പാക്കേജുകൾ, ശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ പരിസ്ഥിതി, ജല മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷിതമായി നിർമാർജനം ചെയ്യണം.

സംഭരണ നിബന്ധനകൾ: 1. കീടനാശിനികൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള പ്രത്യേക മുറികളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരികളിൽ താക്കോലിട്ട് സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കണം. 2. കീടനാശിനികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുറികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ശക്തമായി നിർമ്മിച്ചവയും, വരണ്ടതുമായും, നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതുമായും, വാതകങ്ങൾ മൂലം മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മതിയായ വിസ്തൃതിയുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസഘടന:

അസെറ്റാമിപ്രിഡ് a.i.	20.00% w/w
സോഡിയം ഡോഡെസൈൽ ബെൻസീൻ സൾഫോനേറ്റ് മിശ്രിതം	4.50% w/w
സോഡിയം സൾഫേറ്റ് & സോഡിയം ആൽക്കൈലേറ്റ് മിശ്രിതം	% w/w
സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ്	30.00% w/w
കാൽസ്യം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ്	0.10% w/w
നിറം നൽകുന്ന ഘടകം (ബ്രിലിയന്റ് ബ്ലൂ)	0.05% w/w
ലാക്ടോസ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ്	Q.S. %
ആകെ:	**100% w/w**

ജാഗ്രത: ഈ ലേബൽ/ലീഫ്ലെറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിളകൾ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

میڈرڈ
ایسیٹیمیپریڈ 20% ایس پی
(جراثیم کش)

ایسیٹامیپرڈ ۲۰ فیصد ایس پی ایک حل ہونے والا پاؤڈر فارمولا ہے جس میں 20 فیصد فعال جزوا ایسیٹیمیپریڈ شامل ہوتا ہے۔ ایسیٹیمیپریڈ 20 فیصد ایس پی ایک انتہائی مؤثر سسٹیمک کیڑے مار دوا ہے جو کپاس کی فصل میں افڈز، جسڈز اور وائیٹ فلائز کے کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے؛ گوبھی میں افڈز اور بھنڈی میں بھی افڈز کے خاتمے کے لیے مؤثر ہے۔

سفارشات:

فصل	کیڑے کا نام	فی ہیکٹیئر مقدار اے آئی (گرام)	فی ہیکٹیئر مقدار ترکیب (گرام)	پانی کی مقدار (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ و فصل کاٹنے کے درمیان وقفہ (دنوں میں)
گوبھی	افڈز	15	75	500-600	7
مرچ	تھرپس	10-20	50-100	500-600	3
کپاس	سفید مکھی جسڈز افڈز	20 10 10	100 50 50	500-600 500-600 500-600	15 15 15
بھنڈی	افڈز	15	75	500-600	3
چاول	براؤن پلانٹ ہاپر	10-20	50-100	500-600	7

استعمال کا طریقہ: نیک سیپ اسپریر، فُٹ اسپریر، کمپریشن نیک سیپ اسپریر، کمپریشن نیک سیپ بیٹری اسپریر اور ASPEE-HTP پاور اسپرے راستعمال کیے جا سکتے ہیں۔

استعمال کا وقت: سی آئی بی کے رہنما خطوط کا حوالہ دیں۔

احتیاطی تدابیر: 1. خوراک، خالی خوراک کے برتنوں اور جانوروں کی خوراک سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے رابطے سے بچیں۔ 3. اسپرے کی دھند (spray mist) کو سانس کے ذریعے اندر لینے سے پرہیز کریں۔ اسپرے ہمیشہ ہوا کی سمت میں کریں۔ 4. اسپرے کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھولیں۔ 5. اسپرے کے دوران تمباکو نوشی، کھانا پینا اور کسی بھی چیز کو چبانے سے گریز کریں۔ 6. مکسنگ اور اسپرے کے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔

زہریلے اثرات کی علامات: متلی، قے، سر درد، چکر آنا اور پیٹ درد ہو سکتا ہے۔

ابتدائی طبی امداد: 1. اگر نگل لیا جائے تو گلے کے پچھلے حصے کو چھیڑ کر قے کروائیں۔ اسے اس وقت تک دہرائیں جب تک قے صاف نہ ہو جائے۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کروائیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہوں تو کپڑے اتار دیں اور متاثرہ جلد کو صابن اور پانی سے اچھی طرح اور وافر مقدار میں دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں متاثر ہوں تو انہیں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک نمکین محلول یا صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ 4. اگر سانس کے ذریعے اثر ہوا ہو تو مریض کو فوراً تازہ ہوا میں لے جائیں۔

پودوں پر زہریلا اثر: یہ پروڈکٹ جب کھیت کی سفارشات کے مطابق استعمال کی جائے تو پودوں کے لیے نقصان دہ (زہریلا) نہیں ہوتی۔

تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق معلوم نہیں ہے۔ علاج علامات کے مطابق کیا جائے۔

استعمال شدہ ڈبے کو تلف کرنے کا طریقہ: 1. خالی ڈبوں کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کر دیں۔ 2. استعمال شدہ ڈبوں یا پیکج کو باہر کھلا نہ چھوڑیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ 3. پیکج، بچا ہوا مواد اور دھوئی گئی پانی کو محفوظ طریقے سے ضائع کریں تاکہ ماحول اور پانی آلودہ نہ ہو۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط: 1. کیڑے مار ادویات (Insecticides) والے پیکیس کو الگ کمروں یا جگہوں میں محفوظ کیا جائے جو دیگر اشیاء کے ذخیرہ کرنے کی جگہوں سے دور ہوں، یا مقدار اور نوعیت کے مطابق انہیں تالے والی علیحدہ الماری میں رکھا جائے۔ 2. کیڑے مار ادویات رکھنے والے کمرے یا جگہ مضبوط تعمیر شدہ، خشک، اچھی روشنی والے، ہوادار (ventilated) اور مناسب سائز کے ہونے چاہئیں تاکہ بخارات کے ذریعے آلودگی سے بچا جا سکے۔

کیمیائی ترکیب:

ایسیٹا میپرڈ اے۔ آئی	20.00%ڈبلیو/ڈبلیو
سوڈیم ڈوڈیسائل کا مرکب / بینزین سلفونیٹ	4.50%ڈبلیو/ڈبلیو
سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم الکائیلیٹ کا مرکب	%ڈبلیو/ڈبلیو
سوڈیم سٹریٹ ڈائی ہائیڈریٹ	30.00%ڈبلیو/ڈبلیو
کیلشیم ہائیڈروجن فاسفیٹ ڈائی ہائیڈریٹ	0.10%ڈبلیو/ڈبلیو
رنگ دینے والا مادہ (برلینٹ بلیو)	0.10%ڈبلیو/ڈبلیو
لیکٹوز مونوہائیڈریٹ	کیو۔ایس۔%
کل:	100%ڈبلیو/ڈبلیو

احتیاط: اس لیبل/پمفلٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔