



## INSTRUCTIONS READ BEFORE USE

# MAGNA

Flubendiamide 19.92% + Thiacloprid 19.92% SC

### Insecticide

Manufactured & Marketed By:

Link Agritech Private Limited,  
Regd. Office: Office Nos. 001 and 002, Ground Floor, Wing 'A'  
Office Nos. 003 and 004, Ground Floor, Wing 'B'  
Nishi Tech Park, Wadgaon Street, Pune - 411014, Maharashtra, India

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 7/3B, Suneo No 73, Anu Jhankri, Taluka Karjat, Vadgaon, Gujarat - 391240	GLAHRM01713
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No 238/1A, GDC Estate, Gandi, Gandhinagar, Bhopal, Gujarat-381119	GJ4BHA-41486
AGR	Unit III - Kharsa No 713/84, Gram Dahni Khunt, Bagru, Jaisalmer, Rajasthan - 302007	MJ/DPP/2025/20221



Visit your nearest AgroStar Local Dukan  
Scan to download the AgroStar app  
For customer feedback contact us  
@Infoagrostar.in @9603095030  
or customer service team in the store address



## सुचना

इस्तेमाल करनेसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ें।

# मैगना

फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% भार/भार कीटनाशक

निर्माण एवं विपणन द्वारा:

पूरुविका प्रायोजन प्राइवेट लिमिटेड,  
संयुक्तियां प्रायोजन, अजमेर रोड, ००१ और ००२, भुवनेश्वर, गुजरात  
कान्ठारिका रो. ००१ और ००२, भुवनेश्वर, गुजरात  
न्यायिक इकाई, इंदौर रोड, गुजरात, गुजरात, गुजरात, गुजरात

यूनिट कोड	कारखाने का पता	निर्माण लाइसेंस संख्या
ए.जी.के.	यूनिट I - शेड नं. 7/3B, सुनेओ नं. 73, अनु जहंकारी, तालुका कारजा, वाडगाँव, गुजरात - 391240	जी.एल.एम.01713
ए.जी.पी.	यूनिट II - फ़ैसिलिटी B-1, प्लॉट नं. 238/1A, GDC एस्टेट, गान्धी, गान्धिनगर, भोपाल, गुजरात - 381119	जी.एल.एम.41486
ए.जी.सी.	यूनिट III - खरसा नं. 713/84, ग्राम दाहनी कुन्त, बागुरु, जैसलमेर, राजस्थान - 302007	एम.डी.पी./2025/20221



Visit your nearest AgroStar Local Dukan  
Scan to download the AgroStar app  
For customer feedback contact us  
@Infoagrostar.in @9603095030  
or customer service team in the store address

## Flubendiamide 19.92% + Thiacloprid 19.92% SC Insecticide

Flubendiamide 19.92% + Thiacloprid 19.92% w/W SC formulation contain 199.2 g of Flubendiamide and 199.2 of Thiacloprid active ingredient per kg of formulation which is equal to 240 g of Fludendiamide + 240 g of Thiacloprid active ingredient per litre of formulation. Flubendiamide 19.92% + Thiacloprid 19.92% w/w SC formulation is used as a foliar spray for the control of thrips and fruit borer on Chilli and Yellow stem borer and leaf folder on rice.

### Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosages / Ha		Dilution in Water (Litr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (gms)	Formulation		
Chilli	Thrips and fruit borer	48+48-60+60	200-250	500	5
Rice	Yellow stem borer and leaf folder	60+60	250	500	33

### Direction of Use:

Method of application: It should be applied as a foliar. No specific soil conditions are prescribed. Use knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. Avoid spraying during part of the day when it's very hot, windy or rainy or when the foliage is wet. Do not spray against the direction of the wind. Preparation of spray solution: Take a small quantity water and add required quantity of product, mix thoroughly and then add remaining quantity of water while stirring vigorously.

### Time of Application:

Give the first spray as soon as the pest incidence reaches ETL (Economic Threshold Level) and 1-2 more sprays depending upon the level of the pest population. Observe waiting period. As soon as the spray droplets dries up.

### Precaution:

Handle with care. Do not touch or inhale the contents. While handling the product, wear personal protective clothing, rubber gloves, rubber boots, face mask, safety glasses. Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area. Keep away from source of ignition. Avoid contact with spilled product and contaminated surfaces.

### Symptoms of Poisoning:

Can cause nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, dizziness, headache, weakness and mild sedation.

### First Aid:

Ingestion: Do not induce vomiting unless advised by the attending physician. If patient is alert and conscious, rinse the mouth with water. Give 1-2 glasses of water. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Inhalation: Keep the patient away from the place of incident. Loosen the clothes. If patient is not breathing, give mouth to mouth breathing or artificial respiration.

Eye: Wash with plenty of water of normal temperature at least for 15 minutes. If redness, pain and irritation occur; call the eye specialist, immediately.

Skin: Wash thoroughly, with plenty of water. If symptoms of irritation and blistering occur, call the skin specialist, immediately.

### Antidote:

There is no specific antidote. Treat symptomatically.

### Disposal Of Used Container:

Destroy empty containers by crushing and burying in soil in a safe place away from water sources and habitats. No containers should be left outside to prevent its re-use. Used containers should be destroyed in such a manner so that there will be no water or environmental pollution.

### Storage Conditions:

The packages containing insecticide should be stored in original containers in a separate room or almirah under lock and key depending upon quantity of material. Keep away from reach of children, pet animals, food stuffs, animal feed etc. Store in a cool and dry place. The premises for storage should be well lit, well ventilated and sufficient in dimensions.

## फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% एस.सी. कीटनाशक

फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% वजन/वजन एस.सी. फॉर्म्युलेशन में १९९.२ ग्राम फ्लुबेंडायामाइड तथा १९९.२ ग्राम थायाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व प्रति कि.ग्रा. फॉर्म्युलेशन में होता है, जो कि प्रति लीटर फॉर्म्युलेशन में २४० ग्राम फ्लुबेंडायामाइड + २४० ग्राम थायाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व के बराबर है। फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% वजन/वजन एस.सी. फॉर्म्युलेशन का प्रयोग पत्तियों पर छिड़काव के रूप में किया जाता है, जो मिर्ची में थ्रिप्स एवं फलछेदक तथा धान में पीली तना छेदक एवं पत्ती मुड़नार के नियंत्रण के लिए है।

### अनुशंसा:

फसल	कीट का सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी में घोलने की मात्रा (ली.)	अतिम छिड़काव से कवरिंग तक (दिनांक अंतर)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)		
मिर्च	थ्रिप्स एवं फलछेदक	४८+४८-६०+६०	२००-२५०	५००	५
धान	पीली तना छेदक एवं पत्ती मुड़नार	६०+६०	२५०	५००	३३

### प्रयोग की विधि:

प्रयोग पत्तियों पर छिड़काव के रूप में करें। किसी विशेष मिट्टी की शर्त आवश्यक नहीं है। खोखली शंकु नोज़ल लगे हुए हाथ पम्प स्प्रेयर का प्रयोग करें। अत्यधिक गर्मी, आंधी, वर्षा या गीली पत्तियों की स्थिति में छिड़काव न करें। हवा की दिशा के विपरीत छिड़काव न करें। घोल की तैयारी हेतु थोड़े पानी में आवश्यक मात्रा का दवा मिलाएँ और अच्छी तरह घोल फिर शेष पानी मिलाएँ और हिलाते रहें।

### प्रयोग का समय:

पहला छिड़काव जैसे ही कीट प्रकोप आर्थिक हानि स्तर (ई.टी.एल) पर पहुँचे तब करें। आवश्यकता अनुसार १-२ और छिड़काव करें। प्रतीक्षा अवधि का पालन करें। जैसे ही छिड़काव सूख जाए।

### सावधानी:

सावधानी से संभालें। उत्पाद को छुँएँ या सूँघें नहीं। प्रयोग करते समय सुरक्षा वस्त्र, रबर क दस्तानें, रबर के जूते, मास्क, संपेटी चश्मा आदि पहनें। छिड़काव स्थल पर धूम्रपान, खाना-पीना ज़रिजत है। आग के स्रोत से दूर रहें। गिरे हुए उत्पाद या दूषित सतहों से बचें।

### विषाक्तता के लक्षण:

मितली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर, सिरदर्द, कमजोरी एवं हल्की सुस्ती हो सकती है।

### प्रथम चिकित्सा:

निगलने पर: चिकित्सक की सलाह बिना उल्टी न कराएँ। यदि रोगी सूचेत है तो मुँह साफ़ पानी से धोएँ और १-२ गिलास पानी पिलाएँ। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें।

साँस द्वारा जाने पर: रोगी को घटना स्थल से दूर ले जाएँ। कपड़े ढीले करें। साँस न आने पर कृत्रिम श्वसन दें।

आँखों में जाने पर: सामान्य तापमान के पानी से कम से कम १५ मिनट धोएँ। लालिमा, दर्द या जलन होने पर नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें।

त्वचा पर लगने पर: त्वचा को पर्याप्त पानी से धोएँ। जलन या छाले पड़ने पर त्वचा विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करें।

### प्रतिविष:

कोई विशेष प्रतिविष उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

### प्रयोग किए गए डिब्बों का निपटान:

खाली डिब्बों को कुचलकर मिट्टी में सुरक्षित गहराई में दबाएँ। जल स्रोत एवं आबादी से दूर रहें। इन्हें पुनः उपयोग के लिए बाहर न छोड़ें। प्रयुक्त डिब्बों का निपटान इस प्रकार करें कि जल या पर्यावरण प्रदूषण न हो।

### भंडारण की स्थिति:

कीटनाशक को उसके मूल डिब्बों में ताले लगे कमरे/अलमारी में सुरक्षित रहें। बच्चों, पालतू जानवरों, खाद्य सामग्री एवं पशु आहार से दूर रहें। ठंडी व सूखी जगह पर रहें। भंडारण स्थल हवादार, पर्याप्त रोशनी वाला एवं पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

## इलुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% एस.सी. कीटनाशक

इलुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% वजन/वजन एस.सी. फॉर्म्युलेशन में १९९.२ ग्राम इलुबेंडायामाइड अर्थात् १९९.२ ग्राम थायाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व प्रति किलोग्राम फॉर्म्युलेशन में होता है, जो प्रति लिटर फॉर्म्युलेशन में २४० ग्राम इलुबेंडायामाइड + २४० ग्राम थायाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व का बराबर है। फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% वजन/वजन एस.सी. फॉर्म्युलेशन का प्रयोग पत्तियों पर छिड़काव के लिए है, जो मिर्ची में थ्रिप्स एवं फलछेदक तथा धान में पीली तना छेदक के नियंत्रण के लिए है।

### इलाज:

पाठ	कीटनाशक सामान्य नाम	प्रति हेक्टेर मात्रा		पानी में घोलने की मात्रा (ली.)	अतिम छिड़काव से कवरिंग तक (दिनांक अंतर)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)		
मरच	थ्रिप्स अर्थात् फलछेदक	४८+४८-६०+६०	२००-२५०	५००	५
धान	पीली तना छेदक एवं पत्ती मुड़नार	६०+६०	२५०	५००	३३

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

### प्रयोग की विधि:

इलाज उपयोग पांटेस पर छेड़काव तरीके करवाँ जमीनीली ड्रेथेड भास शरत ज़रुरी नथी. भोभेजुं शंकु नोज़लवयुं हेडस स्थीयन वापरवयुं वधारे ज़रुरी. पवन, वरसद अथवा पांटेस पीयन होय. न्यारे छेड़काव न करवो. पवननी दिशावा लुइर छेड़काव न करवो। इलाज ब्रववध भनवावय माटे थोडुं पाछी लो, तेभां ज़रुरी मात्रामां एव लेवलो अने सारी शीते मिश्रित करे पछी बाकीनु पाछी उमेरो अने इलावत रहे.

## फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% एस.सी. कीटनाशक

फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% वजन/वजन एस.सी. फॉर्म्युलेशन में १९९.२ ग्राम फ्लुबेंडायामाइड तथा १९९.२ ग्राम थायाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व प्रति कि.ग्रा. फॉर्म्युलेशन में होता है, जो कि प्रति लीटर फॉर्म्युलेशन में २४० ग्राम फ्लुबेंडायामाइड + २४० ग्राम थायाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व का बराबर है। फ्लुबेंडायामाइड १९.९२% + थायाक्लोप्रिड १९.९२% वजन/वजन एस.सी. फॉर्म्युलेशन का प्रयोग पत्तियों पर छिड़काव के लिए है, जो मिर्ची में थ्रिप्स एवं फलछेदक तथा धान में पीली तना छेदक के नियंत्रण के लिए है।

### Recommendation:

पिक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेर डोज		पाण्यात मिस्रण (लिटर)	फेवना फवारणीकरिता वापरणीय (मि.ली.)
		सक्रिय घटक (ग्राम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)		
मिर्ची	थ्रिप्स व फलछेदक	४८+४८-६०+६०	२००-२५०	५००	५
तांदूळ	पिवळा खोडकिडा व पाने वाकवणारी अळी	६०+६०	२५०	५००	३३

### वारणपाची पद्धत:

फवारणी पानावर करावी। जमिनीची कोणतीही विशेष अट नाही। खोबरे कोन नॉझल असलेल्या हात फवारणी यंत्राचा वापर करावा। वृष उष्ण, वादळी, पावसाळी हवामानात किंवा पाने ओली असताना फवारणी करू नये। बाऱ्याच्या उलट दिशेने फवारणी करू नये। द्रावण तयार करण्यासाठी थोडे पाणी घेऊन त्यात लागणारी औषधाची मात्रा मिसळावी व नीट बवळून घ्यावे, मग उरलेले पाणी मिसळावे व हलवावे।

### फवारणीचा वेळ:

कीटकांचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीवर (ETL) पोहोचताच पहिली फवारणी करावी। गरजेनुसार १-२ अथिक फवारणा कराव्यात। प्रतीक्षा कालावधी पाळावा। फवारणी सुकताच थांबवावी।

### सावधगिरी:

काळजीपूर्वक हाताळा। औषधाला हात लावू नये किंवा वास घेऊ नये। वापरताना सुरक्षामक कपडे, रबरचे हातमोजे, रबरचे बूट, मास्क, सुरक्षामक चप्चा घालावा। फवारणीच्या ठिकाणी धूम्रपान, जेवण, पिणे मनाई आहे। आगीच्या खोतापासून दूर ठेवावे। सांडलेले औषध किंवा दूषित पृष्ठभाग टाळावा।

### विषबाधेची लक्षणे:

माळमळ, उलटी, जुलाब, पोटदुखी, चक्कर, डोकेदुखी, अशक्तपणा व हलकी झोप येऊ शकते।

### प्राथमिक उपचार:

गळ्यातल्या: डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करू नये। रुग्ण शुद्धित असल्यास तोंड पाण्याने धुवून १-२ ग्लास पाणी घ्यावे। बेशुद्ध रुग्णाला तोंडाचा काहीही टुक नये।

श्वसनावाटे गेल्यास: रुग्णाला ठिकाणापासून दूर न्यावे। कपडे सैल करावेत। श्वास घेत नसल्यास कृत्रिम श्वसन घ्यावे।

डोळ्यात गेल्यास: साधा पाण्याने किमान १५ मिनिटे धुवावे। लालसरपणा, वेदना किंवा जळजळ झाल्यास डॉक्टरांच्या तज्ञांचा सल्ला घ्यावा।

त्वचेवर गेल्यास: भरपूर पाण्याने धुवावे। जळजळ किंवा फोड आले तर त्वचारोग तज्ञांचा सल्ला घ्यावा।

### प्रतिविष:

कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नाही। लक्षणानुसार उपचार करावा।

### प्रयोग कीटकाचे सामान्य नाव

फवारणी पानावर करावी। जमिनीची कोणतीही विशेष अट नाही। खोबरे कोन नॉझल असलेल्या हात फवारणी यंत्राचा वापर करावा। वृष उष्ण, वादळी, पावसाळी हवामानात किंवा पाने ओली असताना फवारणी करू नये। बाऱ्याच्या उलट दिशेने फवारणी करू नये। द्रावण तय

