AgroStar®

MANDOZ®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

मैंडोज़

कार्बेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% घुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Mancozeb 63% + Carbendazim 12% WP is a systemic and contact fungicide used for seed treatment for the effective control of tikka leaf spot, collar rot and dry root rot diseases of Groundnut, Blast on Paddy, Early blight, Late blight, black scruf on Potato, Blister blight, Grey blight, Red rust, Dieback, Black rot on Tea, Downey mildew, Powdery mildew & Anthracnose on Grape, Powdery mildew & Anthracnose on Mango, Leaf spot, fruit rot and Powdery mildew on Chilli, Downey mildew & leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple and Tikka leaf spot, Collar rot and Dry root rot on Groundnut. Caution :- Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture

Recommendation

		Dosage/HA				
Crop(s)	**Common Name of Pest**	**AI (gm / %)**	**Formulation (gm / ml)**	**Dilution in Water (L)**	**Waiting Period between last spray to harvest (Days)**	**Re-entry after each Application (Hours)**
Apple	Fruit scab & Powdery mildew	0.19%	0.25%	As required depending upon crop canopy	20	-
Chilli	Leaf spot, fruit rot and powdery mildew	563	750	500	3	-
Cotton	Alternaria leaf spot and grey mildew	180+945	1500	500	71	-
Grape	Downy mildew, powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7	-
Groundnut	Leaf spot, blast	375	500	500	72	-
Groundnut	Tikka leaf spot, Collar rot & Dry root rot	1.88	2.5	0	seed dresess	-
Maize	Downey mildew & Leaf blight	120+630	1000	500	37	-
Mandarin	Twig blight, sooty mould, anthracnose fruit rot and anthracnose leaf spot	0.23%	0.30%	500	30	-
Mango	Powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7	-
Paddy	Blast	563	750	750	57	-
Potato	Early blight, Late blight, Black scurf	1312.5	1750	500	47	-
Soybean	Alternaria leaf spot, Myrothecium leaf spot, Pod & stem blight, Anthracnose	150+787.5	1250	500	31	-
Tea	Blister blight, Grey blight, Red rust, Die-back, Black rot	937.5	1250	250-500	7	-

Direction Of Use
Spray by using high volume sprayer viz. Kmapsack sprayer.

Time of Application
The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticides and water at right dosage and spray.Before spraying the pesticides, It's suspension should be mixed well by a wooden stick.

Precautions
1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2)Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3) Avoid inhalation of the spary mist. Spray in the direction of wind.
4) Wash throughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5) Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying.
6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.
CAUTION FOR WORKERS/USERS:- while using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long paint, chemical resistant gloves, shoes, goggles hat and mask.

Symptoms Of Poisoning
Sweating, headache, lethargy, coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur.

First Aid
1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2) If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water.
3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote
No antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1) The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing articles or shall kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide.
(2) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and sufficient dimension.

Storage Conditions
Packages or surplus material and washing from the machines and cointainer shall be disposed off in such a manner so as to prevent environmental or water pollution. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. Packages should be burried away from habitation and source of water.

Chemical Composition

S. No	Ingredient	Weight
1	Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.)	12.25 % w/w
2	Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.)	74.12 % w/w
3	Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate	2.00 % w/w
4	Sodium Salt of alkyl napthyl sulfonate	2.00 % w/w
5	Keolin	9.63 % w/w
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

English

कार्बेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% घुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

मैनकोजेब 63% + कार्बेन्डाजिम 12% डब्ल्यू पी एक अंतर्वाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। जिसका प्रयोग बीजोपचार केरूप में मूंगफली का तना गलन, कोलर रॉट और जड़ गलन, धान में शहसमारी, आलू में अग्रणी अंगमारी, पछेती अंगमारी,काला कोढ़, चाय में फफोला अंगमारी, भूरापन अंगमारी, लाल गरुआ, सूखा रोग, काली सड़न, अंगूर में तुलसीता, चुर्णी फफूदी, अंगमारी, आम में चुर्णी फफूदी, अंगमारी, मिर्च में पत्ती धब्बा, फल सड़न, चुर्णी फफूदी, मक्का में मृदुरोमिल आशिता, पत्ती का अंगमारी, सेब में पामारोग, चुर्णी फफूदी, मूंगफली में तना गलन, कोलर रॉट और जड़ गलन रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है। सावधान :- उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है और इसका उपयोग मत्स्यपालन के पास करने की अनुमति नहीं है।

उपयोग

		प्रति हैक्टेयर मात्रा				
फसल	**कीट/रोग का सामान्य नाम**	**स. तत्व (ग्राम)**	**संरचना (ग्राम)**	**पानी की मात्रा (लीटर)**	**अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)**	**पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)**
सेब	पामारोग, चुर्णी फफूंदी	0.19%	0.25%	फसल की केनोपी के अनुसार आवश्यक मात्रा	20	-
मिर्च	पत्ता धबा, फल विलगन रोग, चूर्ण फफूंदी	563	750	500	3	-
कपास	अल्टरनेरिया पर्ण दाग और भूरापन आसिता	180+945	1500	500	71	-
अंगूर	मृदुरोमिल आशिता रोग, चूर्णीता आसिता, एन्थ्रेक्नोज	0.11%	0.15%	फसल की केनोपी के अनुसार आवश्यक मात्रा	7	-
मूंगफली	पत्ती घब्बा , सहसामारी	375	500	500	72	-
मूंगफली	टिक्का रोग, कॉलर रॉट, जड़ गलन	1.88	2.5	0	बीजोपचार	-
मक्का	मृदुरोमिल आशिता, पत्ती का अंगमारी	120+630	1000	500	37	-
मैंडरिन	ट्विग ब्लाइट, सूटी मोल्ड, ऐन्थ्राक्नोज फल विलग्न, ऐन्थ्राक्नोज पर्ण चिति	0.23%	0.30%	500	30	-
आम	चूर्णीता आसिता, एन्थ्रेक्नोज	0.11%	0.15%	फसल की केनोपी के अनुसार आवश्यक मात्रा	7	-
धान	सहसामारी	563	750	750	57	-
आलू	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक सकरफ	1312.5	1750	500	47	-
सोयाबीन	अल्टरनेरिया पर्ण दाग, मिरोथेशियम पर्ण दाग, पौड एंड स्टेम ब्लाइट, ऐन्थ्राक्नोज	150+787.5	1250	500	31	-
चाय	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, ब्लैक रॉट	937.5	1250	250-500	7	-

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
पीठ पर लादने वाले छिड़काव यंत्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय-
इस फफूंदीनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत छिड़काव करें। निर्देशानुसार फफूंदीनाशक एवं पानी का उचित मात्रा में मिश्रण कर के छिड़काव करें। फफूंदीनाशक के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छी तरह एक लकड़ी द्वारा मिला लें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ
1. खाद्य सामग्री, खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2,.मुँह, आँखों, त्वचा को संपर्क से बचाएँ।
3. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचाएँ। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ।
5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
7. गर्भवती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए।
8. ई.टी.यू. की मात्रा 0.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
9. उत्पाद को ठंडी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए।
कामगारों और उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी- फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे पूरी बाजूकी कमीज़, लम्बी पैंट, जूते, चश्मा, मुखौटा, टोपी, रासायनिक रोधी दस्ताने पहनने चाहिए।

विष के लक्षण
पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खाँसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा
(1) यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएँ। यह क्रिया तब तक दोहराएँ जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएँ।
(2) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएँ तो दूषित कपड़े उतार दें तथा दूषित त्वचा को पर्याप्त मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ।
(3) यदि आँखे दूषित हो जाएँ तो उनको पर्याप्त मात्रा में सलाइन/साफ पानी में लगभग 10-15 मिनट तक धोएँ।
(4) यदि साँस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएँ।

पौधविशिष्टता
सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशिष्ट नहीं है।

विषनाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि पुन: इस्तेमाल न हो सके।
3. डिब्बों या बची हुई फफूंदीनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें
1. फफूंदीनाशक रखे हुए डिब्बे आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हों या आलमारी में ताला लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे जाएँ।
2. जिस कमरे या आलमारी में फफूंदीनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लंबा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि फफूंदीनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक / विवरण	मात्रा
1	कारबेन्डाजिम टेक्निकल 98 स.त.	12.25 % भार/भार
2	मैनकोजेब टेक्निकल 85 स.त.	74.12 % भार/भार
3	सोडियम साल्ट- एलकिल एराइल सल्फोनेट	2.00 % भार/भार
4	सोडियम साल्ट- एलकिल नेपथाइल सल्फोनेट	2.00 % भार/भार
5	केआलिन निष्क्रिय पदार्थ	9.63 % भार/भार
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

कार्बेन्डाझिम 12% + मॅन्कोजेब 63% घुलनशील पावडर
(अंतर्प्रवाहीआणि स्पर्शीय बुरशीनाशक)

मॅन्कोजेब 63% + कार्बेन्डाझिम 12% डब्ल्यू पी हे एक अंत:प्रवाही आणि स्पर्शीय बुरशीनाशक आहे. ज्याचा वापर बियोपचाराच्या रुपात मूगफलीच्या तना गलन, कॉलर रॉट आणि मुळ गलन, तांदुळात शहसमारी, बटाट्यात आगती अंगमारी, पश्चात अंगमारी, काळा कोढ, चहा मध्ये फुफोला अंगमारी, भुरटपणा अंगमारी, लाल गरुआ, कोरडा रोग, काळी सड, द्राक्षात तुलसीता, चुर्णी बुरशी, अंगमारी, आंब्यात चुर्णी बुरशी, अंगमारी, मिरचीमध्ये पान डाग, फळ सड, चुर्णी बुरशी, मक्का पिकात मट्र रोग, पान अंगमारी, सफरचंदात पामारोग, चुर्णी बुरशी, मूगफलीत तना गलन, कॉलर रॉट आणि मुळ गलन रोगांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी केला जातो. सावधान :- उत्पाद माश्या आणि जलजीवांसाठी विषारी आहे आणि त्याचा वापर मत्स्यपालनाजवळ करु नये.

शिफारस

		प्रति हेक्टर मात्रा				
पीक	**कीड/रोगाचे सामान्य नाव**	**सक्रिय घटक (ग्राम / %)**	**तयार खुराक (ग्राम / मि.ली.)**	**पाण्यात विरघळवण्याचे प्रमाण (ली)**	**शेवटच्या फवारणीनंतर प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)**	**प्रत्येक फवारणीनंतर प्रवेश (तास)**
सफरचंद	फळ स्कॅब आणि पावडरी मिल्ड्यू	0.19%	0.25%	पिकाची झाडरचना (केनोपी) पाहता आवश्यक प्रमाण	20	-
मिरची	पान डाग, फळ सडणे आणि पावडरी मिल्ड्यू	563	750	500	3	-
कापूस	अल्टरनेरिया पान डाग आणि ग्रे मिल्ड्यू	180+945	1500	500	71	-
द्राक्ष	डाऊनी मिल्ड्यू, पावडरी मिल्ड्यू, अँथ्रॅक्नोसिस	0.11%	0.15%	पिकाची झाडरचना (केनोपी) पाहता आवश्यक प्रमाण	7	-
शेंगदाणे	पान डाग, ब्लास्ट	375	500	500	72	-
शेंगदाणे	टिक्का पान डाग, कॉलर रोट आणि ड्राय रूट रोट	1.88	2.5	0	बियाणोपचार	-
मक्का	डाऊनी मिल्ड्यू आणि पान ब्लाइट	120+630	1000	500	37	-
संत्रा	फांदी ब्लाइट, सॉटी मोल्ड, अँथ्रॅक्नोसिस फळ सडणे आणि पान डाग	0.23%	0.30%	500	30	-
आंबा	पावडरी मिल्ड्यू, अँथ्रॅक्नोसिस	0.11%	0.15%	पिकाची झाडरचना (केनोपी) पाहता आवश्यक प्रमाण	7	-
तांदूळ	ब्लास्ट	563	750	750	57	-
बटाटा	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लॅक स्कर्फ	1312.5	1750	500	47	-
सोयाबीन	अल्टरनेरिया पान डाग, मायरोथेसियम पान डाग, पॉट व तना ब्लाइट, अँथ्रॅक्नोसिस	150+787.5	1250	500	31	-
चहा	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई-बॅक, ब्लॅक रोट	937.5	1250	250-500	7	-

वापरासाठी दिशा-निर्देश
पाठीवर घेऊन फिरणारे फवारणी यंत्र तसेच उच्च आयतनाचे फवारणी यंत्र वापरा.

वापराचा वेळ
हा बुरशीनाशक रोगाची लक्षणे दिसताच ताबडतोब फवारणी करा. निर्देशानुसार बुरशीनाशक आणि पाण्याचे योग्य प्रमाणात मिश्रण करून फवारणी करा. फवारणी करण्यापूर्वी, त्याचा द्रावण चांगल्या प्रकारे लाकड्याने हलवा.

वापरकर्त्यांसाठी सावधगिरी
1. अन्नधान्य, अन्नधान्याच्या रिकाम्या भांड्यांपासून आणि प्राण्यांच्या खुराकपासून दूर ठेवा.
2. तोंड, डोळे, त्वचा संपर्कापासून वाचवा.
3. फवारणीची वाफ श्वासाद्वारे आत जाऊ नये याची काळजी घ्या. वारा जाणाऱ्या दिशेत फवारणी करा.
4. फवारणी नंतर दूषित कपडे आणि शरीराच्या भागांना चांगले धुवा.
5. फवारणी करताना धूम्रपान, जेवण, पाणी पिणे किंवा काही चावणे टाळा.
6. फवारणी करताना किंवा मिश्रण करताना पूर्ण सुरक्षित कपडे परिधान करा.
7. गर्भवती महिलांनी कार्बेन्डाझिमच्या संपर्कापासून दूर राहावे.
8. ई.टी.यू. चे प्रमाण 0.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.
9. उत्पादन थंड आणि कोरड्या जागी संग्रहित करावे.

कामगार आणि वापरकर्त्यांसाठी इशारा- बुरशीनाशक हाताळताना पूर्ण सुरक्षित कपडे जसे की पूर्ण बाहूची कमीज, लांब पँट, बूट, चष्मा, मुखवटा, टोपी, रासायनिक प्रतिरोधक हातमोजे घालावेत.

विष लक्षणे
घाम, डोकेदुखी, आलस्य, खोकला, शिंक येणे, खाज, मळमळ, उलट्या होऊ शकतात.

प्राथमिक उपचार
(1) जर गिळले गेले तर घशाच्या मागच्या भागाला गुदगुदी करून उलट्या करव्यात. ही क्रिया उलट्या मध्ये बाहेर आलेले द्रव शुद्ध होईपर्यंत करत राहावे. जर रुग्ण बेहोश असेल तर उलट्या करू नका.
(2) जर कपडे आणि त्वचा दूषित झाली तर दूषित कपडे काढा आणि दूषित त्वचा साबण आणि पाण्याने चांगले धुवा.
(3) जर डोळे दूषित झाले तर त्यांना पुरेश्या प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्यात सुमारे 10-15 मिनिटे धुवा.
(4) जर श्वासाद्वारे आत गेले असेल तर रुग्णाला शुद्ध हवेतील जागेत नेवा.

पौधविशिष्टता
सुझावित प्रमाणानुसार वापर केल्यास हा कीटकनाशक पौधविशिष्टतेस हानीकारक नाही.

विषनाशक
कोणताही विशेष विषनाशक नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्ब्यांचा निपटारा
बुरशीनाशक उत्पादक किंवा वापरकर्त्याचे कर्तव्य आहे की डब्बे किंवा भांडे तोडून लोकसंख्येपासून दूर जमीन मध्ये गाडावे. रिकामे डब्बे बाहेर ठेवू नयेत जेणेकरून पुन्हा वापर होऊ नये. डब्बे किंवा उरलेला बुरशीनाशक किंवा धुण्याचे द्रावण अशा प्रकारे निपटारा करा की आसपासची वस्तू, पिण्याचे पाणी दूषित होऊ नये.

संग्रहणाच्या अटी
बुरशीनाशक ठेवलेले डब्बे इतर वस्तू किंवा अन्नसामग्री ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोली किंवा जागेपासून दूर किंवा अलमारीमध्ये लॉक करून प्रमाण आणि प्रकारानुसार ठेवा. ज्यात बुरशीनाशक साठवायचे आहे त्या खोली किंवा अलमारी मजबूत, कोरडी, प्रकाशयुक्त, हवादार आणि पुरेशी लांबी व रुंदी असावी, जेणेकरून बुरशीनाशकाची वाफ मुळे प्रदूषण होऊ नये.

रासायनिक घटक

क्र.सं.	घटक / तपशील	प्रमाण
1	कार्बेन्डाझीम तांत्रिक (98% वजन/वजन सक्रिय घटक आधारित)	12.25 % वजन/वजन
2	मॅनकोझेब तांत्रिक (85% वजन/वजन सक्रिय घटक आधारित)	74.12 % वजन/वजन
3	अल्किल एरिल सल्फोनेटचा सोडियम मीठ	2.00 % वजन/वजन
4	अल्किल नेफ्थायल सल्फोनेटचा सोडियम मीठ	2.00 % वजन/वजन
5	किओलीन	9.63 % वजन/वजन
	एकूण	100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

કાર્બેન્ડાજિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% દ્રાવ્ય પાવડર
(અંત:પ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક)

મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાજિમ 12% ડબલ્યુ પી એક અંતઃપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક છે. જે બીજોપ્છાદનના રૂપમાં મુગફળીના તણા ગલન, કોલર રોટ અને મૂળ ગલનેં, ધાનમાં શહસ, બટાટામાં આગતી અંગમારી, પછેતાં અંગમારી, કાળો કોઢ, ચહામાં ફફોલા અંગમારી, ભુરપણા અંગમારી, લાલ ગરુઆ, સુકા રોગ, કાળી સડન, દ્રાક્ષમાં તુલસીતા, ચૂર્ણી ફુગ, અંગમારી, કેરીમાં ચૂર્ણી ફુગ, અંગમારી, મરચામાં પાનના ડાઘા, ફળ સડન, ચૂર્ણી ફુગ, મકાઈમાં મટૃ રોગ, પાનનું અંગમારી, સફરજનમાં પામરોગ, ચૂર્ણી ફુગ, મુગફળીમાં તણા ગીલન, કોલર રોટ અને મૂળ ગલન રોગોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે થાય છે. સાવધાની :- ઉત્પાદન માછલી અને જળજીવ માટે ઝેર છે અને તેનું ઉપયોગ માછીમારીના નજીક ન કરવો.

ભલામણ

		પ્રતિ હેક્ટર માત્રા				
પાક	**જીવાત/રોગનું સામાન્ય નામ**	**સક્રિય ઘટક (ગ્રામ / %)**	**તૈયાર ખુરાક (ગ્રામ / મિ.લી.)**	**પાણીમાં વિલય (લી)**	**છેલ્લી છંટકાવથી પાક કાપી સુધી રાહત સમય (દિવસ)**	**દરેક છંટકાવ પછી પ્રવેશ (કલાક)**
સફરજન	ફળ સ્કેબ અને પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ	0.19%	0.25%	પાકની છત્રી (કેનોપી) અનુસાર જરૂરી માત્રા,	20	-
મરચું	પાંદડા ડાઘો, ફળ સડવું અને પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ	563	750	500	3	-
કપાસ	અલ્ટર્નેરિયા પાંદડા ડાઘો અને ગ્રે મિલ્ડ્યૂ	180+945	1500	500	71	-
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડ્યૂ, પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ, એન્થ્રાક્નોસિસ	0.11%	0.15%	પાકની છત્રી (કેનોપી) અનુસાર જરૂરી માત્રા,	7	-
મગફળી	પાંદડા ડાઘો, બ્લાસ્ટ	375	500	500	72	-
મગફળી	ટિકા પાંદડા ડાઘો, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ	1.88	2.5	0	બીજોપચાર	-
મકાઈ	ડાઉની મિલ્ડ્યૂ અને પાંદડા બ્લાઇટ	120+630	1000	500	37	-
સંતરાં	કાંડી બ્લાઇટ, સોટી મોલ્ડ, એન્થ્રાક્નોસિસ ફળ સડવું અને પાંદડા ડાઘો	0.23%	0.30%	500	30	-
આંબા	પાઉડરી મિલ્ડ્યૂ, એન્થ્રાક્નોસિસ	0.11%	0.15%	પાકની છત્રી (કેનોપી) અનુસાર જરૂરી માત્રા,	7	-
ધાન	બ્લાસ્ટ	563	750	750	57	-
બટાકા	અર્લી બ્લાઇટ, લેટ બ્લાઇટ, બ્લેક સ્કર્ફ	1312.5	1750	500	47	-
સોયાબીન	અલ્ટર્નેરિયા પાંદડા ડાઘો, માયરોથેસિયમ પાંદડા ડાઘો, પોડ & સ્ટેમ બ્લાઇટ, એન્થ્રાક્નોસિસ	150+787.5	1250	500	31	-
ચા	બ્લિસ્ટર બ્લાઇટ, ગ્રે બ્લાઇટ, રેડ રસ્ટ, ડાય-બેક, બ્લેક રોટ	937.5	1250	250-500	7	-

વપરાશ માટેની સૂચનાઓ
પીઠ પર લાદવા જેવી છિડકણી યંત્રો અને ઉચ્ચ માત્રાની છિડકણી યંત્રોનો ઉપયોગ કરો.

વપરાશનો સમય
આ ફૂગનાશકનો ઉપયોગ રોગના લક્ષણો દેખાય તે જ સમયે તરત છિડકણી કરો. સૂચના અનુસાર ફૂગનાશક અને પાણી યોગ્ય પ્રમાણમાં મિક્સ કરી છિડકણી કરો. છિડકણી પહેલાં દ્રાવણને સારી રીતે લાકડાથી મિક્સ કરો.

વપરાશકર્તાઓ માટે સાવચેતી
1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાલી ખાદ્ય પાત્રો અને પ્રાણીઓના ચારા પાસેથી દૂર રાખો.
2. મોઢું, આંખો, ચામડી સંપર્કથી બચાવો.
3. છિડકણીની વાષ્પ શ્વાસથી અંદર ન જાય તેવો વિચાર કરો. પવનની દિશામાં છિડકણી કરો.
4. ઉત્પાદન ઠંડું અને સૂકું સ્થળ પર સંગ્રહિત કરો.
5. છિડકણી પછી દૂષિત કપડા અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો.
6. છિડકણી વખતે ધૂમ્રપાન, ખાવું, પીવું અથવા કંઈ ચાવવું ટાળો.
7. છિડકણી અથવા મિક્સ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડા પહેરો.
8. ગર્ભવતી મહિલાઓ કાર્બેન્ડાજિમના સંપર્કથી દૂર રહે.
9. ઈ.ટી.યુ. પ્રમાણ 0.5 ટકાથી વધુ ન હોઈ શકે.

કર્મચારીઓ અને વપરાશકર્તાઓ માટે ચેતવણી- ફૂગનાશક સાથે કામ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડા પહેરવા જોઈએ જેમ કે લાંબી ભાજુની કમીજ, લાંબી પેન્ટ, બૂટ, ચશ્મા, મુખમોટો, ટોપી, રાસાયણિક પ્રતિરોધક દસ્તાના.

ઝેરી લક્ષણો
ઘામ, માથું દુખવું, આળસ, કફ, છીંક, ખંજળી, મિતલી, ઉલ્ટી થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
(1) જો ગળી જાય તો ગળાના પાછળના ભાગને ગુદગુદી કરી ઉલ્ટી કરાવો. આ ક્રિયા ઉલ્ટીમાંથી બહાર આવેલ દ્રાવણ શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી [illegible]રાવો. જો દર્દી બેહોશ હોય તો ઉલ્ટી ન કરાવવી.
(2) જો કપડા અને ચામડી દૂષિત થાય તો કપડા ઉતારી, ચામડીને પૂરતી માત્રામાં સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો.
(3) જો આંખો દૂષિત થાય તો તેને પૂરતી માત્રામાં સેલાઇન/સાફ પાણીમાં 10-15 મિનિટ ધોઈ લો.
(4) જો શ્વાસ દ્વારા અંદર ગયુ હોય તો દર્દીને શુદ્ધ હવાના જગ્યાએ લઈ જાઓ.

પદાર્થી વિશિષ્ટતા
સૂચિત પ્રમાણ મુજબ વાપરવાથી આ કીટકનાશક પદાર્થી વિશિષ્ટતાને નુકસાન પહોંચાડતું નથી.

ઝેરીનાશક
કોઈ વિશિષ્ટ ઝેરીનાશક નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
1. ફૂગનાશક ઉત્પાદકો અથવા વપરાશકર્તાઓનું કર્તવ્ય છે કે ડબ્બા અથવા પાત્રો તોડી લોકોથી દૂર જમીનમાં ગાડવા.
2. ખાલી ડબ્બા બહાર ન રાખો જેથી ફરી વપરાશ ન થાય.
3. ડબ્બા અથવા બચેલ ફૂગનાશક અથવા ધોઈને નિકાલ કરો કે આસપાસની વસ્તુઓ, પીવાના પાણી દૂષિત ન થાયે.

સંગ્રહની શરતો
1. ફૂગનાશકના ડબ્બા અન્ય વસ્તુઓ અથવા ખોરાક માટે વપરાતા રૂમથી દૂર અથવા તાળીબંધ અલમારીમાં પ્રમાણ અને પ્રકાર મુજબ રાખો.
2. જે રૂમ અથવા અલમારીમાં ફૂગનાશક સંગ્રહિત કરવો છે તે મજબૂત, સૂકો, પ્રકાશયુક્ત, હવાનુ પ્રવાહ ધરાવતા અને પૂરતી લંબાઈ અને પહોળાઈ સાથે હોવી જોઈએ જેથી ફૂગનાશકની વાષ્પથી પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક રચના

ક્ર. નં.	ઘટક / વિગત	જથ્થો
1	કાર્બેન્ડાઝિમ ટેકનિકલ (98% વજન/વજન સક્રિય ઘટક આધારિત)	12.25 % વજન/વજન
2	મેનકોઝેબ ટેકનિકલ (85% વજન/વજન સક્રિય ઘટક આધારિત)	74.12 % વજન/વજન
3	અલ્કિલ એરિલ સલ્ફોનેટનો સોડિયમ લવણ	2.00 % વજન/વજન
4	અલ્કિલ નેફ્થાઇલ સલ્ફોનેટનો સોડિયમ લવણ	2.00 % વજન/વજન
5	કેઓલિન	9.63 % વજન/વજન
	કુલ	100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ 12% + ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ 63% ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਾਊਡਰ
(ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਫੰਗੀਸਾਈਡ)

ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ 63% + ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ 12% ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤਨੇ ਦਾ ਗਲਨ, ਕਾਲਰ ਰੌਟ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਗਲਨ, ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਸਮਾਰੀ, ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਪਿੱਛਲੇ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਕੋਢ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਭੂਰਾ ਪਾਪ, ਲਾਲ ਗਰੂਆ, ਸੁੱਕਾ ਰੋਗ, ਕਾਲੀ ਸੜਨ, ਅੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਤਾ, ਚੂਰਨੀ ਫੰਗਸ, ਅੰਗਮਾਰੀ, ਆਮ ਵਿੱਚ ਚੂਰਨੀ ਫੰਗਸ, ਅੰਗਮਾਰੀ, ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਡਾਗ, ਫਲ ਸੜਨ, ਚੂਰਨੀ ਫੰਗਸ, ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਟ੍ਰ ਰੋਗ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਮਾਰੋਗ, ਚੂਰਨੀ ਫੰਗਸ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਤਨੇ ਦਾ ਗਲਨ, ਕਾਲਰ ਰੌਟ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਗਲਨ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ :- ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

		ਹੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਰਾ				
ਫਸਲ	**ਕੀੜਾ/ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ**	**ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ / %)**	**ਤਿਆਰ ਖੁਰਾਕ (ਗ੍ਰਾਮ / ਮਿ.ਲੀ.)**	**ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ)**	**ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)**	**ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਘੰਟੇ)**
ਸੇਬ	ਫਲ ਸਕੈਬ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	0.19%	0.25%	ਫਸਲ ਦੀ ਛੱਤਰ (ਕੈਨੋਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ	20	-
ਮਿਰਚ	ਪੱਤਾ ਡੈਗ, ਫਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	563	750	500	3	-
ਕਪਾਹ	ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਪੱਤਾ ਡੈਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਿਲਡਿਊ	180+945	1500	500	71	-
ਅੰਗੂਰ	ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ, ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ, ਐਂਥਰੈਕਨੋਸਿਸ	0.11%	0.15%	ਫਸਲ ਦੀ ਛੱਤਰ (ਕੈਨੋਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ	7	-
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਪੱਤਾ ਡੈਗ, ਬਲਾਸਟ	375	500	500	72	-
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਟਿਕਾ ਪੱਤਾ ਡੈਗ, ਕਾਲਰ ਰੋਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਰੂਟ ਰੋਟ	1.88	2.5	0	ਬੀਜਉਪਚਾਰ	-
ਮੱਕੀ	ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡਿਊ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਬਲਾਈਟ	120+630	1000	500	37	-
ਸੰਤਰਾ	ਟਹਨੀ ਬਲਾਈਟ, ਸੋਟੀ ਮੋਲਡ, ਐਂਥਰੈਕਨੋਸਿਸ ਫਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਡੈਗ	0.23%	0.30%	500	30	-
ਆਮ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ, ਐਂਥਰੈਕਨੋਸਿਸ	0.11%	0.15%	ਫਸਲ ਦੀ ਛੱਤਰ (ਕੈਨੋਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ	7	-
ਚੌਲ	ਬਲਾਸਟ	563	750	750	57	-
ਆਲੂ	ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ, ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ, ਬਲੈਕ ਸਕਰਫ	1312.5	1750	500	47	-
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਪੱਤਾ ਡੈਗ, ਮਾਇਰੋਥੇਸ਼ੀਅਮ ਪੱਤਾ ਡੈਗ, ਪੋਡ & ਸਟੇਮ ਬਲਾਈਟ, ਐਂਥਰੈਕਨੋਸਿਸ	150+787.5	1250	500	31	-
ਚਾਹ	ਬਲਿਸਟਰ ਬਲਾਈਟ, ਗ੍ਰੇ ਬਲਾਈਟ, ਰੈੱਡ ਰਸਟ, ਡਾਈ-ਬੈਕ, ਬਲੈਕ ਰੋਟ	937.5	1250	250-500	7	-

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੀਠ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਘੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਲੀ ਖਾਦ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਾਸਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਸਮੇਂ ਧੂਮਪਾਨ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਬਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
6. ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
8. ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ- ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ, ਬੂਟ, ਚਸ਼ਮਾ, ਮੁਖੌਟਾ, ਟੋਪੀ, ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ
ਪਸੀਨਾ, ਸਿਰਦਰਦ, ਆਲਸ, ਖੰਘ, ਛੀਂਕ, ਖਜਲੀ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
(1) ਜੇ ਗਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕੀ ਖੁਰਚ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
(2) ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
(3) ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਧੋਵੋ।
(4) ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਓ।

ਪੌਧੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੌਧੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
1. ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਾੜੇ ਜਾਣ।
2. ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
3. ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ।
2. ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ, ਹ[illegible]ਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ. ਸੰ.	ਘਟਕ / ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ
1	ਕਾਰਬੇਂਡਾਜੀਮ ਤਕਨੀਕੀ (98% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ ਅਧਾਰਿਤ)	12.25 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਤਕਨੀਕੀ (85% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ ਅਧਾਰਿਤ)	74.12 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਅਲਕੀਲ ਐਰੀਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਅਲਕੀਲ ਨੇਫਥਾਈਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਕਿਓਲਿਨ	9.63 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
	ਕੁੱਲ	100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

কার্বেন্ডাজিম 12% + ম্যানকোজেব 63% দ্রবণীয় গুঁড়া
(অন্তঃপ্রবাহী এবং স্পর্শীয় ফাঙ্গিসাইড)

ম্যানকোজেব 63% + কার্বেন্ডাজিম 12% ডব্লিউ পি একটি অন্তঃপ্রবাহী এবং স্পর্শীয় ফাঙ্গিসাইড। যা বীজোপচারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে মুগফলির তনা গলন, কলার রট এবং মূল গলন, ধান-শস্যে শেহসমারি, আলুর আগের অঙ্গমারি, পরবর্তী অঙ্গমারি, কালো কুঁড়, চায়ের ফোলো অঙ্গমারি, ভুরো অঙ্গমারি, লাল গরুয়া, শুকনো রোগ, কালো পচন, আঙুরে তুলসীতা, চূর্ণ ফাঙ্গাস, অঙ্গমারি, আমে চূর্ণ ফাঙ্গাস, অঙ্গমারি, মরিচে পাতা দাগ, ফল পচন, চূর্ণ ফাঙ্গাস, মকাইয়ে মাতৃ রোগ, পাতার অঙ্গমারি, আপেল-শস্যে পামারোগ, চূর্ণ ফাঙ্গাস, মুগফলিতে তনা গলন, কলার রট এবং মূল গলন রোগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সতর্কতা :- পণ্যটি মাছ এবং জলজ প্রাণীর জন্য বিষাক্ত এবং এর ব্যবহার মৎস্যচাষের নিকটে করা যাবে না।

সুপারিশ

ফসল	কীট/রোগের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টর পরিমাণ সক্রিয় উপাদান (গ্রাম / %)	প্রস্তুত খুরাক (গ্রাম / মি.লি.)	পানি মিলানোর পরিমাণ (লি)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কেটে নেওয়ার সময় (দিন)	প্রতিটি স্প্রের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টা)
আপেল	ফল স্ক্যাব এবং পাউডারি মিলডিউ	0.19%	0.25%	ফসলের ছাতা (ক্যানোপি) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ	20	-
মরিচ	পাতা দাগ, ফল পচন এবং পাউডারি মিলডিউ	563	750	500	3	-
তুলা	আলটারনারিয়া পাতা দাগ এবং গ্রে মিলডিউ	180+945	1500	500	71	-
আঙুর	ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলডিউ, অ্যানথ্র্যাকনোসিস	0.11%	0.15%	ফসলের ছাতা (ক্যানোপি) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ	7	-
মুগ	পাতা দাগ, ব্লাস্ট	375	500	500	72	-
মুগ	টিকা পাতা দাগ, কলার রোট এবং ড্রাই রুট রোট	1.88	2.5	0	বীজোপচার	-
ভুট্টা	ডাউনি মিলডিউ এবং পাতা ব্লাইট	120+630	1000	500	37	-
কমলা	টহনি ব্লাইট, স্যাটি মোল্ড, অ্যানথ্র্যাকনোসিস ফল পচন ও পাতা দাগ	0.23%	0.30%	500	30	-
আম	পাউডারি মিলডিউ, অ্যানথ্র্যাকনোসিস	0.11%	0.15%	ফসলের ছাতা (ক্যানোপি) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ	7	-
ধান	ব্লাস্ট	563	750	750	57	-
আলু	আরলি ব্লাইট, লেট ব্লাইট, ব্ল্যাক স্কার্ফ	1312.5	1750	500	47	-
সোয়াবিন	আলটারনারিয়া পাতা দাগ, মাইরোথেসিয়াম পাতা দাগ, পড ও স্টেম ব্লাইট, অ্যানথ্র্যাকনোসিস	150+787.5	1250	500	31	-
চা	ব্লিস্টার ব্লাইট, গ্রে ব্লাইট, রেড রস্ট, ডাই-ব্যাক, ব্ল্যাক রোট	937.5	1250	250-500	7	-

ব্যবহারের নির্দেশনা
পিঠে বহনযোগ্য স্প্রে এবং উচ্চ আয়তনের স্প্রে যন্ত্র ব্যবহার করুন।

ব্যবহারের সময়
এই ফাঙ্গিসাইড রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে করুন। নির্দেশ অনুযায়ী ফাঙ্গিসাইড এবং পানির উপযুক্ত পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করুন। স্প্রে করার আগে দ্রবণটি ভালোভাবে কাঠ দিয়ে মিশিয়ে নিন।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা
1. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্যপাত্র এবং পশুর খাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2. মুখ, চোখ, চামড়ি সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করুন।
3. স্প্রের বাষ্প শ্বাসের মাধ্যমে ভিতরে যেতে না দিন। বায়ুর দিক দিয়ে স্প্রে করুন।
4. স্প্রে করার পর দূষিত পোশাক এবং দেহের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
5. স্প্রে করার সময় ধূমপান, খাওয়া, পান করা বা কিছু চিবানো যাবে না।
6. স্প্রে বা মিশ্রণ করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন।
7. গর্ভবতী মহিলাদের কার্বেন্ডাজিমের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে।
8. ই.টি.ইউ. এর পরিমাণ 0.5 শতাংশের বেশি হবে না।
9. পণ্যটি ঠাণ্ডা এবং শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করুন।

কর্মচারী এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা- ফাঙ্গিসাইডের সঙ্গে কাজ করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন যেমন: পূর্ণ বাহু শার্ট, লম্বা প্যান্ট, বুট, চশমা, মুখমুখোশ, টুপি, রাসায়নিক প্রতিরোধী দস্তানা।

বিষক্রিয়া লক্ষণ
ঘাম, মাথাব্যথা, অলসতা, কাশি, হাঁচি, খোঁচা লাগা, বমি, বমি বমি ভাব হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
(1) যদি গিলে ফেলা হয়, তবে গলার পেছনের অংশ হালকা নাড়িয়ে বমি করান। এই প্রক্রিয়া বমির মাধ্যমে বের হওয়া পদার্থ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। যদি রোগী অচেতন হয় তবে বমি করাবেন না।
(2) যদি পোশাক বা চামড়ি দূষিত হয় তবে দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং চামড়ি সাবান ও পানির সাহায্যে ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
(3) যদি চোখ দূষিত হয়, তবে যথেষ্ট পরিমাণে স্যালাইন/পরিষ্কার পানিতে প্রায় 10-15 মিনিট ধুয়ে নিন।
(4) যদি শ্বাসপ্রশ্বাসে ভিতরে চলে যায়, তবে রোগীকে শুদ্ধ বাতাসে নিয়ে যান।

উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্য
প্রস্তাবিত পরিমাণ অনুসারে ব্যবহার করলে এই কীটনাশক উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

বিষনাশক
কোনও বিশেষ বিষনাশক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডিব্বাগুলোর নিষ্পত্তি
1. ফাঙ্গিসাইড প্রস্তুতকারক বা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব যে ডিব্বা বা পাত্র ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দেওয়া।
2. খালি ডিব্বা বাইরে রাখবেন না যাতে পুনরায় ব্যবহার না হয়।
3. ডিব্বা বা অবশিষ্ট ফাঙ্গিসাইড বা ধোয়ার পদার্থ এমনভাবে নিষ্পত্তি করুন যাতে আশেপাশের জিনিস বা পানীয় পানি দূষিত না হয়।

সংরক্ষণের শর্ত
1. ফাঙ্গিসাইড রাখা ডিব্বা অন্যান্য জিনিস বা খাদ্যপদার্থ রাখার ঘর থেকে দূরে বা আলমারিতে লক করে রাখুন।
2. যে ঘর বা আলমারিতে ফাঙ্গিসাইড সংরক্ষণ করতে হবে তা শক্ত, শুকনো, আলোযুক্ত, হাওয়াদার এবং যথেষ্ট লম্বা ও চওড়া হতে হবে যাতে ফাঙ্গিসাইডের বাষ্পে দূষণ না হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্র.নং	উপাদান / বিবরণ	পরিমাণ
1	কার্বেন্ডাজিম প্রযুক্তিগত (98% ওজন/ওজন সক্রিয় উপাদান ভিত্তিক)	12.25 % ওজন/ওজন
2	ম্যানকোজেব প্রযুক্তিগত (85% ওজন/ওজন সক্রিয় উপাদান ভিত্তিক)	74.12 % ওজন/ওজন
3	অ্যালকিল এরিল সালফোনেটের সোডিয়াম লবণ	2.00 % ওজন/ওজন
4	অ্যালকিল ন্যাফথাইল সালফোনেটের সোডিয়াম লবণ	2.00 % ওজন/ওজন
5	কিওলিন	9.63 % ওজন/ওজন
	মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

கார்பென்டாசிம் 12% + மான்கோசேப் 63% கரைப்பக்கூடிய பொடி
(உள்ளடக்க மற்றும் தொடுதிறன் பூஞ்சைநாசினி)

மான்கோசேப் 63% + கார்பென்டாசிம் 12% டபிள்யூ பி என்பது ஒரு உள்ளடக்க மற்றும் தொடுதிறன் பூஞ்சைநாசினி ஆகும். இது விதை சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பீனட்டின் தண்டு அழுகல், காலர் ராட் மற்றும் வேர்ப்பிழை அழுகல், அரிசியில் செஹ்ஸ்மாரி, உருளைக்கிழங்கில் முன்னேற்ற அங்க்மாரி, பின்னர் அங்க்மாரி, கருப்பு கோட், தேநீர் இலையில் பூஞ்சை அங்க்மாரி, பழுப்பு அங்க்மாரி, சிவப்பு கருவா, உலர் நோய், கருப்பு கெடுதல், திராட்சையில் துளசி நோய், தூள் பூஞ்சை, அங்க்மாரி, மாம்பழத்தில் தூள் பூஞ்சை, அங்க்மாரி, மிளகாயில் இலை தழல், பழம் கெடுதல், தூள் பூஞ்சை, சோயா பீனில் மாட்ரு நோய், இலை அங்க்மாரி, ஆப்பிளில் பாமரோக், தூள் பூஞ்சை, பீனட்டில் தண்டு அழுகல், காலர் ராட் மற்றும் வேர்ப்பிழை அழுகல் நோய்களுக்கு செயல்பாடான கட்டுப்பாடு ஏற்படுத்துகிறது. எச்சரிக்கை :- தயாரிப்பு மீன் மற்றும் நீருஜீவிகளுக்கு விஷமுள்ளதாகும், மற்றும் இதனை மீன்பிடிப்பகுதியில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

பரிந்துரை

பயிர்	பூச்சி/ரோக் பொதுப்பெயர்	ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு அளவு செயல் பாட்டு கூறு (கிராம் / %)	தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து (கிராம் / மி.லி.)	தண்ணீரில் கரைக்கப்படும் அளவு (லீ)	கடைசி தெளிப்பு முதல் அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு தெளிப்புக்கும் பிறகு மீண்டும் நுழைவு (மணி)
ஆப்பிள்	பழம் ஸ்காப் மற்றும் பவுடரி மில்ட்யூ	0.19%	0.25%	பயிரின் மரச்செடி அடர்த்தி (கெனோபி) படி தேவையான அளவு	20	-
மிளகாய்	இலை கடை, பழம் சிதைவு மற்றும் பவுடரி மில்ட்யூ	563	750	500	3	-
பருத்தி	அல்டர்நேரியா இலைக்கடை விழுப்பு மற்றும் கிரே மில்ட்யூ	180+945	1500	500	71	-
திராட்சை	டவுனி மில்ட்யூ, பவுடரி மில்ட்யூ, அன்த்ராக்க் னோசிஸ்	0.11%	0.15%	பயிரின் மரச்செடி அடர்த்தி (கெனோபி) படி தேவையான அளவு	7	-
வேர்க்கடலை	இலை கடை, பிளாஸ்ட்	375	500	500	72	-
வேர்க்கடலை	டிக்கா இலை கடை, காலர் ரோட் மற்றும் டிரை ரூட் ரோட்	1.88	2.5	0	விதை சிகிச்சை	-
மக்காச் சீனா	டவுனி மில்ட்யூ மற்றும் இலை பிளைட்	120+630	1000	500	37	-
மாந்தரின்	கிளை பிளைட், சூட்டி மோல்ட், அன்த்ராக்க் னோசிஸ் பழம் சிதைவு மற்றும் இலைக்கடை விழுப்பு	0.23%	0.30%	500	30	-
மாம்பழம்	பவுடரி மில்ட்யூ, அன்த்ராக்க் னோசிஸ்	0.11%	0.15%	பயிரின் மரச்செடி அடர்த்தி (கெனோபி) படி தேவையான அளவு	7	-
அரிசி	பிளாஸ்ட்	563	750	750	57	-
உருளைக்கிழங்கு	ஆரம்ப பிளைட், பின்னர் பிளைட், கருப்பு ஸ்கர்ஃப்	1312.5	1750	500	47	-
சோயா	அல்டர்நேரியா இலைக்கடை விழுப்பு, மைரோதேசியம் இலைக்கடை விழுப்பு, பாக் & தண்டு பிளைட், அன்த்ராக்க் னோசிஸ்	150+787.5	1250	500	31	-
தேயிலை	பிளிஸ்டர் பிளைட், கிரே பிளைட், ரெட் ரஸ்ட், டை-பேக், பிளாக் ரோட்	937.5	1250	250-500	7	-

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்
குதியில் ஏற்றக்கூடிய சிரப்பு இயந்திரங்கள் மற்றும் அதிக அளவு சிரப்பு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு நேரம்
இந்த பூஞ்சைநாசினியை நோயின் அறிகுறிகள் தோன்றும் உடனே சிரப்பவும். வழிமுறைகள்படி பூஞ்சைநாசினி மற்றும் தண்ணீரை சரியான அளவில் கலந்து சிரப்பவும். சிரப்புவதற்கு முன்னர் கலவையை நன்கு மரத்தினால் கிளறவும்.

பயன்பாட்டாளர்களுக்கான எச்சரிக்கை
1. உணவுப் பொருட்கள், காலியான உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் மிருகங்கள் காய்களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்கள்.
2. வாயு, கண்கள், தோலை தொடர்பிலிருந்து பாதுகாக்கவும்.
3. சிரப்பின் வாயு மூச்சில் செல்லாமல் கவனிக்கவும். காற்றின் திசையில் சிரப்பவும்.
4. சிரப்புக்குப் பிறகு மாசுபட்ட உடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்கு கழுவவும்.
5. சிரப்பும் போது புகை, உணவு, தண்ணீர் அல்லது ஏதாவது கடிக்க கூடாது.
6.சிரப்பும் அல்லது கலக்கும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகள் அணியவும்.
7. கர்ப்பிணி பெண்கள் கார்பென்டாசிம் தொடர்பிலிருந்து தொலைவில் இருக்க வேண்டும்.
8. ஈ.டி.யூ. அளவு 0.5 சதவீதத்தை மீறக்கூடாது.
9. தயாரிப்பை குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும்.

வேலைக்காரர்கள் மற்றும் பயன்பாட்டாளர்களுக்கான எச்சரிக்கை- பூஞ்சைநாசினியுடன் பணியாற்றும் போது முழு பாதுகாப்பு உடைகள் அணியவும், உதாரணமாக முழு கை உடை, நீளமான பேண்ட், பூட்டை, கண்ணாடி, முகமூடி, தொப்பி, வேதியியல் எதிர்ப்பு கைப்பாத்து.

விஷலக்ஷணங்கள்
வெயில், தலைவலி, சோர்வு, காசி, தும்மல், கொட்டும் பிரச்னை, வாந்தி, வாந்தியோடு கூடிய மனநிலை ஏற்படலாம்.

அத்தியாவசிய முதல்நிலை சிகிச்சை
(1) தாகியுள்ளால் கழுத்தின் பின்புறம் நெகிழ்ச்சி செய்து வாந்தி ஏற்படுத்தவும். இந்த செயல் வாந்தியால் வெளியேறிய பொருள் சுத்தமாகும் வரை தொடரவும். நோயாளி மயக்கம் அடைந்திருந்தால் வாந்தி ஏற்படுத்தவேண்டாம்.
(2) உடைகள் மற்றும் தோல் மாசுபட்டால், மாசுபட்ட உடைகளை அகற்று, தோலை போதுமான அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் நன்கு கழுவவும்.
(3) கண்கள் மாசுபட்டால், அவற்றை போதுமான அளவு சாலைன்/சுத்தமான நீரில் சுமார் 10-15 நிமிடங்கள் கழுவவும்.
(4) மூச்சின் மூலம் உள்ளே சென்றிருந்தால், நோயாளியை தூய்மையான காற்று கொண்ட இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும்.

தாவரத்தின் தனிச்சிறப்பு
சூசிக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் இந்த பூஞ்சைநாசினி தாவரத்திற்கு தீங்கு செய்யாது.

விஷ நாசினி
எந்தவொரு குறிப்பிட்ட விஷ நாசினியும் இல்லை. அறிகுறிகள் படி சிகிச்சை செய்யவும்.

காலியான பாட்டில்கள் அகற்றல்
1. பூஞ்சைநாசினி உற்பத்தியாளர் அல்லது பயன்பாட்டாளரின் கடமை பாட்டில்கள் அல்லது பாத்திரங்கள் உடைத்து, மக்கள் இடம் தவிர மண்ணில் புதைக்க வேண்டும்.
2. காலியான பாட்டில்களை வெளியே வைக்காதீர்கள், மீண்டும் பயன்பாடு தடுக்கும்.
3. பாட்டில்கள் அல்லது மீதமான பூஞ்சைநாசினி அல்லது கழுவிய நீர் இப்படி அகற்ற வேண்டும், அருகில் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் பானிய நீர் மாசுபடாத வகையில்.

சேமிப்புத்துறை விதிமுறைகள்
1. பூஞ்சைநாசினி உள்ள பாட்டில்கள் மற்ற பொருட்கள் அல்லது உணவு பொருட்கள் வைத்திருக்கும் அறை அல்லது இடத்திலிருந்து விலகி அல்லது அலமாரியில் பூட்டு வைத்து, வகை மற்றும் அளவுக்கு ஏற்ப வைக்கவும்.
2. பூஞ்சைநாசினி சேமிக்கும் அறை அல்லது அலமாரி வலுவான, உலர்ந்த, வெளிச்சம் உள்ள, காற்றோட்டம் கொண்ட மற்றும் போதுமான நீளம் மற்றும் அகலம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும், இதனால் பூஞ்சைநாசினி வாயு மூலம் மாசுபாடு ஏற்படாது

வேதியியல் கலவை

எண்	பொருள் / விளக்கம்	அளவு
1	கார்பெண்டாசிம் தொழில்நுட்பம் (98% எடை/எடை செயற்பாட்டு கூறு அடிப்படையில்)	12.25 % எடை/எடை
2	மேன்கோசெப் தொழில்நுட்பம் (85% எடை/எடை செயற்பாட்டு கூறு அடிப்படையில்)	74.12 % எடை/எடை
3	ஆல்கில்ஐரீல் சல்போனேட் சோடியம் உப்பு	2.00 % எடை/எடை
4	ஆல்கில்நாப்தைல் சல்போனேட் சோடியம் உப்பு	2.00 % எடை/எடை
5	கியோலின்	9.63 % எடை/எடை
	மொத்தம்	100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

కార్బెండాజిమ్ 12% + మాంకోసెబ్ 63% కరిగే పొడి
(అంతఃప్రవాహి మరియు స్పర్శీయ ఫంగిసైడ్)

మాంకోసెబ్ 63% + కార్బెండాజిమ్ 12% డబ్ల్యూ పి ఒక అంతఃప్రవాహి మరియు స్పర్శీయ ఫంగిసైడ్. దీన్ని విత్తన చికిత్స కోసం ఉపయోగిస్తారు. దీని ద్వారా మిరపగడ్డ తణువు కుళ్లడం, కాలర్ రాట్ మరియు మూల కుళ్లడం, వరి పంటలో షెహ్స్మారి, ఆలూ లో ముందస్తు అంగ్మారి, తరువాతి అంగ్మారి, నల్ల కోడ్, టీ లో పువ్వుల అంగ్మారి, బూరుపు అంగ్మారి, ఎరుపు గరూయా, ఎండు వ్యాధి, నల్ల పొడ్లు, ద్రాక్షలో తులసీటా, పొడి ఫంగస్, అంగ్మారి, మామిడి పండు లో పొడి ఫంగస్, అంగ్మారి, మిర్చిలో ఆకుపచ్చ దాగులు, పండు పాడడం, పొడి ఫంగస్, మక్క జొన్న పంటలో మాతృ వ్యాధి, ఆకు అంగ్మారి, యాపిల్ లో పామారోగ్, పొడి ఫంగస్, మినపప్పు లో తణువు కుళ్లడం, కాలర్ రాట్ మరియు మూల కుళ్లడం వ్యాధుల సమర్థమైన నియంత్రణ కోసం ఉపయోగిస్తారు. జాగ్రత్త :- ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జల జీవులకోసం విషాక్తముగా ఉంది మరియు దీన్ని చేపల పాడగల ప్రాంతంలో ఉపయోగించరాదు.

సిఫారసు

పంట	కీటుపోకలు/రోగం సాధారణ పేరు	హెక్టరుకు మోతాదు సక్రియ పదార్థం (గ్రా / %)	సిద్ధమైన ఫార్మ్యులేషన్ (గ్రా / మి.లీ.)	నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీ)	చివరి స్ప్రే నుండి పంట కోత వరకు వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)	ప్రతి స్ప్రే తరువాత ప్రవేశం (గంటలు)
ఆపిల్	ఫల స్కాబ్ మరియు పౌడరి మిల్డ్యూ	0.19%	0.25%	పంట కేనోపీ ప్రకారం అవసరమైన మోతాదు	20	-
మిర్చి	ఆకులు, ఫల రోట మరియు పౌడరి మిల్డ్యూ	563	750	500	3	-
పత్తి	ఆల్టర్నేరియా ఆకుల దద్దు మరియు గ్రే మిల్డ్యూ	180+945	1500	500	71	-
ద్రాక్ష	డౌని మిల్డ్యూ, పౌడరి మిల్డ్యూ, అన్త్రాక్నోసిస్	0.11%	0.15%	పంట కేనోపీ ప్రకారం అవసరమైన మోతాదు	7	-
వేరుశెనగ	ఆకుల దద్దు, బ్లాస్ట్	375	500	500	72	-
వేరుశెనగ	టిక్కా ఆకుల దద్దు, కాలర్ రోట్ మరియు డ్రై రూట్ రోట్	1.88	2.5	0	బీజోపచారం	-
మక్కా	డౌని మిల్డ్యూ మరియు ఆకుల బ్లైట్	120+630	1000	500	37	-
మాండరిన్	కొమ్ము బ్లైట్, సూట్యీ మోల్డ్, అన్త్రాక్నోసిస్ ఫల రోట మరియు ఆకుల దద్దు	0.23%	0.30%	500	30	-
మామిడి	పౌడరి మిల్డ్యూ, అన్త్రాక్నోసిస్	0.11%	0.15%	పంట కేనోపీ ప్రకారం అవసరమైన మోతాదు	7	-
బియ్యం	బ్లాస్ట్	563	750	750	57	-
ఆలూ	అర్లీ బ్లైట్, లేట్ బ్లైట్, బ్లాక్ స్కర్ఫ్	1312.5	1750	500	47	-
సోయాబీన్	ఆల్టర్నేరియా ఆకుల దద్దు, మైరోథేషియం ఆకుల దద్దు, పాడ్ & స్టెమ్ బ్లైట్, అన్త్రాక్నోసిస్	150+787.5	1250	500	31	-
చాయ్	బ్లిస్టర్ బ్లైట్, గ్రే బ్లైట్, రెడ్ రస్ట్, డై-బ్యాక్, బ్లాక్ రోట్	937.5	1250	250-500	7	-

ఉపయోగించే విధానం
పంట దశను బట్టి నీటి పరిమాణాన్ని పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు.

మొక్కల రక్షణ పరికరాలు:
నాప్సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్సాక్ స్ప్రేయర్, బ్యాటరీ కంప్రెషన్ నాప్సాక్ స్ప్రేయర్ మరియు హాలో కోన్ నాజిల్ కలిగిన ASPEE-HTP పవర్ స్ప్రేయర్.

వినియోగ సమయం:
CIB మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలి.

జాగ్రత్తలు
1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పాత్రలు మరియు పశువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కం నివారించాలి.
3. స్ప్రే మబ్బును శ్వాసలోకి తీసుకోవడం నివారించాలి. గాలి దిశలోనే పిచికారీ చేయాలి.
4. పిచికారీ చేసిన తరువాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి.
5. పిచికారీ చేస్తున్నప్పుడు పొగ త్రాగకూడదు, తినకూడదు, తాగకూడదు లేదా ఏదైనా నమలకూడదు.
6. కలపడం మరియు పిచికారీ సమయంలో పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి.

విష ప్రభావ లక్షణాలు
తలనొప్పి, తల తిరగడం, వాంతులు, మలబద్ధకం, చూపు మసకబారడం, విరేచనాలు, మూర్ఛ, అధిక చెమటలు, కన్నీళ్లు కారడం మరియు నోటి లాలాజలం అధికంగా రావడం. అలర్జీ లక్షణాలు కూడా కనిపించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స
1. మింగినట్లయితే వాంతులు చేయించకూడదు మరియు నోటిద్వారా ద్రవం ఇవ్వకూడదు.
2. బట్టలు మరియు చర్మం కలుషితమైతే బట్టలు తొలగించి చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి.
3. కళ్ళలో పడితే 10 నుండి 15 నిమిషాలు శుభ్రమైన నీరు లేదా సలైన్ నీటితో కడగాలి.
4. శ్వాసలోకి వెళ్లినట్లయితే రోగిని వెంటనే తాజా గాలిలోకి తీసుకెళ్లాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ
CIB మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలి.

ప్రతివిషం (అంటిడోట్)
1. వెంటనే అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ 2 నుండి 4 మి.గ్రా. శిరస్రావంగా ప్రతి 5 నుండి 10 నిమిషాల వ్యవధిలో ఇవ్వాలి. అవసరమైతే ఒక రోజులో 25 నుండి 50 మి.గ్రా వరకు ఇవ్వవచ్చు. లక్షణాలు కొనసాగుతున్నాయా లేదా అన్నదాని ఆధారంగా మరింత అట్రోపిన్ ఇవ్వాలి. లాలాజలం స్రావం స్థాయి మోతాదు సర్దుబాటుకు సూచికగా ఉపయోగించవచ్చు.
2. 1–2 గ్రా. 2-PAM ను 10 మి.లీ డిస్టిల్ నీటిలో కరిగించి 10–15 నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా శిరస్రావంగా ఇవ్వాలి.
3. అలర్జీ లక్షణాల కోసం యాంటీహిస్టమిన్ ఔషధాలు ఇవ్వవచ్చు.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ల నిర్వాహణ
1. తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్లు మరియు వినియోగదారులు ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలను పర్యావరణానికి లేదా నీటి కాలుష్యానికి కారణం కాకుండా సురక్షితంగా పారవేయాలి.
2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను బయట వదిలివేయకూడదు, మళ్లీ ఉపయోగించకుండా చూడాలి.
3. ప్యాకేజీలను పగలగొట్టి నివాస ప్రాంతాల నుండి దూరంగా పూడ్చివేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు
1. కీటకనాశిని కలిగిన ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువుల నుండి వేరుగా గదుల్లో నిల్వ చేయాలి. ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల నుండి వేరుగా ఉంచాలి లేదా తాళం వేసిన అల్మారాలో నిల్వ చేయాలి.
2. నిల్వ గదులు బలంగా నిర్మించబడినవి, పొడిగా, తగినంత వెలుతురు మరియు గాలి ప్రసరణ ఉండే విధంగా ఉండాలి.

రసాయన సంయోజనము

క్ర.సం	పదార్థం / వివరణ	పరిమాణం
1	కార్బెండాజిం సాంకేతిక (98% బరువు/బరువు సక్రియ పదార్థం ఆధారంగా)	12.25 % బరువు/బరువు
2	మాన్కోజెబ్ సాంకేతిక (85% బరువు/బరువు సక్రియ పదార్థం ఆధారంగా)	74.12 % బరువు/బరువు
3	ఆల్కిల్ ఎరిల్ సల్ఫోనేట్ సోడియం ఉప్పు	2.00 % బరువు/బరువు
4	ఆల్కిల్ నాఫ్థెల్ సల్ఫోనేట్ సోడియం ఉప్పు	2.00 % బరువు/బరువు
5	కియోలిన్	9.63 % బరువు/బరువు
	మొత్తం	100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಸೆಬ್ 63% ಕರಗುವ ಪುಡಿ
(ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಾರಿ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

ಮ್ಯಾಂಕೋಸೆಬ್ 63% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಾರಿ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಫಲಿ ಸೊಂಕಿನ ತಣುವು, ಕಾಲರ್ ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರೆಯ ತಳಿಯ ಸೊಂಕು, ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಹ್ಸ್ಮಾರಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ನಂತರದ ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ಕಪ್ಪು ಕೋಡ್, ಚಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ಭೂರಪ್ಪಳ ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ಕೆಂಪು ಗರುವಾ, ಒಣ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಪ್ಪು ಕಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಸಿ ಹಾನಿ, ಪುಡಿ ಫಂಗಸ್, ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಫಂಗಸ್, ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹೋಳಿ ಪತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಕಳೆ, ಪುಡಿ ಫಂಗಸ್, ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೋಗ, ಎಲೆಗಳ ಅಂಗ್ಮಾರಿ, ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪಾಮಾರೋಗ್, ಪುಡಿ ಫಂಗಸ್, ಮುಂಗಫಲಿಯಲ್ಲಿ ತಣುವು ಕಳೆ, ಕಾಲರ್ ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರೆಯ ತಳಿಯ ಸೊಂಕಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ :- ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಳಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆಗೆ	ಹೀಟು/ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ / %)	ತಯಾರಾದ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ / ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲಿ)	ಕೊನೆಯ ಫವಾರಣೆಯಿಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ ತನಕ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಫವಾರಣೆಯ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ (ಗಂ)
ಆಪಲ್	ಹಣ್ಣು ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	0.19%	0.25%	ಪಂಟ ಕೆನೋಪಿ ಪ್ರಕಾರಂ ಅವಸರಮೈನ ಮೋತಾದು	20	-
ಮಿರಿಯಿ	ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	563	750	500	3	-
ಹತ್ತಿ	ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	180+945	1500	500	71	-
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಅಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸಿಸ್	0.11%	0.15%	ಪಂಟ ಕೆನೋಪಿ ಪ್ರಕಾರಂ ಅವಸರಮೈನ ಮೋತಾದು	7	-
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ	ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	375	500	500	72	-
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ	ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಕಾಲರ್ ರೋಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ರೂಟ್ ರೋಟ್	1.88	2.5	0	ಬೀಜೋಪಚಾರಂ	-
ಜೋಳ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಬ್ಲೈಟ್	120+630	1000	500	37	-
ಮಂಡರಿನ್	ಕೊಂಬು ಬ್ಲೈಟ್, ಸೂಟಿ ಮಾಲ್ಡ್, ಅಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸಿಸ್ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್	0.23%	0.30%	500	30	-
ಮಾವು	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಅಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸಿಸ್	0.11%	0.15%	ಪಂಟ ಕೆನೋಪಿ ಪ್ರಕಾರಂ ಅವಸರಮೈನ ಮೋತಾದು	7	-
ಅಕ್ಕಿ	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	563	750	750	57	-
ಬಟಾಟೆ	ಅರ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್, ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕರ್ಫ್	1312.5	1750	500	47	-
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಮೈರೋಥೆಸಿಯಂ ಎಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ಲೈಟ್, ಅಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸಿಸ್	150+787.5	1250	500	31	-
ಚಹಾ	ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೈಟ್, ಗ್ರೇ ಬ್ಲೈಟ್, ರೆಡ್ ರಸ್ಟ್, ಡೈ-ಬ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಟ್	937.5	1250	250-500	7	-

ಬಳಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು
ಕೋಶ್ಠದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಈ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಕಲಸಿ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
1. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಬಾಷ್ಪವು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ನಂತರ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತೊಳಿಸಿ.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು.
6. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
7. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
8. ಇ.ಟಿ.ಯು. ಪ್ರಮಾಣ 0.5% ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು.
9. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಚಳಿಯಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ – ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪೂರ್ಣ ಬಾಹು ಶರ್ಟ್, ಉದ್ದದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬೂಟ್, ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಕ ಕಣ್ಣಡಿಗಳು, ಮುಖಮುಖಾನ, ಟೋಪಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈಗಾವಲು.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಒಬ್ಬರು ಬೆವರು, ತಲೆನೋವು, ಸಂೋಗರ್ಕೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಹ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ
(1) ಬಾಯಿಯಿಂದ ನುಂಗಿದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ವಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪದಾರ್ಥ ಶುದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿ ಅಚೇತನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ.
(2) ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತೊಳಿಸಿ.
(3) ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲೈನ್/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತೊಳಿಸಿ.
(4) ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ.

ಸಸ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ
ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ
1. ಫಂಗಿಸೈಡ್ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಜನಸಂಕುಲದಿಂದ ದೂರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಬೇಡಿ, ಪುನಃ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು.
3. ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹದ ಶರತ್ತುಗಳು
1. ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಇರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಅಲ್ಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದಂತೆ ಇಡಿ.
2. ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಒಣ, ಬೆಳಕಿನೊಡನೆ, ಗಾಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಇರುವಂತಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಘಟಕ / ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ ತಾಂತ್ರಿಕ (98% ತೂಕ/ತೂಕ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಆಧಾರಿತ)	12.25 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಮ್ಯಾಂಕೋಸೆಬ್ ತಾಂತ್ರಿಕ (85% ತೂಕ/ತೂಕ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಆಧಾರಿತ)	74.12 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ಅಲ್ಕೈಲ್ ಎರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್‌ನ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಅಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ತೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್‌ನ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
5	ಕಿಯೋಲಿನ್	9.63 % ತೂಕ/ತೂಕ
	ಒಟ್ಟು	100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

കാർബെൻഡാസിം 12% + മാങ്കോസബ് 63% ലയിക്കുന്ന പൊടി
(അന്തരഗതവും സ്പർശനക്ഷമവുമായ ഫംഗിസൈഡ്)

മാങ്കോസബ് 63% + കാർബെൻഡാജിം 12% ഡബ്ല്യൂ പി എസ്. ഒരു അന്തർഗതവും സ്പർശനക്ഷമവുമായ ഫംഗിസൈഡ് ആണ്. ഇത് വിത്ത് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിലൂടെ പീൻപലിയുടെ തണ്ട് കുഴഞ്ഞുപോകൽ, കാലർ റോട്ട്, വേരിന്റെ കുഴഞ്ഞുപോകൽ, നെല്ലിൽ ഷെഹ്സ്മാരി, ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ആദ്യ അംഗ്മാരി, പിന്നീട് അംഗ്മാരി, കറുപ്പ് കോഡ്, ചായയിൽ പൂക്കളുടെ അംഗ്മാരി, കടുത്ത അംഗ്മാരി, ചുവപ്പ് ഗരൂവാ, ഉണക്ക രോഗം, കറുത്ത പൊട്ടൽ, മുന്തിരി തുലസി, പൊടി ഫംഗസ്, അംഗ്മാരി, മാങ്ങയിൽ പൊടി ഫംഗസ്, അംഗ്മാരി, മുളകിൽ ഇല പാടുകൾ, പഴം പൊട്ടൽ, പൊടി ഫംഗസ്, മക്കയിൽ മാതൃ രോഗം, ഇലയുടെ അംഗ്മാരി, ആപ്പിളിൽ പാമരോഗ്, പൊടി ഫംഗസ്, പീൻപലിയിൽ തണ്ട് കുഴഞ്ഞുപോകൽ, കാലർ റോട്ട്, വേരിന്റെ കുഴഞ്ഞുപോകൽ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജാഗ്രത :- ഉത്പന്നം മീനും ജലജീവികളും വിഷാംശമുള്ളതും, മീൻചഷണ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്.

ശുപാർശ

വിള	കീടം/രോഗം സാധാരണ പേര്	പ്രതി ഹെക്ടർ അളവ് സജീവഘടകം (ഗ്രാം / %)	തയ്യാറാക്കിയ ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം / മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുന്ന അളവ് (ലി)	അവസാന ഫവാരണം മുതൽ വിള ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലം (ദിവസം)	ഓരോ ഫവാരണത്തിനുശേഷം പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
ആപ്പിൾ	ഫലം സ്കാബ് & പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	0.19%	0.25%	വിളയുടെ കാനോപ്പി അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ അളവ്	20	-
മുളക്	ഇല സ്പോട്ട്, ഫലം പാഴാക്കലും പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	563	750	500	3	-
പന്തിട	അൾട്ടർനേറിയ എല സ്പോട്ട് & ഗ്രേ മിൽഡ്യൂ	180+945	1500	500	71	-
മുന്തിരി	ഡൗണി മിൽഡ്യൂ, പൗഡറി മിൽഡ്യൂ, ആന്ത്രാക്നോസിസ്	0.11%	0.15%	വിളയുടെ കാനോപ്പി അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ അളവ്	7	-
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ഇല സ്പോട്ട്, ബ്ലാസ്റ്റ്	375	500	500	72	-
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ടിക്കാ ഇല സ്പോട്ട്, കോളർ റോട്ട് & ഡ്രൈ റൂട്ട് റോട്ട്	1.88	2.5	0	വിത്ത് ചികിത്സ	-
മകൈ	ഡൗണി മിൽഡ്യൂ & ഇല ബ്ലൈറ്റ്	120+630	1000	500	37	-
മാണ്ഡറിന്	കൊമ്പ് ബ്ലൈറ്റ്, സൂട്ടി മോൾഡ്, ആന്ത്രാക്നോസിസ് ഫലം പാഴാക്കൽ & ഇല സ്പോട്ട്	0.23%	0.30%	500	30	-
മാംഗോ	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ, ആന്ത്രാക്നോസിസ്	0.11%	0.15%	വിളയുടെ കാനോപ്പി അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ അളവ്	7	-
അരി	ബ്ലാസ്റ്റ്	563	750	750	57	-
ആൽക്കു	എർലി ബ്ലൈറ്റ്, ലേറ്റ് ബ്ലൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് സ്കർഫ്	1312.5	1750	500	47	-
സോയ	അൾട്ടർനേറിയ എല സ്പോട്ട്, മൈറോഥേഷ്യം എല സ്പോട്ട്, പോഡ് & സ്റ്റം ബ്ലൈറ്റ്, ആന്ത്രാക്നോസിസ്	150+787.5	1250	500	31	-
ചായ	ബ്ലിസ്റ്റർ ബ്ലൈറ്റ്, ഗ്രേ ബ്ലൈറ്റ്, റെഡ് റസ്റ്റ്, ഡൈ-ബാക്ക്, ബ്ലാക്ക് റോട്ട്	937.5	1250	250-500	7	-

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
ഉപയോഗത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
തുമ്പി മറിച്ചുള്ള സ്പ്രേയറും ഉയർന്ന വാലിയമുള്ള സ്പ്രേയിംഗ് യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

ഉപയോഗസമയം
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉടൻ ഈ ഫംഗിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഫംഗിസൈഡ്, വെള്ളം ശരിയായ അളവിൽ കലർത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദ്രാവകം മരത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി കലർക്കുക.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജാഗ്രത
1. ആഹാരവസ്തുക്കൾ, ശൂന്യമായ ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ ചാറ് എന്നിവയ്ക്ക് അടുത്തു വച്ചുവെക്കരുത്.
2. വായ്, കണ്ണ്, ചർമ്മം സ്പർശം ഒഴിവാക്കുക.
3. സ്പ്രേ ബാഷ്പം ശ്വസനത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുക. കാറ്റ് ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
4.സ്പ്രേ കഴിഞ്ഞ് മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീര ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. സ്പ്രേ സമയത്ത് പുകയ്ക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുക വേണ്ട.
6. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും കലർത്തുമ്പോഴും സമ്പൂർണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.
7. ഗർഭിണി സ്ത്രീകൾ കാർബെൻഡാജിം സ്പർശം ഒഴിവാക്കണം.
8. ഇ.ടി.യു. അളവ് 0.5 ശതമാനത്തിലധികം ആയിരിക്കരുത്.
9. ഉത്പന്നം തണുത്തതും ഉണക്ക സ്ഥലത്തും സൂക്ഷിക്കുക.

തൊഴിലാളികൾക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്കും ജാഗ്രത – ഫംഗിസൈഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. ഉദാഹരണം: മുഴുവൻ കൈ ഷർട്ട്, നീണ്ട പാന്റ്, ബൂട്ട്, കണ്ണട, മുഖാവരണം, ടോപ്പി, രാസപ്രതിരോധ കയ്യുറകൾ.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
വെള്ളം കൂടൽ, തലവേദന, അലസത, കш, തുമ്മൽ, കുത്തിവയ്പ്, ഛർദ്ദി, ഛർദ്ദിയോടെയുള്ള ദുർബലത അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
(1) തൊണ്ടയിലൂടെ ചാൽ, കഴുത്തിനടിയിൽ നിന്ന് മൃദുവായി തട്ടി ഛർദ്ദി ചെയ്യിക്കുക. ഛർദ്ദിയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന പദാർത്ഥം ശുദ്ധമാകുന്നത് വരെ ഈ നടപടികൾ ആവർത്തിക്കുക. രോഗി മയംഅവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഛർദ്ദി ചെയ്യരുത്.
(2) വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും മലിനമെങ്കിൽ, മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ചർമ്മം മതിയായ അളവിൽ സോപ്പ്, വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകുക.
(3) കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ, അവയെ മതിയായ അളവിൽ സാലൈൻ/ശുദ്ധജലത്തിൽ ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റ് കഴുകുക.
(4) ശ്വാസത്തിൻ മുഖേന ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കിയ വായുവുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുക.

സസ്യവിശേഷത
പരാമർശിച്ച അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കീടനാശിനി സസ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ല.

വിഷനാശിനി
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷനാശിനി ഇല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുക.

ശൂന്യ ഡബ്ബികളുടെ നിവാരണ
1. ഫംഗിസൈഡ് നിർമ്മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ബാധ്യതയിൽ ഡബ്ബികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ തകർത്ത് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരം, മണ്ണിൽ പതിക്കുക.
2. ശൂന്യ ഡബ്ബികൾ പുറത്താക്കരുത്, പുനർവിനിയോഗം തടയാൻ.
3. ഡബ്ബികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിച്ച ഫംഗിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയ വെള്ളം ചുറ്റുപാടിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും മലിനമാകാതിരിക്കണം.

സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥകൾ
1. ഫംഗിസൈഡ് ഉള്ള ഡബ്ബികൾ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരം, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത അല്മാരിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
2. ഫംഗിസൈഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ശക്തമായ, ഉണക്ക, പ്രകാശമുള്ള, കാറ്റ് ഗതിയുള്ള, മതിയായ നീളവും വീതിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം, ഫംഗിസൈഡ് ബാഷ്പം മൂലം മലിനീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1). കീടനാശിനി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡബ്ബകൾ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അലമാരികളിൽ പൂട്ടി അളവും തരവും അനുസരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം.
2). കീടനാശിനി സംഭരിക്കുന്ന മുറിയോ അലമാരിയോ ഉറപ്പുള്ളതും, വറ്റിയതും,
പ്രകാശമുള്ളതും, നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും, ആവശ്യമായ വലുപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം, അതുവഴി കീടനാശിനിയുടെ വാഷ്പം മൂലം മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം.

രാസ സംയോജനം

ക്ര.സം	ഘടകം / വിവരണം	അളവ്
1	കാർബൻഡാസിം സാങ്കേതികം (98% ഭാരം/ഭാരം സജീവ ഘടകം അടിസ്ഥാനമാക്കി)	12.25 % ഭാരം/ഭാരം
2	മാന്‍കോസബ് സാങ്കേതികം (85% ഭാരം/ഭാരം സജീവ ഘടകം അടിസ്ഥാനമാക്കി)	74.12 % ഭാരം/ഭാരം
3	ആൽക്കിൽ എറിൽ സൾഫോനേറ്റ് സോഡിയം ഉപ്പ്	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
4	ആൽക്കിൽ നാഫ്തൈൽ സൾഫോനേറ്റ് സോഡിയം ഉപ്പ്	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
5	കിയോലിൻ	9.63 % ഭാരം/ഭാരം
	മൊത്തം	100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

کاربینڈازِم 12% + مانکوزیب 63% گھلنشیل پاؤڈر
(داخلی اور سطحی پھپھوندی کش)

مانکوزیب 63% + کاربینڈازِم 12% ڈبلیوپی ایک داخلی اور سطحی پھپھوندی کش ہے۔ یہ بیج کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مونگ پھلی کی ٹہنی گلنا، کالر راٹ اور جڑ کا گلنا، دھان میں شیس ماری، آلو میں ابتدائی انگماری، بعد کی انگماری، کالی کچھ، چائے میں پھولوں کی انگماری، بھوراپن، لال گرووا، خشک بیماری، کالی سڑن، انگور میں تلسیتا، پاؤڈر پھپھوندی، انگماری، آم میں پاؤڈر پھپھوندی، انگماری، مرچ میں پتے کے دھبے، پھل کی سڑن، پاؤڈر پھپھوندی، مکئی میں ماتری بیماری، پتے کی انگماری، سیب میں پاماروج، پاؤڈر پھپھوندی، مونگ پھلی میں ٹہنی گلنا، کالر راٹ اور جڑ کا گلنا بیماریوں کا مؤثر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ احتیاط :- یہ پیداوار مچھلی اور آبی جانوروں کے لیے زہریلا ہے اور اس کا استعمال ماہی گیری کے نزدیک نہیں کرنا چاہیے۔

سفارشات

فصل	کیڑے/رَوغ کا عام نام	فی ہیکٹر مقدار فعال جزو (گرام / %)	تیار شدہ فارمولیشن (گرام / ملی لیٹر)	پانی میں گھلانے کی مقدار (ل)	آخری چھڑکاؤ سے فصل کی کٹائی تک انتظار کا وقت (دن)	ہر چھڑکاؤ کے بعد داخلہ (گھنٹے)
سیب	پھل سکیب اور پاؤڈری ملڈیو	0.19%	0.25%	فصل کی چھتری (کینوپی) کے مطابق ضروری مقدار	20	-
مرچ	پتے کے دھبے، پھل سڑنا اور پاؤڈری ملڈیو	563	750	500	3	-
کپاس	آلٹرنیریا پتے کے دھبے اور گرے ملڈیو	180+945	1500	500	71	-
انگور	ڈاؤنی ملڈیو، پاؤڈری ملڈیو، اینتھریکنوسس	0.11%	0.15%	فصل کی چھتری (کینوپی) کے مطابق ضروری مقدار	7	-
مونگ پھلی	پتے کے دھبے، بلاسٹ	375	500	500	72	-
مونگ پھلی	ٹکا پتے کے دھبے، کالر روٹ اور خشک جڑ کا روٹ	1.88	2.5	0	بیج علاج	-
مکئی	ڈاؤنی ملڈیو اور پتے کی بلیٹ	120+630	1000	500	37	-
مینڈارن	ٹہنی بلیٹ، سُوٹی مولڈ، اینتھریکنوسس پھل سڑنا اور پتے کے دھبے	0.23%	0.30%	500	30	-
ام	پاؤڈری ملڈیو، اینتھریکنوسس	0.11%	0.15%	فصل کی چھتری (کینوپی) کے مطابق ضروری مقدار	7	-
دھان	بلاسٹ	563	750	750	57	-
آلو	ارلی بلیٹ، لیٹ بلیٹ، بلیک اسکرف	1312.5	1750	500	47	-
سویابین	آلٹرنیریا پتے کے دھبے، مائروتھیسیئم پتے کے دھبے، پود اور تنا بلیٹ، اینتھریکنوسس	150+787.5	1250	500	31	-
چائے	بلیسٹر بلیٹ، گرے بلیٹ، ریڈ رسٹ، ڈائی بیک، بلیک روٹ	937.5	1250	250-500	7	-

استعمال کے لیے ہدایات
پیٹھ پر رکھنے والے اسپرے کرنے والے آلات اور زیادہ حجم والے اسپرے آلات استعمال کریں۔

استعمال کا وقت
اس پھپھوندی کش کا استعمال بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر فوراً کریں۔ ہدایت کے مطابق پھپھوندی کش اور پانی کو مناسب مقدار میں ملا کر اسپرے کریں۔ اسپرے کرنے سے پہلے محلول کو اچھی طرح لکڑی سے مکس کریں۔

صارفین کے لیے احتیاط
1. خوراکی اشیاء، خالی برتن اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔
2. منہ، آنکھیں، اور جلد کو رابطے سے بچائیں۔
3. اسپرے کے بخارات کو سانس کے ذریعے اندر جانے سے روکیں۔ ہوا کی سمت میں اسپرے کریں۔
4. اسپرے کے بعد آلودہ کپڑے اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔
5. اسپرے کے وقت سگریٹ نوشی، کھانا، پینا یا کچھ چبانا نہیں چاہیے۔
6. اسپرے یا مکس کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔
7. حاملہ خواتین کو کاربینڈازِم کے رابطے سے دور رہنا چاہیے۔
8. ای.ٹی.یو. کی مقدار 0.5 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
9. پیداوار کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پر ذخیرہ کریں۔

مزدوروں اور صارفین کے لیے انتباہ- پھپھوندی کش کے ساتھ کام کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں، مثال کے طور پر: مکمل بازو کی قمیض، لمبی پینٹ، جوتے، چشمہ، ماسک، ٹوپی، کیمیائی مزاحم دستانے۔

زہریلے اثرات
پسینہ، سر درد، کمزوری، کھانسی، چھینک، خارش، متلی، قے ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد
(1) اگر نگل لیا جائے تو گلے کے پچھلے حصے کو ہلکا سا چھو کر قے کروائیں۔ یہ عمل قے سے خارج ہونے والے مادے صاف ہونے تک دہرائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کروائیں۔
(2) اگر کپڑے یا جلد آلودہ ہو جائیں تو آلودہ کپڑے اتار دیں اور جلد کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔
(3) اگر آنکھیں آلودہ ہوں تو انہیں کافی مقدار میں سالائن / صاف پانی میں تقریباً 10-15 منٹ دھوئیں۔
(4) اگر سانس کے ذریعے اندر گیا ہو تو مریض کو صاف ہوا میں لے جائیں۔

پودے کی حفاظت
تجویز کردہ مقدار کے مطابق استعمال کرنے پر یہ کیٹناشک پودے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔

زہر کا علاج
کوئی خاص زہر کش نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کی نپٹارہ
1. پھپھوندی کش بنانے والا یا صارف کی ذمہ داری ہے کہ ڈبے یا برتن توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کر دے۔
2. خالی ڈبے باہر نہ رکھیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔
3. ڈبے یا بچا ہوا پھپھوندی کش یا دھونے کے پانی کا نپٹارہ ایسا کریں کہ آس پاس کی چیزیں اور پینے کا پانی آلودہ نہ ہوں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
1. پھپھوندی کش والے ڈبے دیگر اشیاء یا خوراک رکھنے والے کمروں سے دور یا تالے والی الماری میں رکھیں۔
2. ذخیرہ کرنے والا کمرہ مضبوط، خشک، روشنی والا، ہوادار اور مناسب لمبا چوڑا ہونا چاہیے تاکہ پھپھوندی کش کے بخارات سے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی ترکیب

سلسلہ نمبر	جزو / وضاحت	مقدار
1	کاربنڈازیم ٹیکنیکل (98% وزن/وزن فعال جزو کی بنیاد پر)	12.25 % وزن/وزن
2	مانکوزیب ٹیکنیکل (85% وزن/وزن فعال جزو کی بنیاد پر)	74.12 % وزن/وزن
3	الکیل ایریل سلفونیٹ کا سوڈیم نمک	2.00 % وزن/وزن
4	الکیل نیفتھیل سلفونیٹ کا سوڈیم نمک	2.00 % وزن/وزن
5	کیولین	9.63 % وزن/وزن
	کل	100 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu