निमली

Azadirachtin- 1% (10000 ppm)

(कीटकनाशक)

हे उत्पादन एक वनस्पतिजन्य कीटकनाशक आहे जे नीम सीड कर्नलवर आधारित आहे. त्यात किमान 10 ग्रॅम Azadirachtin प्रति किलोग्रॅम सामग्री (w/w) असते. हे एक पर्यावरणपूरक उत्पादन आहे जे टोमॅटो आणि फळांमधील बोअरर आणि वांग्यातील अंकुराच्या नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे.

शिफारस

पिके	कीटकांचे सामान्य नाव	डोस/हेक्टर		पाण्यत पातळ करणे हेक्टर (लिटर	शेवटची फवारणी ते कापणीच्या दिवसापर्यंत प्रतीक्षा कालावधी	प्रत्येक अर्जानंतर पुन्हा प्रवेश (तासात)
		AI	फॉर्म्युलेशन लिटर			
वांगी	फ्रूट अँड शूट बोअरर (ल्युसिनोड्स ऑर्बोनालिस)	1	1.5	500	3	
	फ्रूट अँड शूट बोअरर (ल्युसिनोड्स ऑर्बोनालिस)	1	1.5	500	3	
टोमॅटो	फ्रूट बोरर (हेलीकोव्हरपा आर्मिगेरा)	1	1.5	500	3	
	फ्रूट बोरर (हेलीकोव्हरपा आर्मिगेरा)	1	1.5	500	3	

वापरण्याची दिशा

उच्च आवाजाच्या स्प्रेअर द्वारे शिफारस केल्यानुसार वापरल्यास, हे उत्पादन प्रभावीपणे कीटक नियंत्रित करते. आवश्यक प्रमाणात उत्पादन थोडे पाण्यात घ्या आणि नीट ढवळून घ्या. आवश्यक प्रमाणात पाणी घालून नीट ढवळून घ्यावे. आवश्यक प्रमाणात पाणी घाला आणि वापरण्यासाठी तयार स्प्रे तयार करण्यासाठी नीट ढवळून घ्यावे. पी.पी. उपकरणे:- शिफारस केलेल्या पोकळ शंकूच्या नोजल सह नॅपसॅक स्प्रेयर.

वापरण्याची वेळ

सावधगिरी

1. सामग्रीचा त्वचेशी संपर्क टाळा.
2. फवारणी करताना एप्रन, हुड, बूट आणि हातमोजे यांसारखे संरक्षणात्मक साहित्य घाला.
3. फवारणी करताना खाऊ नका, चघळू नका किंवा धुम्रपान करू नका.

विषबाधेची लक्षणे

डोळ्याच्या श्लेष्मल त्वचेचे हलकी जळजळ, त्वचेची जळजळ होऊ शकते. प्रयोगशाळेतील प्राण्यांमध्ये मोटर क्रियाकलाप कमी होणे, उथळ श्वसन, अनुनासिक स्त्राव फोटो प्रतिक्रिया आणि अतिसार होऊ शकतो.

प्रथमोपचार

दूषित भाग भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. डोळे दूषित असल्यास, भरपूर पाण्याने धुवा.

फायटोटोक्सिसिटी

वर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यास, या उत्पादनामुळे वरील पिकांना फायटोटॉक्सिसिटी होत नाही.

उतारा

लक्षणात्मक उपचार करा. गिळल्यास गॅस्ट्रिक लॅव्हेज द्या. डॉक्टरांना कॉल करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे

1. पुनर्वापर टाळण्यासाठी कंटेनर बाहेर सोडू नका.
2. रिकामे डबे नष्ट करा आणि वस्ती आणि भूगर्भातील पाण्याच्या स्त्रोतापासून दूर असलेल्या बिगर पीक जमिनीत जमिनीच्या पातळीपासून 18" खाली गाडून टाका.
3. रिकाम्या डब्यांची, अतिरिक्त सामग्रीची आणि फवारणी उपकरणांमधून धुण्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावा जेणेकरून पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण, अन्न आणि पशुखाद्य दूषित होऊ नये.
4. अन्न किंवा पाणी साठवण्यासाठी कधीही रिकाम्या कंटेनरचा वापर करू नका.

स्टोरेज अटी

उष्णता आणि खुल्या ज्योतपासून दूर थंड आणि कोरड्या जागी साठवा. सामग्री साठवण्यासाठी असलेली खोली चांगली बांधलेली, हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाची असावी. अन्न आणि खाद्य पदार्थांपासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये ठेवा.

रासायनिक रचना

कडुनिंबाचे तेल 30.00% w/w

बुटाइल एसीटेट (विद्रावक) 23.00 % w/w

Azadirachtin (a.i.) 1.00 % w/w मि.

N. बुटानॉल (विद्रावक) 31.00 % w/w

इमल्सिफायर 15.00 % w/w

एकूण 100% w/w

नीमली

एजाडिरेक्टिन- 1% (10000 पीपीएम)

(कीटनाशक)

यह एक वनस्पति जनित कीटनाशक है, जिसमें नीम के बीज से होने वाला एजाडिरेक्टिन 10 ग्राम (भार/भार) प्रति किलोग्राम पदार्थ में सक्रिय तत्व रूप में होता है। यह एक पयार्वरण सर्व मित्र कीटनाशक है, जिसका उपयोग टमाटर में लगने वाला फल छेदक एवं बैंगन में लगने वाला प्ररोह और छेदक का नियंत्रण के लिये होता है।

उपयोग

फसल	कीटों का सामान्य नाम	डोस/हेक्टर		पानी में पतलाप / हेक्टेयर (लीटर)	अंतिम स्प्रे से कटाई के दिन तक प्रतीक्षा अवधि	प्रत्येक आवेदन के बाद पुनः प्रवेश (घंटों में)
		एआ ई	फॉर्मूलेशन लीटर			
बैंगन	फल और अंकुर बेधक (ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस)	1	1.5	500	3	
	फल और अंकुर बेधक (ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस)	1	1.5	500	3	
टमाटर	फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा)	1	1.5	500	3	
	फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा)	1	1.5	500	3	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

अधिक तेज दबाव के छिड़काव द्वारा, घोल और मात्रा के अनुसार प्रयोग करने से उपयोग में दिये गये कीटों की रोकथाम कर सकता है।। इस पदार्थ की निर्धारित मात्रा को थोड़े पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलायें, फिर छिडकाव के घोल की मात्रा के मुताबिक बाकी का पानी डालें और अच्छी तरह हिलायें ताकि छिड़काव के लिये तैयार हो जाये।

उपयोग के उपकरण:

उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र जैसे पीठ पर लादकर चलने वाला छिड़काव यंत्र, शक्ति चलित छिड़काव यंत्र भी उपयोग किये जा सकते हैं। नैपसैक स्प्रेयर जिसमें होलो कोन नोजल लगा हो।

प्रयोग का समय

प्रयोगकर्ता ओं के लिए सावधानियां

1. सांस से अंदर न जाने दें, शरीर या मुंह न लगने दें।
2. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
3. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
4. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण रक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण इसके संपर्क से आंखों में मंद खुजली हो सकती है। हल्की मोटर, एक्टिविटी सांस लेने में परेशानी, फोटो रिएक्शन, नाक से पानी बहना, दस्त लगना आदि लेबोरेटरी जानवरों में पाया जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा

1. शरीर के दूषित हिस्सों और कपड़ों को पानी और साबुन से धोएं।
2. आंखों में लगने पर तेज पानी से धोयें।

पौधविशाक्तता

निर्देशानुसार प्रयोग किये जाने पर पौधों के लिये हानिकारक नहीं है।

विष नाशक

विष लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लावेज दें। डॉक्टर को बुलायें।

खाली डिब्बों का निपटारा

1. खाली डिब्बे बाहर खल न छोड़े ताकि दोबारा उपयोग ना हो।
2. खाली डिब्बों को तोड़कर बस्ती से दूर जमीन में कम से कम 18 इंच नीचे ऐसे स्थान पर गाड़ दें जहाँ खेती बाड़ी या भूमिगत जल स्रोत ना हो।
3. खाली डिब्बे / धोबन और बची हुई सामग्री सुरक्षित ढंग से इस प्रकार निपटाएं जिससे वातावरण या पानी में प्रदूषण ना हो सके या पशुओं का भोजन चारा आदि विषाक्त ना हो।
4. खाली डिब्बों को पानी, खाद्य पदार्थ संग्रह करने के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें।

संग्रहण की शर्तें

खाली जगह और गर्मी से ठंडी और सूखी जगह रखें। इसे रखने वाले कमरे मजबूत, खूब हवादार और रोशनीदार तथा काफी लंबे होने चाहिए।

रासायनिक संरचना

1 नीम का तेल 30.00 % भार/भार

2 व्युटव्यैल असिटेट (सालवेन्ट) 23.00 % भार/भार

3 एजाडिरेक्टिन (ए. आई.) 1.00 % भार/भार न्यूनतम न्यू

4 एन ब्यूटेनाल (सालव व्यु ेन्ट) 31.00 % भार/भार

5 इमल्सीफायर 15.00 % भार/भार

कुल 100 % w/w

Neemly

Azadirachtin- 1% (10000 ppm)

(Insecticide)

This product is a botanical insecticide based on Neem Seed Kernel derived from Azadirachtin. It contains a minimum of 10 grams of Azadirachtin per kilogram of the material (w/w). It is an environmentally friendly product useful in the control of fruit borer in tomato and fruit and shoot borer in brinjal.

Recommendation

Crops	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water/ha (litre)	Waiting Period between last spray to harvest day	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI	Formulation litre			
Brinjal	Fruit and Shoot borer (Leucinodes orbonalis)	1	1.5	500	3	
	Fruit and Shoot borer (Leucinodes orbonalis)	1	1.5	500	3	
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	1	1.5	500	3	
	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	1	1.5	500	3	

Direction Of Use

When used as recommended through a high volume sprayer, this product controls the pests effectively. Take the required quantity of the product in some water and stir well. Add the required quantity of water and stir well. Add the required quantity of water and stir well to form a ready to use spray. P.P. Equipment:- Knapsack sprayer fitted with a hollow cone nozzle is recommended.

Time of Application

Precautions

1. Avoid contact of the material with skin.
2. Wear protective materials like apron, hood, boots and gloves while spraying.
3. Do not eat, chew or smoke while spraying.

Symptoms Of Poisoning

Mild irritation to the mucous membrane of the eye, skin irritation could occur. Reduced motor activity, shallow respiration, nasal discharge photo reaction and diarrhea may occur in laboratory animals.

First Aid

Wash contaminated parts with plenty of soap and water. If eyes are contaminated, wash with plenty of water.

Phytotoxicity

When used as stated above, this product does not cause any phytotoxicity to the above crops.

Antidote

Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician.

Disposal Of Used Container

1. Do not leave the containers outside in order to prevent reuse.
2. Destroy the empty containers and bury them 18" below the ground level in non crop land away from habitation and underground water source.
3. Dispose of empty containers, surplus material and washings from spray equipment in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution, food and animal feed contamination.
4. Never use the empty containers for storing food or water.

Storage Conditions

Store in a cool and dry place away from heat and open flame. The room meant for storing the material should be well built, well ventilated, well aerated and of sufficient dimensions. Store the material in separate rooms, away from food and feed materials in almirahs under lock and key.

Chemical Composition

Neem Oil 30.00 % w/w

Butyl acetate (Solvent) 23.00 % w/w

Azadirachtin (a.i.) 1.00 % w/w min.

N. Butanol (Solvent) 31.00 % w/w

Emulsifier 15.00 % w/w

Total 100 % w/w

AgroStar®

NEEMLY

10000 PPM

Azadirachtin- 1% (10000 ppm)

Bio Pesticide

Manufacture & Marketed by:
ULINK AGRITECH PVT.LTD
Reg office: 106 B, 6th Floor , E-Space IT Park, A1 Building, 46/1, Nagar Road, Next to Inorbit Mall, Pune- 411014 Maharashtra

Factory address: Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, District Vadodara, Gujarat - 391240

निर्माता -
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
ऑफिस नंबर 106 बी, 6वीं मंजिल, ई-स्पेस आईटी पार्क, ए 1 बिल्डिंग, 46/1, नगर रोड, इनऑर्बिट मॉल के बगल में, पुणे- 411014 महाराष्ट्र

विपणनकर्ता का उत्पादन परिसर-
शेड नंबर 73/बी, सर्वे नंबर 73, जूनी जिथार्डी, तालुका कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात - 391240

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

નીમલી

એઝાડીરેક્ટીન 1%(10000પીપીએમ)

(બાયોપેસ્ટીસાઇડ)

આ પ્રોડક્ટ લીમડાના બીજના મીંજ પર આધારિત બાયોપેસ્ટીસાઇડ છે. જેમાં લીમડાના બીજમાંથી મળતો ઘટક એઝાડિરાક્ટીન 10 ગ્રામ પ્રતિ કિલો પ્રમાણે સક્રિય ઘટક છે. જે એક પર્યાવરણને અનુકૂળ જંતુનાશક છે, જેનો ઉપયોગ ટામેટાંમાં ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ અને રીંગણમાં થડ અને ડુંખ કોરીખાનારને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે.

ભલામણ

પાક	જીવાતોનું નામ	ડોઝ/હેક્ટર		પાણીની માત્રા/ હેક્ટર (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવ થી કાપણી સુધી રાહ જોવાનો સમય	દરેક છંટકાવ બાદ પુનરાવર્તિતનો સમય (કલાક)
		સક્રિય તત્વ	પ્રતિ લીટર માત્રા			
રીંગણ	ફળ અને ડુંખ ખાનાર ઇયળ (Leucinodes orbonalis)	1	1.5	500	3	
	ફળ અને ડુંખ ખાનાર ઇયળ (Leucinodes orbonalis)	1	1.5	500	3	
ટામેટા	ફળ ખાનાર ઇયળ (Helicoverpa armigera)	1	1.5	500	3	
	ફળ ખાનાર ઇયળ (Helicoverpa armigera)	1	1.5	500	3	

ઉપયોગ માટેના સૂચનો:-

જ્યારે આ પ્રોડક્ટ ને વધુ દબાણવાળા સ્પ્રે પંપથી ભલામણ મુજબ છંટકાવ કરવામાં આવે તો તે અસરકારક રીતે જીવાતોનું નિયંત્રણ કરે છે. પ્રોડક્ટની જરૂરી માત્રાને થોડા પાણીમાં લો અને સારી રીતે હલાવો. ત્યાર બાદ જરૂરી માત્રામાં પાણી ઉમેરો અને બરાબર હલાવો. જેથી તે છંટકાવ માટે તૈયાર થઇ જાય. છંટકાવ માટેના સાધનો :- ભલામણ કરેલ હોલો કોન(hollow cone) ફુવારાનો ઉપયોગ કરેલ નેપસેક સ્પ્રેયર પંપ.

સાવચેતી:

1.ત્વચા સાથે દવાનો સીધો સંપર્ક ટાળો.
2. છંટકાવ કરતી વખતે એપ્રોન, ચશ્મા, બૂટ અને મોજા જેવી રક્ષણાત્મક સામગ્રી પહેરો.
3. છંટકાવ સમયે ખાવાનું, ચાવવું કે ધૂમ્રપાન ન કરવું.

ઝેરના લક્ષણો:

આંખમાં હળવી બળતરા થવી, ત્વચા પર બળતરા થવી, મુંજારો આવવો, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, નાકમાંથી પાણી પડવું, અને ઝાડા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર:

નુકશાન થયેલ ભાગોને સરખી રીતે સાબુથી અને પાણીથી ધોવા. જો દવા આંખોમાં ગયેલ હોય તો સરખી રીતે સ્વચ્છ પાણીથી ધોઇ લો.

આડઅસર :

ઉપર જણાવ્યા મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ પ્રોડક્ટની ઉપરોક્ત જણાવેલ પાકમાં કોઇપણ આડઅસર થતી નથી.

વિષમારણ:

લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરવી . જો ગળી જાય પેટ ને સાફ કરવા માટે ઉલટી કરાવો અને ડોકટરને બોલાવો.

વપરાયેલ ડબ્બા નો નિકાલ:

1. પુનઃઉપયોગ અટકાવવા માટે ડબ્બાને ગમે ત્યાં ના ફેંકો.
2. ખાલી ડબ્બાનો નાશ કરો અને તેમને રહેઠાણ અને ભૂગર્ભ જળ સ્ત્રોતથી દૂર બિન ઉપજાવ જમીનમાં જમીનના સ્તરથી 18" નો ખાડો કરીને દાટી દો.
3.ખાલી ડબ્બા, વધારાની દવા કે છંટકાવ બાદ સાફ કરેલ સાધનોમાંથી નીકળેલ પાણી વગેરેનો એવી રીતે સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરો કે તેનાથી પર્યાવરણ અથવા પાણી પ્રદૂષિત ન થાય અથવા પ્રાણીઓનો ચારો ઝેરી ન બને.
4. ખાદ્યપદાર્થો અથવા પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે ક્યારેય ખાલી ડબ્બાનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

સંગ્રહ ની શરતો

ખુલ્લી હવા અને ગરમીથી દૂર, ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ સ્ટોર કરો. પ્રોડક્ટ સંગ્રહિત કરવા માટે નો રૂમ યોગ્ય હવાની અવરજવર યુક્ત અને યોગ્ય લંબાઇ નો હોવો જોઇએ. દવા ને ખાદ્ય પદાર્થ તથા બાળકો થી દૂર રાખો.

રાસાયણિક તત્વ:

લીમડાનું તેલ 30.00 % w/w,

બ્યુટીલ એસીટેટ (સોલવન્ટ) 23.00 % w/w,

એઝાડિરાક્ટીન (a.i.) 1.00 % w/w min.

બ્યુટેનોલ (સોલવન્ટ) 31.00 % w/w,

ઇમલ્સિફાયર 15.00 % w/w,

ટોટલ 100 % w/w.

నీమ్లీ

అజాడిరాక్టిన్- 1% (10000 ppm)

(పురుగుల మందు)

ఈ ఉత్పత్తి అజాడిరాక్టిన్ నుండి తీసుకోబడిన వేప గింజల కెర్నల్‌పై ఆధారపడిన బొటానికల్ పురుగుమందు. ఇది ఒక కిలోగ్రాము పదార్థానికి (w/w) కనీసం 10 గ్రాముల అజాడిరాక్టిన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది టొమాటోలో పండు తొలుచు పురుగు మరియు వంకాయలో పండు మరియు రెమ్మల తొలుచు పురుగు నియంత్రణలో ఉపయోగపడే పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తి. సిఫార్సు

పంటలు

పికే	తెగులు యొక్క సాధారణ పేరు	మోతాదు/HA		నీరు/ హెక్టారు (లీటర్)లో పలుచన	చివరి స్ప్రే నుండి కోత రోజు వరకు వేచి ఉండే కాలం	ప్రతి అప్లికేషన్ తర్వాత (గంటల్లో) పునఃప్రవేశం
		AI	ఫార్ములేషన్ లీటర్			
వంకాయ	పండు మరియు రెమ్మల తొలుచు పురుగు (ల్యూసినోడ్స్ ఆర్బోనాలిస్)	1	1.5	500	3	
	పండు మరియు రెమ్మల తొలుచు పురుగు (ల్యూసినోడ్స్ ఆర్బోనాలిస్)	1	1.5	500	3	
టొమాటో	పండు తొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిగెరా)	1	1.5	500	3	
	పండు తొలుచు పురుగు (హెలికోవర్పా ఆర్మిగెరా)	1	1.5	500	3	

ఉపయోగం యొక్క దిశ

అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ ద్వారా సిఫార్సు చేయబడిన విధంగా ఉపయోగించినప్పుడు, ఈ ఉత్పత్తి తెగుళ్లను సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది. కొన్ని నీటిలో ఉత్పత్తి యొక్క అవసరమైన పరిమాణంలో తీసుకోండి మరియు బాగా కదిలించు. అవసరమైన పరిమాణంలో నీరు వేసి బాగా కలపాలి. అవసరమైన పరిమాణంలో నీటిని జోడించి, స్ప్రే ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉండేలా బాగా కదిలించండి. పి.పి. సామగ్రి:- నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ సిఫార్సు చేయబడిన ఒక బోలు కోన్ నాజిల్‌తో అమర్చబడింది.

దరఖాస్తు సమయం

ముందుజాగ్రత్తలు

1. చర్మంతో పదార్థం యొక్క సంబంధాన్ని నివారించండి.
2. స్ప్రే చేసేటప్పుడు ఆప్రాన్, హుడ్, బూట్లు మరియు చేతి తొడుగులు వంటి రక్షణ పదార్థాలను ధరించండి.
3. స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు తినకూడదు, నమలకూడదు లేదా పొగ త్రాగకూడదు.

విషం యొక్క లక్షణాలు

కంటి శ్లేష్మ పొరకు తేలికపాటి చికాకు, చర్మం చికాకు సంభవించవచ్చు. తగ్గిన మోటారు కార్యకలాపాలు, నిస్సార శ్వాసక్రియ, నాసికా ఉత్సర్గ ఫోటో ప్రతిచర్య మరియు అతిసారం ప్రయోగశాల జంతువులలో సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స

కలుషితమైన భాగాలను పుష్కలంగా సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. కళ్ళు కలుషితమైతే, పుష్కలంగా నీటితో కడగాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ

పైన పేర్కొన్న విధంగా ఉపయోగించినప్పుడు, ఈ ఉత్పత్తి పైన పేర్కొన్న పంటలకు ఎటువంటి ఫైటోటాక్సిసిటీని కలిగించదు.

విరుగుడు

రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి. మింగితే గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ ఇవ్వండి. వైద్యుడిని పిలవండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ పారవేయడం

1. పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి కంటైనర్‌లను బయట ఉంచవద్దు.
2. ఖాళీ పాత్రలను ధ్వంసం చేసి, వాటిని భూమి మట్టం కంటే 18" దిగువన ఆవాసాలు మరియు భూగర్భ జల వనరులకు దూరంగా పంటలు కాని భూమిలో పాతిపెట్టండి.
3. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యం, ఆహారం మరియు పశుగ్రాసం కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి స్ప్రే పరికరాల నుండి ఖాళీ కంటైనర్లు, మిగులు పదార్థాలు మరియు వాషింగ్‌లను సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయండి.
4. ఆహారం లేదా నీటిని నిల్వ చేయడానికి ఖాళీ కంటైనర్‌లను ఎప్పుడూ ఉపయోగించవద్దు.

నిల్వ పరిస్థితులు

వేడి మరియు బహిరంగ మంట నుండి దూరంగా చల్లని మరియు పొడి ప్రదేశంలో నిల్వ చేయండి. పదార్థాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గది బాగా నిర్మించబడాలి, బాగా వెంటిలేషన్, బాగా గాలి మరియు తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండాలి. తాళం మరియు కీ కింద అల్మిరాలలో ఆహారం మరియు ఫీడ్ మెటీరియల్‌లకు దూరంగా, ప్రత్యేక గదులలో మెటీరియల్‌ను నిల్వ చేయండి.

రసాయన కూర్పు

వేప నూనె 30.00 % w/w

బ్యూటైల్ అసిటేట్ (ద్రావకం) 23.00 % w/w

అజాడిరాక్టిన్ (a.i.) 1.00 % w/w నిమి.

N. బ్యూటానాల్ (ద్రావకం) 31.00 % w/w

ఎమల్సిఫైయర్ 15.00 % w/w

మొత్తం 100 % w/w

ನೀಮ್ಲಿ

ಅಜಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್- 1% (10000 ppm)

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಅಜಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ ನಿಂದ ಪಡೆದ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಜಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (w/w). ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಬದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆಗಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ / HA		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ / ಹೆ	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯುವ	ಅವಧಿ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂತರ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
		AI	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಲೀಟರ್			
ಬದನೆ ಹಣ್ಣು	ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಲ್ಯೂಸಿನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಬೋನಾಲಿಸ್)	1	1.5	500	3	
	ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಲ್ಯೂಸಿನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಬೋನಾಲಿಸ್)	1	1.5	500	3	
ಟೊಮೆಟೊ	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೇರಾ)	1	1.5	500	3	
	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೇರಾ)	1	1.5	500	3	

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಲಕ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಪ.ಪಂ. ಸಲಕರಣೆ:- ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಪ್‌ಕ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

1. ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
2. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಏಪ್ರನ್, ಹುಡ್, ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಅಗಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕಣ್ಣಿನ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೋಟಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಟ, ಮೂಗಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೇಲಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರತಿವಿಷ

ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನುಂಗಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಲೇವಾರಿ

1. ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
2. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 18" ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಹೂತುಹಾಕಿ.
3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ.
4. ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 30.00 % w/w

ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ (ದ್ರಾವಕ) 23.00 % w/w

ಅಜಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ (a.i.) 1.00 % w/w ನಿಮಿಷ.

N. ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್ (ದ್ರಾವಕ) 31.00 % w/w

ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ 15.00 % w/w

ಒಟ್ಟು 100 % w/w

نیملی

Azadirachtin 1% (10000 ppm) - نیم کیڑے مار دوا

یہ پروڈکٹ ایک نباتاتی کیڑے مار دوا ہے جس کی بنیاد نیم کے بیج کی دانی پر ہے
سے حاصل کی گئی ہے۔ Azadirachtin جو
(w/w) فی کیلوگرام مواد Azadirachtin اس میں کم از کم 10 گرام
ہوتا ہے۔ یہ ماحول دوست پروڈکٹ ہے، جو ٹماٹر اور بیگن میں پھل اور شوٹ بورر کے کنٹرول کے لیے مفید ہے۔

سفارشات

فصلیں	کیڑوں کا عام نام	خوراک (لیٹر/ہیکٹر)		پانی (لیٹر/ہیکٹر)	آخری سپرے سے کٹائی کے درمیان وقفہ (دن)	درخواست کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
		ترکیب لیٹر (فارمولا)	AI			
بیگن	پھل اور شوٹ بورر (Leucinodes orbonalis)	1	1.5	500	3	
	پھل اور شوٹ بورر (Leucinodes orbonalis)	1	1.5	500	3	
ٹماٹر	پھل بورر (Helicoverpa armigera)	1	1.5	500	3	
	پھل بورر (Helicoverpa armigera)	1	1.5	500	3	

استعمال کی ہدایات

یہ پروڈکٹ کیڑوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے جب اسے سفارش کردہ مقدار میں استعمال کیا جائے۔ مطلوبہ مقدار کو پانی میں مکس کریں اور اچھی طرح ہلائیں۔ پھر اسپرے کے لیے استعمال کریں۔ ایک کھوکھلی مخروطی نوزل والے نیپ سیک اسپریئر کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔

درخواست کا وقت

پھل اور شوٹ بورر اور فروٹ بورر کی پہلی نشانی پر سپرے کریں۔ مزید حملے کے دوران ہر 10 سے 12 دن میں اسپرے دہرائیں۔

احتیاطی تدابیر

جلد کے ساتھ براہ راست رابطے سے بچیں۔

سپرے کرتے وقت حفاظتی سامان جیسے تہبند، ہڈ، جوتے اور دستانے پہنیں۔

سپرے کرتے وقت نہ کھائیں، چبائیں یا سگریٹ نوشی نہ کریں

زہر کی علامات

آنکھ کی جھلیوں میں ہلکی جلن، جلد کی جلن ہو سکتی ہے۔ لیبارٹری کے جانوروں میں کم موٹر سرگرمی، اتلی سانس، ناک سے اخراج اور اسہال دیکھا جا سکتا ہے۔

ابتدائی طبی امداد

آلودہ حصوں کو کافی صابن اور پانی سے دھوئیں۔ اگر آنکھیں متاثر ہوں تو انہیں وافر پانی سے دھوئیں۔

فائیٹوٹوکسیٹی

سفارش کردہ طریقے کے مطابق استعمال کرنے پر یہ پروڈکٹ فصلوں میں فائیٹوٹوکسیٹی کا باعث نہیں بنتی۔

تریاق

علامتی علاج کریں۔ اگر دوا نگل لی جائے تو گیسٹرک لیویج کریں اور معالج سے رجوع کریں۔

استعمال شدہ کنٹینر کی تلفی

کنٹینرز کو دوبارہ استعمال سے روکنے کے لیے خالی کنٹینرز کو ضائع کریں۔

خالی کنٹینرز کو رہائشی علاقوں اور پانی کے ذرائع سے دور دفن کریں۔

اضافی مواد اور دھلائی کے پانی کو ماحول دوست طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔

خالی کنٹینرز کو کھانے یا پانی کے لیے استعمال نہ کریں

ذخیرہ کرنے کے حالات

اسے ٹھنڈی اور خشک جگہ پر، گرمی اور کھلی آگ سے دور رکھیں۔ مواد کو ایک محفوظ اور اچھی طرح ہوادار جگہ میں ذخیرہ کریں۔ کھانے کی اشیاء سے دور رکھیں۔

کیمیائی ترکیب

نیم کا تیل: 30.00 % w/w

بوٹیل ایسیٹیٹ (سالوینٹ): 23.00 % w/w

Azadirachtin (a.i.): 1.00 % w/w منٹ

N. Butanol (سالوینٹ): 31.00 % w/w

ایملسیفائر: 15.00 % w/w

کل: 100 % w/w