AgroStar®

OMNISTAR™

Bispyribac sodium 10% w/v SC
(Systemic Herbicide)

ओमनिस्टार

बिस्पाइरिबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस. सी.
(अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Bispyribac sodium 10% w/v SC
(Systemic Herbicide)

Bispyribac sodium 10% SC is a post emergence herbicides effective against grasses, sedges and broad leaf weeds of rice crop

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dosage/HA Dilution in Water (Lit)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice (Direct seeded)		20–25	200–250	300		
Rice (Nursery)	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Ischaemum rugosum, Cyperus difformis, cyperus iria Fimbristylis miliacca , Eclipta alba , Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, ,Alternanthera philoxeroides , Sphenoclcea zeylenica	20	200	300	waiting period has been redundant as period between spray and harvest has been >78 days	
Rice (Transplanted)		20–25	200–250	300		

Direction for use:
Shake the bottle before use. Measure out requisite quantity of the herbicides and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water specified with thorough agitation Application method: Prior to herbicides application the field should be drained. Field should be re-flooded within one day after application and water should be maintained at least for 10 days post application. Spraying Instruction: Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

Time of Application
Nursery/ Transplanted :The optimum time of the application is 10-12 days after sowing for nursery rice and 10-14 days after planting for transplanted Rice when the most of the weeds have already emerged and are of 3-4 leaf stage depending upon soil and climatic factors. Direct Seed Rice: for direct seed rice the time of application is 15-25 days after sowing. Plant Protection Equipment: High volune sprayer viz., Knapsack sprayer fitted with flat fan flood jet nozzle is recommended.

Precautions
1. Keep away from food and feedstuff.
2. Avoid contact with eyes and skin.
3. Avoid inhalation of the spray mist.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5.Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying.

Symptoms Of Poisoning
Weakness, vomiting, salivation and diarrhea.

First Aid
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes.
4. If, inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, clear the airway and give artificial respiration. Get a medical attention immediately.

Phytotoxicity: Refers to CIB guidelines

Antidote
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. The package shall be broken and buried away from habitation.
2. The used package shall not be left out side to prevent their re-used.
3. The package or surplus material and washing should be disposed of in safe manner so as prevent environmental or drinking water pollution.

Storage Conditions
1. The package containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicides should be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination by vapour.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Weight
1	Bispyribac sodium (a.i.)	10.00 % w/v
2	Adjuvant-A (Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol)	31.90 % w/v
3	Adjuvant-B (Polyoxyethylene polyoxy propylene synthetic alcohol ether)	53.20 % w/v
4	Propylene glycol	2.00 % w/v
5	Aluminium Oxide C	1.50 % w/v
6	Silicon KS-506	1.00 % w/v
7	Stabilizer	1.00 % w/v
8	Water	Q.S. % w/v
	Total	100.00 % w/v

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

बिस्पाइरिबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस. सी.
(अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक)

बिस्पाइरिबैक सोडियम 10% एस.सी. धान फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार की घास, सेज़ेज व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण करता है। इसका प्रयोग खरपतवार उगने के बाद किया जाता है।

उपयोग

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान (सीधी बुवाई)		20–25	200–250	300		—
धान (नर्सरी)	सांवा, जगंली धान, ईशचोमम रुगोसम, मारफुला, छतरी वाला मौथा, फिबीस्टाइलिस, भंगड़ा, महानली, मोनोकोरिया, अल्टरनन्थै न्थेरा, स्माय	20	200	300	प्रतीक्षा अवधि आवश्यक नही है क्योकि छिड़काव एंव कटाई के बीच की अवधि अधिक >78 दिन है।	—
धान (रोपित)		20–25	200–250	300		—

उपयोग केलिए दिशा-निर्देश
उपयोग के निर्देश: इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलायें। उत्पाद की वंछित मात्रा को थोडे से पानी के साथ घोल तैयार कर लें। इसके बाद यह घोल शेष पानी में डालकर मिलायें। उपयोग विधि खरपतवारनाशक के उपयोग से पहले वंछित क्षेत्र से पानी निकाल दें। उपचार के एक दिन बाद खेत को पुन: पानी से भर दे वा 10 दिन तक पानी को उपचारित क्षेत्र में बनायें रखें।

प्रयोग का समय
छिडकाव का समय: पौध शाला/रोपित धान के लिए- उचित समय है अधिकतर खपतवार उगने के पश्चात अर्थातर्था नर्सरी र्स धान के लिए 10-12 दिन बुआई के पश्चात एंव रोपित धान के लिए 10-14 दिन रोपाई के पश्चात अवस्था में उपयोग करें। यह समय मिट्टी एंव वातावरणिय परिस्थितियो के अनरुु प भिन्न हो सकती है। सीधी बीजाई धान के लिए: छिड़काव का उचित समय बुआई के 15-25 दिन पश्चात है। छिडकाव यंत्र हाई वॉल्यूमल्यू स्प्रेयर जिसपर फ्लेट फॅन या फ्लड जेट नोजल लगे हुए यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ता ओं के लिए सावधानियां
(1) खाद्य सामग्री और पशुओं के चारे से दूर रखें।
(2) त्वचा और आँखो को सम्पर्क से बचाये।
(3) छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये।
(4) छिडकाव के बाद दषिू त कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
(5) छिड़काव के दौरान धुम्रपान, खाना व तम्बाकु इत्यादि का सेवन न करें।

विष के लक्षण
कमजोरी, उल्टी, मुँह से लार आना व अतिसार।

प्राथमिक चिकित्सा
(1) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यर्थदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करायें।
(2) यदि कपडे और त्वचा दषिू त हो जाए तो दषिू त कपडों को उतार दे दषिूत त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
(3) यदि आँखे दषिू त हो जाये तो उनको काफी मात्रा में साफ पानी में लगभग 10-15 मिनट तक धोएं।
(4) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता: सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें|

विष नाशक
कोई विशिष्ठ विषनिवारक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
(1) खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड कर आबादी से दूर जमीन में गाढ दें।
(2) उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़ें।
(3) बची हुई खरपतवारनाशक, साधनो के धोवन का योग्य रीति से निपटारा करना चाहिए जिससे पीने का पानी तथा वातावरण दषिूत होने का डर न रहे।

संग्रहण की शर्ते
(1) खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरें अथवा जगह खाद्द पदार्थ रखें जाने वाले कमरें अथवा जगह से अलग अलमारीय़ो में ताला चाबी के अन्दर रखना चाहिए।
(2) जिस कमरे अथवा जगह में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी बना हुआ, सूखा हवादार तथा प्रकाश युकयु व काफी लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप से वातावरण दषिूत नही हो।

रासायनिक संरचना

क्रम संख्या	घटक	वजन
1	बिसपाइरीबैक सोडियम (स.त.)	10.00 % भा/आ
2	एडजुवेंट-ए (पोलिअल्कलीन आक्साईड सिंथेटिक एल्कोहल का डेरिवेटिव	31.90 % भा/आ
3	एडजुवेंट-बी (पोलीआक्सीथिलिन पोलिआक्सि प्रोप्लिन सिंथेटिक एल्कोहल ईथर)	53.20 % भा/आ
4	प्रोपाइलीन ग्लायकोल	2.00 % भा/आ
5	एल्यूमिनियम ऑक्साईड सी	1.50 % भा/आ
6	सिलिकान केएस -506	1.00 % भा/आ
7	स्टेबिलाइजर	1.00 % भा/आ
8	पानी	पर्याप्तर्या मात्रा % भा/आ
	कुल	100.00% भा/आ

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

बिसपायरीबॅक सोडियम 10% w/v एस.सी.
(प्रणालीगत तणनाशक)

बिसपायरीबॅक सोडियम 10% एस.सी. हे भात पिकातील गवत, सेज व रुंद पानांच्या तणांवर प्रभावी असलेले उगवणीनंतर वापरण्याचे तणनाशक आहे.

शिफारस

फसल	खरपतवारांचे सामान्य नाव	प्रति हॅक्टेयर मात्रा सक्रिय घटक (ग्रॅम)	प्रति हॅक्टेयर मात्रा संरचना (मि.ली.)	पाण्यात मिसळण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी ते कापणी कालावधी (दिवस)	फवारणीनंतर पुन्हा प्रवेश (तास)
भात (थेट पेरणी)		20–25	200–250	300		—
भात (नर्सरी)	सांव गवत (इचिनोक्लोआ क्रसगॅली), लहान सांव (इचिनोक्लोआ कोलोना), खरबरीत गवत (इशेमम रुजोसुम), मोथा (सायपेरस डिफॉर्मिस), मोथा (सायपेरस इरिया), तुंबी (फिम्ब्रिस्टायलिस मिलिएशिया), भृंगराज (एक्लिप्टा आल्बा), पाणतण (लुडविगिया पार्विफ्लोरा), जलकमळ (मोनोकोरिया व्हॅजिनॅलिस), घोडाटेक (अल्टरनँथेरा फिलॉक्सेरॉइड्स), जलतण (स्फेनोक्लिया झायलॅनिका)	20	200	300	फवारणी व कापणीतील कालावधी 78 दिवसांपेक्षा जास्त असल्यामुळे प्रतीक्षा कालावधी आवश्यक नाही	—
भात (लावणी)		20–25	200–250	300		—

वापरासाठी सूचना
वापरण्यापूर्वी बाटली चांगली हलवा. तणनाशकाची आवश्यक मात्रा मोजून थोड्या पाण्यात नीट मिसळा. दिलेल्या प्रमाणात उरलेले पाणी घालून चांगले ढवळा. वापरण्याची पद्धत: तणनाशक वापरण्यापूर्वी शेतातील पाणी काढून टाका. वापरानंतर एका दिवसात शेतात पुन्हा पाणी सोडा व किमान 10 दिवस पाणी ठेवावे. फवारणी सूचना: वाऱ्याच्या दिशेने समान रीतीने फवारणी करा. तणांवर पूर्ण कव्हरेज मिळेल याची खात्री करा.

वापरण्याची वेळ
नर्सरी/लागवड: नर्सरी भातासाठी पेरणीनंतर 10-12 दिवसांनी आणि लागवड भातासाठी लागवडीनंतर 10-14 दिवसांनी वापर करावा, जेव्हा बहुतेक तण 3-4 पानांच्या अवस्थेत असतात.
थेट पेरणी भात: पेरणीनंतर 15-25 दिवसांनी वापर करावा.
वनस्पती संरक्षण उपकरण: फ्लॅट फॅन फ्लड जेट नॉझल असलेला नॅपसॅक स्प्रेयर वापरण्याची शिफारस आहे.

सावधगिरी
1. अन्न व जनावरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा.
2. डोळे व त्वचेशी संपर्क टाळा.
3. फवारणीची धुके श्वासात जाणे टाळा.
4. फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे भाग नीट धुवा.
5. फवारणीदरम्यान धूम्रपान, खाणे, पिणे किंवा चघळणे करू नका.

विषबाधेची लक्षणे
अशक्तपणा, उलटी, जास्त लाळ येणे व अतिसार.

प्राथमिक उपचार
1. गिळल्यास घशाच्या मागे चाळवून उलटी करावी. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करू नये.
2. कपडे किंवा त्वचा दूषित असल्यास कपडे काढून साबण व भरपूर पाण्याने धुवा.
3. डोळ्यांत गेल्यास 10-15 मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा.
4. श्वासातून गेल्यास रुग्णाला ताज्या हवेत न्या. श्वास नसेल तर कृत्रिम श्वसन द्या व तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्या.

फायटो टॉक्सिसिटी
CIB मार्गदर्शक सूचनांनुसार.

प्रतिविष
कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांचा निपटारा
1. डबे फोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाका.
2. वापरलेले डबे पुन्हा वापर होऊ नयेत म्हणून बाहेर ठेवू नका.
3. डबे, उरलेले द्रव्य व धुण्याचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करा.

साठवण अटी
1. तणनाशकाचे डबे अन्नसाठ्यापासून दूर, वेगळ्या खोलीत किंवा कुलूपबंद कपाटात ठेवा.
2. साठवण कक्ष मजबूत, कोरडे, प्रकाशमान व हवेशीर असावेत.

रासायनिक संघटन

अनु. क्र.	घटक	वजन
1	बिसपायरीबॅक सोडियम (ए.आय.)	10.00 % व/आ
2	सहाय्यक-A (कृत्रिम अल्कोहोलचे पॉलीअल्किलीन ऑक्साइड व्युत्पन्न)	31.90 % व/आ
3	सहाय्यक-B (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सी प्रोपिलीन कृत्रिम अल्कोहोल ईथर)	53.20 % व/आ
4	प्रोपिलीन ग्लायकोल	2.00 % व/आ
5	ॲल्युमिनियम ऑक्साइड C	1.50 % व/आ
6	सिलिकॉन KS-506	1.00 % व/आ
7	स्थिरीकारक	1.00 % व/आ
8	पाणी	आवश्यकतेनुसार
	एकूण	100.00 % व/आ

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

બિસપાયરીબેક સોડિયમ 10% w/v એસ.સી.
(સિસ્ટેમિક નિંદામણનાશક)

બિસપાયરીબેક સોડિયમ 10% એસ.સી. ધાન પાકમાં ઉગતા ઘાસ, સેજ તથા પહોળા પાનવાળા નિંદામણ સામે અસરકારક, ઉગ્યા પછી વપરાતું નિંદામણનાશક છે.

ભલામણ

પાક	નિંદામણનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટેયર માત્રા સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટેયર માત્રા સંયોજન (મિ.લી.)	પાણીમાં ભેળવવાનું પ્રમાણ (લિ.)	છેલ્લાં છંટકાવથી કાપણી સુધીનો સમય (દિવસ)	છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ (કલાક)
ધાન (સીધી વાવણી)		20–25	200–250	300		—
ધાન (નર્સરી)	સાંવ ઘાસ (ઇચિનોક્લોઆ ક્રુસગલ્લી), નાનું સાંવ (ઇચિનોક્લોઆ કોલોના), ખડબડિયું ઘાસ (ઇશેમમ રૂગોસમ), મોથો (સાયપેરસ ડિફોર્મિસ), મોથો (સાયપેરસ ઇરિયા), તુબી (ફિમ્બ્રિસ્ટાઇલિસ મિલિયેસિયા), ભૃંગરાજ (એક્લિપ્ટા આલ્બા), જળ નિંદામણ (લુડવિગ્યિા પાર્વિફ્લોરા), જળકમળ (મોનોકોરિયા વેજિનાલિસ), ઘોડાટેખ (અલ્ટરનેન્થેરા ફિલોક્સેરોઇડ્સ), જળતણ (સ્ફેનોક્લિયા ઝાયલેનીકા)	20	200	300	છંટકાવ અને કાપણી વચ્ચેનો સમય 78 દિવસથી વધુ હોવાથી પ્રતીક્ષા સમય જરૂરી નથી	—
ધાન (રોપણી)		20–25	200–250	300		—

ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ
ઉપયોગ પહેલાં બોટલને સારી રીતે હલાવો. નિર્ધારિત માત્રામાં નિંદામણનાશક માપી થોડા પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરો. પછી નિર્ધારિત બાકીની માત્રામાં પાણી ઉમેરી સારી રીતે હલાવો.
ઉપયોગ પદ્ધતિ: નિંદામણનાશકના ઉપયોગ પહેલાં ખેતરમાંથી પાણી કાઢી નાખો. ઉપયોગ પછી એક દિવસની અંદર ખેતરમાં ફરી પાણી ભરો અને ઉપયોગ પછી ઓછામાં ઓછા 10 દિવસ સુધી પાણી જાળવો.
છંટકાવ સૂચનાઓ: પવનની દિશામાં સમાન રીતે છંટકાવ કરો. નિંદામણ પર સંપૂર્ણ આવરણ સુનિશ્ચિત કરો.

ઉપયોગનો સમય
નર્સરી / રોપાણ: નર્સરી ધાન માટે વાવણી પછી 10-12 દિવસ અને રોપાણ કરેલા ધાન માટે રોપાણ પછી 10-14 દિવસ શ્રેષ્ઠ સમય છે, જ્યારે મોટાભાગના નિંદામણ ઉગી ચૂક્યા હોય અને 3-4 પાંદડાની અવસ્થામાં હોય, જે જમીન અને હવામાન પર આધાર રાખે છે.
સીધી વાવણી કરેલ ધાન: સીધી વાવણી કરેલા ધાન માટે વાવણી પછી 15-25 દિવસનો સમય યોગ્ય છે.
વનસ્પતિ સુરક્ષા સાધનો: ફ્લેટ ફેન ફ્લડ જેટ નોઝલ લગાવેલ નેપસેક સ્પ્રેયર જેવા ઉચ્ચ આયતન સ્પ્રેયર વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

સાવચેતી
1. ખોરાક અને પશુ આહારથી દૂર રાખો.
2. આંખો અને ચામડી સાથે સંપર્ક ટાળો.
3. છંટકાવની ધુમ્મસ શ્વાસમાં ન જાય તે માટે કાળજી લો.
4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો.
5. છંટકાવ દરમિયાન ધુમ્રપાન, ખાવું, પીવું કે ચાવવું નહીં.

વિષબાધાના લક્ષણો
નબળાઈ, ઉલટી, વધુ લાળ આવવી અને દસ્ત.

પ્રાથમિક સારવાર
1.જો ગળી જાય, તો ગળાના પાછળના ભાગની માલિશ કરીને ઉલટી કરાવો. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઉલટી કરાવશો નહીં.
2. કપડાં અથવા ચામડી દૂષિત હોય તો કપડાં ઉતારી સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી ચામડી ધોઈ લો.
3. આંખોમાં પડ્યું હોય તો 10 થી 15 મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો.
4. શ્વાસ દ્વારા ગયા હોય તો દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ. શ્વાસ ન આવતો હોય તો શ્વાસ માર્ગ સાફ કરી કૃત્રિમ શ્વસન આપો અને તરત તબીબી મદદ લો.

ફાઇટોટોક્સિસિટી
CIB માર્ગદર્શિકાઓ અનુસાર.

પ્રતિઉપચાર (એન્ટિડોટ)
કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિઉપચાર ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણ મુજબ સારવાર કરો.

વપરાયેલા ડબ્બાનો નિકાલ
1. પેકેટને તોડી વસતિથી દૂર જમીનમાં દફન કરો.
2 વપરાયેલ પેકેટને ફરી ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તે માટે બહાર ન છોડો.
3. પેકેટ, બાકી રહેલ દ્રવ્ય અને ધોવાણનું પાણી પર્યાવરણ અથવા પીવાના પાણીના પ્રદૂષણથી બચાવવા સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરો.

સંગ્રહની શરતો
1. નિંદામણનાશક ધરાવતા પેકેટને ખોરાક સામગ્રીથી દૂર, અલગ રૂમમાં અથવા તાળા-ચાવીવાળી અલમારીમાં રાખો.
2. સંગ્રહ માટેના રૂમ મજબૂત, સૂકા, સારી રોશની અને હવામાન ધરાવતા તથા પૂરતા કદના હોવા જોઈએ જેથી વાષ્પથી પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વજન
1	બિસપાયરિબેક સોડિયમ (એ.આઇ.)	10.00 % વ/આ
2	સહાયક-A (કૃત્રિમ આલ્કોહોલનું પોલીઆલ્કાઇલિન ઑક્સાઇડ ડેરિવેટિવ)	31.90 % વ/આ
3	સહાયક-B (પોલીઑક્સીઇથિલિન પોલીઑક્સી પ્રોપિલિન કૃત્રિમ આલ્કોહોલ ઇથર)	53.20 % વ/આ
4	પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ	2.00 % વ/આ
5	એલ્યુમિનિયમ ઑક્સાઇડ C	1.50 % વ/આ
6	સિલિકોન KS-506	1.00 % વ/આ
7	સ્થિરકારક	1.00 % વ/આ
8	પાણી	જરૂરી મુજબ
	કુલ	100.00 % વ/આ

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਬਿਸਪਾਇਰਿਬੈਕ ਸੋਡਿਯਮ 10% w/v ਐੱਸ.ਸੀ.
(ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ)

ਬਿਸਪਾਇਰਿਬੈਕ ਸੋਡਿਯਮ 10% ਐੱਸ.ਸੀ. ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਹਾਂ, ਸੈਜ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰਪਤਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਪਤਵਾਰਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ (ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ ਗ੍ਰਾਮ)	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨ)
ਧਾਨ (ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ)		20–25	200–250	300	
ਧਾਨ (ਰੋਪਾਈ)	ਸਾਂਵ ਘਾਹ (ਇਚੀਨੋਕਲੋਆ ਕਰੁਸਗੈਲੀ), ਛੋਟਾ ਸਾਂਵ (ਇਚੀਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ), ਖੁਰਦਰਾ ਘਾਹ (ਇਸ਼ੀਐਮਮ ਰੁਗੋਸਮ), ਮੋਥਾ (ਸਾਈਪੇਰਸ ਡਿਫਾਰਮਿਸ), ਮੋਥਾ (ਸਾਈਪੇਰਸ ਇਰੀਆ), ਤੁੰਬੀ (ਫਿੰਬਰਿਸਟਾਈਲਿਸ ਮਿਲੀਏਸੀਆ), ਭ੍ਰਿੰਗਰਾਜ (ਇਕਲਿਪਟਾ ਆਲਬਾ), ਜਲ ਖਰਪਤਵਾਰ (ਲੁਡਵਿਗੀਆ ਪਾਰਵਿਫ਼ਲੋਰਾ), ਜਲਕਮਲ (ਮੋਨੋਕੋਰਿਆ ਵੈਜਿਨਾਲਿਸ), ਘੋੜਾਟੇਕ (ਆਲਟਰਨੈਂਥੇਰਾ ਫਿਲੋਕਸਰੋਇਡਸ), ਜਲ ਤਣ (ਸਫੀਨੋਕਲੀਆ ਜ਼ੈਲੈਨਿਕਾ)	20	200	300	ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ 78 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਧਾਨ (ਰੋਪਿਤ)		20–25	200–250	300	

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲੋ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ: ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।
ਛਿੜਕਾਅ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਰਸਰੀ / ਰੋਪਾਈ ਧਾਨ: ਨਰਸਰੀ ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 10–12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰੋਪਾਈ ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ 10–14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਨ 3–4 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੋਣ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਧਾਨ: ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15–25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ।

ਪੌਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ
ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਜੈੱਟ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਵੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਲਟੀ, ਵੱਧ ਲਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
1. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਜਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
2. ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
3. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ 10–15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
4. ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ। ਸਾਹ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਵੋ।

ਐਂਟੀਡੋਟ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਡੋਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਟਕਰਨ
1. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।
2. ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3. ਡੱਬਾ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
2. ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ.ਨੰ.	ਘਟਕ	ਭਾਰ
1	ਬਿਸਪੀਰੀਬੈਕ ਸੋਡੀਅਮ (ਏ.ਆਈ.)	10.00 % w/v
2	ਸਹਾਇਕ-ਏ (ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੌਲੀਅਲਕਾਈਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ)	31.90 % w/v
3	ਸਹਾਇਕ-ਬੀ (ਪੌਲੀਓਕਸੀਥਾਈਲੀਨ ਪੋਲੀਓਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਈਥਰ)	53.20 % w/v
4	ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	2.00 % w/v
5	ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ C	1.50 % w/v
6	ਸਿਲੀਕਾਨ ਕੇਐਸ-506	1.00 % w/v
7	ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ	1.00 % w/v
8	ਪਾਣੀ	Q.S. % w/v
	ਕੁੱਲ	100.00 % w/v

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম 10% w/v এস.সি.
(সিস্টেমিক আগাছানাশক)

বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম 10% এস.সি. ধান ফসলে জন্মানো ঘাস, সেজ ও প্রশস্ত পাতার আগাছার বিরুদ্ধে কার্যকর একটি উদ্গমোত্তর আগাছানাশক।

সুপারিশ

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টেয়ার পরিমাণ সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	সংযোজন (মি.লি.)	পানিতে মেশানোর পরিমাণ (লি.)	শেষ স্প্রে থেকে কাটাই পর্যন্ত সময় (দিন)	স্প্রের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘন্টা)
ধান (সরাসরি বপন)		20–25	200–250	300		—
ধান (নার্সারি)	শ্যামা ঘাস (ইচিনোক্লোয়া ক্রুসগ্যালি), ছোট শ্যামা (ইচিনোক্লোয়া কোলোনা), খসখসে ঘাস (ইসকিয়ামাম রুগোসাম), মোথা (সাইপেরাস ডিফর্মিস), মোথা (সাইপেরাস ইরিয়া), তুঁবি (ফিমব্রিস্টাইলিস মিলিয়াসিয়া), ভৃঙ্গরাজ (এক্লিপ্টা আলবা), জল আগাছা (লুডভিজিয়া পারভিফ্লোরা), জলকমল (মনোকোরিয়া ভ্যাজিনালিস), ঘোড়াটেক (অল্টারন্যানথেরা ফিলোক্সেরয়েডস), জলতৃণ (স্ফেনোক্লিয়া জাইলেনিকা)	20	200	300	স্প্রে ও কাটাইয়ের মধ্যে সময় 78 দিনের বেশি হওয়ায় অপেক্ষাকাল প্রযোজ্য নয়	—
ধান (রোপণ)		20–25	200–250	300		—

ব্যবহারের নির্দেশাবলী
ব্যবহারের আগে বোতলটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ আগাছানাশক মেপে অল্প পরিমাণ পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর নির্ধারিত বাকি পরিমাণ পানি যোগ করে ভালোভাবে নাড়ুন।
প্রয়োগ পদ্ধতি: আগাছানাশক প্রয়োগের আগে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। প্রয়োগের এক দিনের মধ্যে জমিতে পুনরায় পানি দিতে হবে এবং প্রয়োগের পর অন্তত ১০ দিন পর্যন্ত পানি বজায় রাখতে হবে।
ছিটানোর নির্দেশনা: বাতাসের দিক অনুসারে সমানভাবে ছিটান। আগাছার উপর সম্পূর্ণ কভারেজ নিশ্চিত করুন।

প্রয়োগের সময়
নার্সারি / রোপণকৃত ধান: নার্সারি ধানের ক্ষেত্রে বপনের ১০–১২ দিন পর এবং রোপণকৃত ধানের ক্ষেত্রে রোপণের ১০–১৪ দিন পর প্রয়োগ করা সবচেয়ে উপযুক্ত, যখন অধিকাংশ আগাছা গজিয়ে উঠে ৩–৪ পাতার স্তরে থাকে, যা মাটি ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।
সরাসরি বপনকৃত ধান: সরাসরি বপনকৃত ধানের ক্ষেত্রে বপনের ১৫–২৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
উদ্ভিদ সুরক্ষা সরঞ্জাম: ফ্ল্যাট ফ্যান ফ্লাড জেট নোজল সংযুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার জাতীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্প্রেয়ার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

সতর্কতা
1. খাদ্য ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2. চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
3. স্প্রের কুয়াশা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ এড়িয়ে চলুন।
4. স্প্রে করার পর দূষিত কাপড় ও শরীরের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
5. স্প্রে করার সময় ধূমপান, খাওয়া, পান করা বা চিবানো থেকে বিরত থাকুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
দুর্বলতা, বমি, অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ ও ডায়রিয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা
1. যদি গিলে ফেলা হয়ে থাকে, তবে গলার পেছনের অংশে গুদগুদে দিয়ে বমি করান। রোগী অচেতন হলে বমি করাবেন না।
2. কাপড় বা ত্বক দূষিত হলে কাপড় খুলে প্রচুর সাবান ও পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলুন।
3. চোখে প্রবেশ করলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত প্রচুর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।
4. শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে রোগীকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান। শ্বাস না নিলে শ্বাসনালী পরিষ্কার করে কৃত্রিম শ্বাস দিন এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য নিন।

ফাইটোটক্সিসিটি
CIB নির্দেশিকা অনুযায়ী।

প্রতিষেধক
কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি
1. প্যাকেট ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
2. ব্যবহৃত প্যাকেট পুনরায় ব্যবহার রোধ করতে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না।
3. প্যাকেট, অবশিষ্ট পদার্থ ও ধোয়ার পানি পরিবেশ বা পানীয় জলের দূষণ রোধ করে নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
1. আগাছানাশকযুক্ত প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী থেকে দূরে আলাদা কক্ষে বা তালা-চাবি দেওয়া আলমারিতে রাখতে হবে, আগাছানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী।
2. সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত কক্ষ বা স্থান মজবুত, শুষ্ক, ভালো আলো ও বায়ুচলাচলযুক্ত এবং পর্যাপ্ত আকারের হতে হবে যাতে বাষ্পজনিত দূষণ এড়ানো যায়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	ওজন
1	বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম (এ.আই.)	10.00 % ও/আ
2	সহায়ক-A (কৃত্রিম অ্যালকোহলের পলিঅ্যালকাইলিন অক্সাইড ডেরিভেটিভ)	31.90 % ও/আ
3	সহায়ক-B (পলিঅক্সিইথিলিন পলিঅক্সি প্রোপিলিন কৃত্রিম অ্যালকোহল ইথার)	53.20 % ও/আ
4	প্রোপিলিন গ্লাইকোল	2.00 % ও/আ
5	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড C	1.50 % ও/আ
6	সিলিকন KS-506	1.00 % ও/আ
7	স্থিতিকারক	1.00 % ও/আ
8	পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
	মোট	100.00% ও/আ

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

ایس۔ سی۔ w/v % بسپائری بیک سوڈیم 10
(نظامی جڑی بوٹی مار)

بسپائری بیک سوڈیم 10% ایس۔ سی۔ دھان کی فصل میں پائی جانے والی گھاس، سیج اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کے خلاف مؤثر، اگاؤ کے بعد استعمال ہونے والی جڑی بوٹی مار دوا ہے۔

استعمال

فصل	نام کا بوٹی جڑی	مقدار ہیکٹر فی فعل جزو (گرام)	شدہ تیار ملی دوا (لیٹر)	کی پانی مقدار (لیٹر)	کے اسپرے آخری وقفہ کا برداشت بعد (دن)	دوبارہ اندراج ایک بر بعد کے درخواست (گھنٹوں میں)
دھان (براہ راست بوائی)		20–25	200–250	300		-
دھان (روپائی)	ایچینوکلوا) ساما چھوٹی ،(کروسگیلی ایچینوکلوا) گھاس ساما سائپرس) موتھا ،(روگوسم اشیئم) گھاس کھردری ،(کولونا ،(میلیاسیہ فمبرسٹائلس) تمبی ،(ایریا سائپرس) موتھا ،(ڈیفارمس آبی ،(فلورا پاروی لڈوگیا) بوٹی جڑی آبی ،(البا ایکلیپٹا) بھنگرا آلٹرنینتھیرا) تاک گھوڑا ،(ویجینالس مونوکوریا) کنول زیلینیکا سفینوکلیا) گھاس آبی ،(فائیلوکسیرونیڈز)	20	200	300	اور اسپرے چونکہ درمیان کے برداشت سے دن 78 وقفہ لیے اس ،ہے زیادہ مدت کی انتظار نہیں ضروری	-
دھان (روپیٹ)		20–25	200–250	300		-

استعمال کی ہدایات
استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلائیں۔ مطلوبہ مقدار میں جڑی بوٹی مار دوا کو تھوڑے پانی میں اچھی طرح ملائیں۔ پھر مقررہ باقی پانی شامل کر کے اچھی طرح ہلائیں۔
طریقہ استعمال: اسپرے سے پہلے کھیت کا پانی نکال دیں۔ اسپرے کے ایک دن کے اندر کھیت کو دوبارہ پانی سے بھر دیں اور کم از کم 10 دن تک پانی برقرار رکھیں۔
اسپرے کی ہدایات: ہوا کی سمت میں یکساں اسپرے کریں۔ جڑی بوٹیوں پر مکمل کوریج کو یقینی بنائیں۔

وقتِ استعمال
نرسری / منتقل شدہ دھان: نرسری دھان میں بوائی کے 10–12 دن بعد اور منتقل شدہ دھان میں کاشت کے 10–14 دن بعد، جب زیادہ تر جڑی بوٹیاں 3–4 پتوں کے مرحلے میں ہوں۔
براہ راست بوائی شدہ دھان: بوائی کے 15–25 دن بعد۔

پودوں کے تحفظ کا سامان
فلیٹ فین یا فلڈ جیٹ نوزل کے ساتھ نیپسیک اسپرے ئر کی سفارش کی جاتی ہے

احتیاطی تدابیر
خوراک اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔.1
آنکھوں اور جلد سے رابطہ سے بچیں۔.2
اسپرے کی دھند کو سانس کے ذریعے اندر نہ لیں۔.3
اسپرے کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔.4
اسپرے کے دوران سگریٹ نوشی، کھانا پینا یا چبانا منع ہے۔.5

زہر کے اثرات
کمزوری، قے، زیادہ لعاب اور اسہال۔

ابتدائی طبی امداد
اگر نگل لیا ہو تو گلے کے پچھلے حصے کو چھیڑ کر قے کروائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کروائیں۔.1
اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہوں تو کپڑے اتار کر صابن اور وافر پانی سے دھوئیں۔.2
اگر آنکھوں میں چلا جائے تو 10–15 منٹ تک صاف پانی سے دھوئیں۔.3
اگر سانس کے ذریعے اندر چلا جائے تو مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔ سانس نہ آ رہا ہو تو مصنوعی تنفس دیں۔ فوراً طبی مدد حاصل کریں.4

ضدِ زہر
کوئی مخصوص ضدِ زہر معلوم نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں

استعمال شدہ ڈبے کی تلفی
استعمال شدہ ڈبے کو توڑ کر آبادی سے دور دفن کریں۔.1
دوبارہ استعمال سے بچانے کے لیے استعمال شدہ ڈبہ باہر نہ چھوڑیں۔.2
ڈبہ، بچا ہوا مواد اور دھونے کا پانی ماحول یا پینے کے پانی کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہوئے محفوظ طریقے سے تلف کریں۔.3

ذخیرہ کرنے کی شرائط
جڑی بوٹی مار دوا والے ڈبے، خصوصاً خوراکی اشیاء کے ذخیرہ کرنے والے مقامات سے الگ، مقدار اور نوعیت کے مطابق تالہ و چابی کے ساتھ الگ الماریوں یا کمروں میں رکھیں۔.1
ذخیرہ کرنے کے لیے مخصوص کمرے مضبوط تعمیر کے حامل، خشک، روشن اور ہوادار ہوں اور بخارات کے ذریعے آلودگی سے بچاؤ کے لیے مناسب وسعت رکھتے ہوں.2

کیمیائی ترکیب

شمار	جزو	وزن
1	(اے۔آئی۔) سوڈیم بیک بسپائری	10.00 % آ/و
2	(مشتق آکسائیڈ الکائلین پولی کا الکحل مصنوعی) A-معاون	31.90 % آ/و
3	الکحل مصنوعی پروپیلین آکسی پولی ایتھلین آکسی پولی) B-معاون (ایتھر	53.20 % آ/و
4	گلائکول پروپیلین	2.00 % آ/و
5	C آکسائیڈ ایلومینیم	1.50 % آ/و
6	KS-506 سلیکون	1.00 % آ/و
7	اسٹیبلائزر	1.00 % آ/و
8	پانی	حسبِ ضرورت
	کل	100.00 % آ/و

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

ബിസ്പൈറിബാക്ക് സോഡിയം 10% w/v എസ്.സി.
(സിസ്റ്റമിക് കളനാശിനി)

ബിസ്പൈറിബാക് സോഡിയം 10% SC നെൽകൃഷിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പുല്ലുവർഗ്ഗ കളകൾ, സെഡ്ജ് കളകൾ, വിശാല ഇലകളുള്ള കളകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ മുളച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കളനാശിനിയാണ്

ശുപാർശ

വിള	കളയുടെ പേര്	ഹെക്ടറിന് അളവ് (സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഉൽപ്പന്നം (മില്ലി)	വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിളവെടുപ്പ് ഇടവേള (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ അപേക്ഷയ്ക്കു ശേഷവും പുനഃപ്രവേശനം (മണിക്കൂറിൽ)
നെല്ല് (നേരിട്ട് വിതച്ചത്)		20–25	200–250	300		-
നെല്ല് (നാട്ട് നടീൽ)	സാമ പുല്ല് (ഇചിനോക്ലോആ ക്രുസ്ഗാലി), ചെറിയ സാമ (ഇചിനോക്ലോആ കൊലോണ), കട്ടിയുള്ള പുല്ല് (ഇഷിയം റുഗോസം), മുത്ത (സൈപ്പെറസ് ഡിഫോർമിസ്), മുത്ത (സൈപ്പെറസ് ഇരിയ), തുമ്പി (ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് മിലിയേഷ്യ), കയ്യുണ്ണി (എക്ലിപ്റ്റ ആൽബ), ജലകള (ലുഡ്‌വിഗിയ പാർവിഫ്ലോറ), നീലത്താമര (മോണോകോറിയ വജിനാലിസ്), കുതിരത്താക്ക് (ആൾട്ടർനാന്തെറ ഫിലോക്സെറോയിഡ്സ്), ജലപുല്ല് (സ്ഫീനോക്ലിയ സൈലേനിക്ക)	20	200	300	സ്പ്രേയും വിളവെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 78 ദിവസത്തിലധികം ആയതിനാൽ പരീക്ഷണ ഇടവേള ആവശ്യമില്ല	-
നെല്ല് (റോപിത)		20–25	200–250	300		-

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പ് കുപ്പി നന്നായി കുലുക്കുക. ആവശ്യമായ അളവിലെ കളനാശിനി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലർത്തുക. തുടർന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട ശേഷമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
പ്രയോഗ രീതി: പ്രയോഗത്തിന് മുമ്പ് വയലിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകളയണം. പ്രയോഗത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിനകം വയൽ വീണ്ടും വെള്ളം നിറക്കണം, തുടർന്ന് കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസം വെള്ളം നിലനിർത്തണം.
സ്പ്രേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സമമായി സ്പ്രേ ചെയ്യുക. കളകളിൽ പൂർണ്ണമായ കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം
നഴ്സറി / നട്ട് നടീൽ നെല്ല്: നഴ്സറി നെല്ലിൽ വിത്തിട്ടതിന് ശേഷം 10–12 ദിവസവും, നട്ട് നടീൽ നെല്ലിൽ നടീൽ കഴിഞ്ഞ് 10–14 ദിവസവും. മിക്ക കളകളും 3–4 ഇല ഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
നേരിട്ട് വിതച്ച നെല്ല്: വിത്തിട്ടതിന് ശേഷം 15–25 ദിവസത്തിനകം.

സസ്യസംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ
ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

മുൻകരുതലുകൾ
1. ഭക്ഷണവും മൃഗാഹാരവും മുതൽ അകലെ സൂക്ഷിക്കുക.
2. കണ്ണിലും ചർമ്മത്തിലും സ്പർശം ഒഴിവാക്കുക.
3. സ്പ്രേ മഞ്ഞ് ശ്വസിക്കരുത്.
4. സ്പ്രേ കഴിഞ്ഞ് മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലി, കുടിക്കൽ, ഭക്ഷണം, ചവയ്ക്കൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

വിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ
ദുർബലത, ഛർദ്ദി, അധിക ലാലജലം, വയറിളക്കം.

ആദ്യ ശുശ്രൂഷ
1. വിഴുങ്ങിയാൽ, തൊണ്ടയുടെ പിന്നുഭാഗം ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഛർദ്ദി വരുത്തുക. ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്.
2. വസ്ത്രവും ചർമ്മവും മലിനമായാൽ, വസ്ത്രം മാറ്റി സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
3. കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ, 10–15 മിനിറ്റ് ധാരാളം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക.
4. ശ്വസിച്ചാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റുക. ശ്വസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വസനം നൽകുക. ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.

എതിർവിഷം
പ്രത്യേക എതിർവിഷം ഇല്ല. ലക്ഷണാനുസൃത ചികിത്സ നൽകുക.

ഉപയോഗിച്ച പാക്കറ്റ് നശിപ്പിക്കൽ
1. ഉപയോഗിച്ച പാക്കറ്റ് തകർത്തു താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ അടക്കം ചെയ്യണം.
2. വീണ്ടും ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാക്കറ്റ് പുറത്തുവെക്കരുത്.
3. പാക്കറ്റും ശേഷിച്ച വസ്തുവും കഴുകിയ വെള്ളവും പരിസ്ഥിതിയെയോ കുടിവെള്ളത്തെയോ മലിനമാക്കാത്തവിധം സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥ
1. കളനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കറ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ, അളവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് പൂട്ടിയിട്ട അലമാരകളിലോ പ്രത്യേക മുറികളിലോ സൂക്ഷിക്കണം.
2. സംഭരണത്തിനുള്ള മുറികൾ ഉറപ്പുള്ളതും, ഉണങ്ങിയതും, നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം; വാതക മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	ഭാരം
1	ബിസ്പൈറിബാക്ക് സോഡിയം (എ.ഐ.)	10.00 % ഭ/ആ
2	സഹായി-A (സിന്തറ്റിക് ആൽക്കഹോളിന്റെ പോളിഅൽകൈലിൻ ഓക്സൈഡ് വ്യുത്പന്നം)	31.90 % ഭ/ആ
3	സഹായി-B (പോളിഓക്സിഇഥിലീൻ പോളിഓക്സി പ്രൊപിലീൻ സിന്തറ്റിക് ആൽക്കഹോൾ ഈഥർ)	53.20 % ഭ/ആ
4	പ്രൊപിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ	2.00 % ഭ/ആ
5	അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് C	1.50 % ഭ/ആ
6	സിലിക്കൺ KS-506	1.00 % ഭ/ആ
7	സ്ഥിരീകരകൻ	1.00 % ഭ/ആ
8	വെള്ളം	ആവശ്യത്തിന്
	മൊത്തം	100.00 % ഭ/ആ

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 10% w/v ಎಸ್.ಸಿ.
(ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ 10% ಎಸ್.ಸಿ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಸೆಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಳಕೆಯಾದ ನಂತರ ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾತ್ರಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶ (ಗ್ರಾಂ)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಭತ್ತ (ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ)		20–25	200–250	300		—
ಭತ್ತ (ನರ್ಸರಿ)	ಸಾಮ ಗಡ್ಡೆ (ಇಚಿನೋಕ್ಲೋಆ ಕುಸ್ಗಾಲಿ), ಸಣ್ಣ ಸಾಮ (ಇಚಿನೋಕ್ಲೋಆ ಕೊಲೋನಾ), ಕರಕಸ ಗಡ್ಡೆ (ಇಶಿಯಂ ರುಗೋಸಮ್), ಮೊಥಾ (ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್), ಮೊಥಾ (ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ), ತುಂಬಿ (ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯೇಶಿಯಾ), ಭೃಂಗರಾಜ (ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಾ ಆಲ್ಬಾ), ನೀರಿನ ಕಳೆ (ಲುಡ್ವಿಗಿಯಾ ಪಾರ್ವಿಫ್ಲೋರಾ), ಜಲಕಮಲ (ಮೊನೋಕೋರಿಯಾ ವಜಿನಾಲಿಸ್), ಕುದುರೆ ತಾಕು (ಆಲ್ಟರ್ನಾಂಥೆರಾ ಫಿಲೋಕ್ಸೆರೊಯಿಡ್ಸ್), ಜಲಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಪೀನೋಕ್ಲಿಯಾ ಜೈಲೆನಿಕಾ)	20	200	300	ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ 78 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	—
ಭತ್ತ (ನಾಟಿ)		20–25	200–250	300		—

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಅಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಉಳಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ.
ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಬೇಕು.
ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ
ನರ್ಸರಿ / ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ: ನರ್ಸರಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ 10–12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಟಿಯ ನಂತರ 10–14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳೆಯಾಗಿ 3–4 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೇರೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಅಕ್ಕಿ: ನೇರೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ 15–25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣಗಳು: ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನೋಜಲ್ ಹೊಂದಿದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೊದಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗ್ರತೆಗಳು
1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ.
2. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಮಂಜನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಊಟ, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪರಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ದುರ್ಬಲತೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಯಾದ ಲಾಲಾಜಲ ಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಜಲವಿಸರ್ಜನೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1. ನುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕೆದಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬಾರದು.
2. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.
3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದರೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
4. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ
CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.

ಪ್ರತಿವಿಷ
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
1. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಹೊರಗಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
1. ಕಳೆನಾಶಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಒಣವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹರಿವು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಷ್ಪದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ತೂಕ
1	ಬಿಸ್ಪೈರಿಬಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ (ಎ.ಐ.)	10.00 % ವ/ಆ
2	ಸಹಾಯಕ-A (ಕೃತಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ಪಾಲಿಅಲ್ಕೈಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ)	31.90 % ವ/ಆ
3	ಸಹಾಯಕ-B (ಪಾಲಿಒಕ್ಸಿಇಥಿಲೀನ್ ಪಾಲಿಒಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಕೃತಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಥರ್)	53.20 % ವ/ಆ
4	ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	2.00 % ವ/ಆ
5	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ C	1.50 % ವ/ಆ
6	ಸಿಲಿಕಾನ್ KS-506	1.00 % ವ/ಆ
7	ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ	1.00 % ವ/ಆ
8	ನೀರು	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ
	ಒಟ್ಟು	100.00 % ವ/ಆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

பிஸ்பைரிபேக் சோடியம் 10% w/v எஸ்.சி.
(முறையமைப்பு களைநாசினி)

பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் 10% SC என்பது நெல் பயிரில் காணப்படும் புல்வகை களைகள், செட்ஜ் களைகள் மற்றும் அகல இலை களைகளைக் கட்டுப்படுத்த திறன் வாய்ந்த, முளைத்த பிந்தைய நிலையில் பயன்படுத்தப்படும் களைக்கொல்லியாகும்

பரிந்துரை

பயிர்	களை பெயர்	ஹெக்டேருக்கு அளவு செயல் கூறு (கிராம்)	தயாரிப்பு (மி.லி)	தண்ணீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிற்குப் பிறகு அறுவடை இடைவேளை (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்கும் பிறகு மறுபதிவு (நேரங்களில்)
நெல் (நேரடி விதைப்பு)		20–25	200–250	300		—
நெல் (நாற்று நடவு)	சாமா புல் (எசினோக்லோஆ க்ரூஸ்கல்லி), சிறு சாமா (எசினோக்லோஆ கொலோனா), கடின புல் (இஸ்கியம் ருகோசம்), மொத்தா (சைப்பெரஸ் டிஃபார்மிஸ்), மொத்தா (சைப்பெரஸ் இரியா), தும்பி (பிம்ப்ரிஸ்டைலிஸ் மிலியேசியா), கரிசலாங்கண்ணி (எக்லிப்டா ஆல்பா), நீர்க் களை (லுட்விகியா பார்விஃப்ளோரா), நீர்தாமரை (மோனோகோரியா வாஜினாலிஸ்), குதிரைத்தாக்கு (ஆல்டர்நாந்தேரா பிலோக்செராய்ட்ஸ்), நீர்ப்புல் (ஸ்பீனோக்ளியா சைலெனிகா)	20	200	300	சோதனை இடைவேளை தேவையில்லை, ஏனெனில் தெளிப்பு மற்றும் அறுவடைக்கிடையிலான இடைவெளி 78 நாட்களுக்கும் அதிகம்	—
நெல் (ரோபிடா)		20–25	200–250	300		—

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்
பயன்படுத்தும் முன் பாட்டிலை நன்றாக குலுக்கவும். தேவையான அளவு களைக்கொல்லியை அளந்து, குறைந்த அளவு தண்ணீரில் நன்றாக கலக்கவும். பின்னர் குறிப்பிடப்பட்ட மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்த்து நன்றாக கிளறவும்.
பயன்பாட்டு முறை: களைக்கொல்லி தெளிப்பதற்கு முன் வயலில் உள்ள நீரை வடிக்க வேண்டும். தெளித்த ஒரு நாளுக்குள் வயலை மீண்டும் நீரால் நிரப்ப வேண்டும் மற்றும் தெளித்த பிறகு குறைந்தது 10 நாட்கள் நீர் நிலை பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
தெளிப்பு வழிமுறை: காற்றின் திசையில் சீராக தெளிக்கவும். களைகளில் முழுமையான மூடல் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும்.

பயன்பாட்டு நேரம்
நாற்றங்கால் / நாற்று நடவு நெல்: நாற்றங்கால் நெலுக்கு விதைத்த 10–12 நாட்களிலும், நாற்று நடவு நெலுக்கு நடவு செய்த 10–14 நாட்களிலும் தெளிக்க வேண்டும். பெரும்பாலான களைகள் முளைத்து 3–4 இலை நிலை அடைந்திருக்கும் நேரமே சிறந்தது (மண் மற்றும் காலநிலை சார்ந்தது).
நேரடி விதைப்பு நெல்: விதைத்த 15–25 நாட்களுக்குள் தெளிக்க வேண்டும்.

தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்
அதிக அளவு தெளிப்பு கருவிகள், உதாரணமாக பிளாட் ஃபேன் அல்லது ஃப்ளட் ஜெட் நாசில் பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

முன்னெச்சரிக்கைகள்
1. உணவு மற்றும் மிருக தீவனத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.
2. கண்கள் மற்றும் தோலில் படாமல் கவனிக்கவும்.
3. தெளிப்பு மூடுபனியை சுவாசிக்க வேண்டாம்.
4. தெளித்த பின் மாசடைந்த உடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும்.
5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்கவும், குடிக்கவும், சாப்பிடவும், மென்று கொள்ளவும் கூடாது.

விஷமயக்க அறிகுறிகள்
பலவீனம், வாந்தி, அதிக உமிழ்நீர் சுரப்பு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு.

முதலுதவி
1. விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையின் பின்புறத்தை தூண்டி வாந்தி வரச் செய்யவும். நோயாளி மயக்க நிலையில் இருந்தால் வாந்தி வரச் செய்யக்கூடாது.
2. உடை மற்றும் தோல் மாசடைந்திருந்தால், உடைகளை அகற்றி, மாசடைந்த தோலை சோப்பு மற்றும் அதிக அளவு தண்ணீரால் கழுவவும்.
3. கண்கள் மாசடைந்திருந்தால், 10–15 நிமிடங்கள் அதிக அளவு தண்ணீரால் கழுவவும்.
4. சுவாசித்திருந்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு கொண்டு செல்லவும். சுவாசம் இல்லையெனில் காற்றுப் பாதையை சுத்தம் செய்து செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். உடனடியாக மருத்துவ உதவி பெறவும்.

எதிர்விஷம்
குறிப்பிட்ட எதிர்விஷம் இல்லை. அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்திய கன்டெய்னர் அகற்றல்
1. பயன்படுத்திய பெட்டியை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து தூரத்தில் புதைக்க வேண்டும்.
2. பயன்படுத்திய பெட்டிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தாத வகையில் வெளியில் விட்டுவிடக் கூடாது.
3. மீதமுள்ள மருந்து மற்றும் கழுவும் நீரை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடிநீர் மாசுபடாத வகையில் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலைமைகள்
1. களைக்கொல்லி கொண்ட பெட்டிகள், உணவு பொருட்கள் சேமிக்கும் இடங்களிலிருந்து தனியாக, பூட்டு மற்றும் சாவியுடன் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
2. சேமிப்பு அறைகள் வலுவாக கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	எடை
1	பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் (ஏ.ஐ.)	10.00 % எ/அ
2	துணை-A (செயற்கை ஆல்கஹாலின் போலிஅல்கைலீன் ஆக்சைடு பெறுமதி)	31.90 % எ/அ
3	துணை-B (போலிஒக்ஸிஇதிலீன் போலிஒக்ஸி புரோபிலீன் செயற்கை ஆல்கஹால் ஈதர்)	53.20 % எ/அ
4	ப்ரோப்பிலீன் குளைகால்	2.00 % எ/அ
5	அலுமினியம் ஆக்சைடு C	1.50 % எ/அ
6	சிலிகான் KS-506	1.00 % எ/அ
7	நிலைப்படுத்தி	1.00 % எ/அ
8	தண்ணீர்	தேவையான அளவு
	மொத்தம்	100.00 % எ/அ

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% w/v ఎస్.సి.
(వ్యవస్థాత్మక కలుపు నాశిని)

బిస్‌పైరిబాక్ సోడియం 10% ఎస్.సి. వరి పంటలో ఉండే గడ్డి, సెడ్జ్ మరియు వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కలపై ప్రభావవంతంగా పనిచేసే మొలకెత్తిన తరువాత వాడే కలుపు నాశినిగా ఉంటుంది.

సిఫారసు

పంట	కలుపు మొక్కల సాధారణ పేరు	ప్రతి హెక్టేయర్ మాత్ర క్రియాశీల పదార్థం (గ్రా.)	మిశ్రమం (మి.లీ.)	నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీ.)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వ్యవధి (రోజులు)	పిచికారీ తర్వాత తిరిగి ప్రవేశం (గంటలు)
వరి (నేరుగా విత్తనం)		20–25	200–250	300		—
వరి (నర్సరీ)	సామ గడ్డి (ఎచినోక్లోఆ క్రుస్గల్లి), చిన్న సామ (ఎచినోక్లోఆ కొలోనా), రఫ్ గడ్డి (ఇస్కియమం రుగోసమ్), మోథా (సైపెరస్ డిఫార్మిస్), మోథా (సైపెరస్ ఇరియా), తుంబి (ఫింబ్రిస్టైలిస్ మిలియేసియా), గరగడ (ఎక్లిప్టా ఆల్బా), నీటి కలుపు (లుడ్విగియా పార్విఫ్లోరా), నీటి కమలం (మోనోకోరియా వజినాలిస్), గుర్రపు తాకు (ఆల్టర్నాన్థెరా ఫిలోక్సెరోయిడ్స్), నీటి గడ్డి (స్ఫీనోక్లియా జెలెనికా)	20	200	300	పిచికారీ మరియు కోత మధ్య వ్యవధి 78 రోజులకన్నా ఎక్కువగా ఉండటంతో వేచిచూడే కాలం అవసరం లేదు	—
వరి (నాటిన పంట)		20–25	200–250	300		—

వాడుక సూచనలు
వాడకానికి ముందు సీసాను బాగా కుదిపి కలపాలి. అవసరమైన పరిమాణంలో కలుపుమందును కొలిచి కొద్దిపాటి నీటిలో బాగా కలపాలి. అనంతరం సూచించిన మిగిలిన నీటి పరిమాణాన్ని కలిపి బాగా కలపాలి.
వినియోగ విధానం: కలుపుమందు పిచికారీ చేయడానికి ముందు పొలంలోని నీటిని పూర్తిగా బయటకు వదలాలి. పిచికారీ చేసిన ఒక రోజు లోపల మళ్లీ నీటిని పొలంలో నింపాలి మరియు పిచికారీ తరువాత కనీసం 10 రోజులు నీటిని నిల్వ ఉంచాలి.
పిచికారీ సూచనలు: గాలి దిశలో సమానంగా పిచికారీ చేయాలి. కలుపు మొక్కలపై పూర్తిగా కవరేజ్ కలిగేలా చూసుకోవాలి.

వాడే సమయం
నర్సరీ / నాటిన వరి: నర్సరీ వరి కోసం విత్తిన 10–12 రోజుల తరువాత మరియు నాటిన వరి కోసం నాటిన 10–14 రోజుల తరువాత వాడటం ఉత్తమం. ఈ సమయంలో ఎక్కువ కలుపు మొక్కలు మొలకెత్తి 3–4 ఆకుల దశలో ఉంటాయి. ఇది నేల మరియు వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
నేరుగా విత్తిన వరి: నేరుగా విత్తిన వరి పంటలో విత్తిన 15–25 రోజుల తరువాత వాడాలి.
మొక్కల రక్షణ పరికరాలు: ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ ఫ్లడ్ జెట్ నోజిల్ అమర్చిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ వంటి అధిక పరిమాణం స్ప్రేయర్‌ను ఉపయోగించడం సిఫారసు చేయబడింది.

జాగ్రత్తలు
1. ఆహార పదార్థాలు మరియు పశువుల మేత నుండి దూరంగా ఉంచాలి.
2. కళ్ళు మరియు చర్మంతో ప్రత్యక్ష సంపర్కాన్ని నివారించాలి.
3. పిచికారీ మబ్బును పీల్చకుండా ఉండాలి.
4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి.
5. పిచికారీ సమయంలో పొగ త్రాగడం, తినడం, త్రాగడం లేదా నమలడం చేయరాదు.

విష ప్రభావ లక్షణాలు
బలహీనత, వాంతులు, అధిక లాలాజల స్రావం మరియు విరేచనాలు.

ప్రథమ చికిత్స
1. మింగినట్లయితే గొంతు వెనుక భాగాన్ని తాకించి వాంతులు చేయించాలి. రోగి స్పృహలేనివాడైతే వాంతులు చేయించకూడదు.
2. బట్టలు లేదా చర్మం కలుషితమైతే బట్టలను తొలగించి సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో చర్మాన్ని కడగాలి.
3. కళ్లలో పడితే 10 నుండి 15 నిమిషాలు శుభ్రమైన నీటితో బాగా కడగాలి.
4. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లినట్లయితే రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తీసుకెళ్లాలి. శ్వాస లేకపోతే శ్వాస మార్గాన్ని శుభ్రం చేసి కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వాలి మరియు వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ
CIB మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా.

ప్రతివిషం
ప్రత్యేకమైన ప్రతివిషం తెలియదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స చేయాలి.

వాడిన కంటైనర్ల నిర్వాహణ
1. ప్యాకెట్‌ను పగలగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా మట్టిలో పూడ్చాలి.
2. వాడిన ప్యాకెట్‌ను మళ్లీ ఉపయోగించకుండా బయట వదిలి పెట్టరాదు.
3. ప్యాకెట్లు, మిగిలిన పదార్థం మరియు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా తాగునీటి కాలుష్యం కాకుండా సురక్షితంగా నిర్వాహించాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు
1. కలుపుమందు ఉన్న ప్యాకెట్లను ఆహార పదార్థాల నుండి దూరంగా, వేరే గదుల్లో లేదా తాళం వేసిన అల్మారాల్లో ఉంచాలి. ఇది కలుపుమందు పరిమాణం మరియు స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
2. నిల్వ కోసం ఉపయోగించే గదులు బలంగా, పొడిగా, మంచి వెలుతురు మరియు గాలి ప్రసరణ కలిగి, ఆవిరి వల్ల కలుషితం కాకుండా సరైన పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయనిక సంయోజనం

క్రమ సంఖ్య	ఘటకం	బరువు
1	బిస్పైరిబాక్ సోడియం (ఎ.ఐ.)	10.00 % వ/ఆ
2	సహాయక-A (సింథటిక్ ఆల్కహాల్ యొక్క పాలీఆల్కైలీన్ ఆక్సైడ్ వ్యుత్పన్నం)	31.90 % వ/ఆ
3	సహాయక-B (పాలీఆక్సీథిలీన్ పాలీఆక్సీ ప్రొపిలీన్ సింథటిక్ ఆల్కహాల్ ఈథర్)	53.20 % వ/ఆ
4	ప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్	2.00 % వ/ఆ
5	అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ C	1.50 % వ/ఆ
6	సిలికాన్ KS-506	1.00 % వ/ఆ
7	స్థిరీకరక	1.00 % వ/ఆ
8	నీరు	అవసరమైనంత
	మొత్తం	100.00 % వ/ఆ

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu