AgroStar®

OXIVIA®

Oxyflourfen 23.5% E.C (w/w)
(Selective Herbicide)

ऑक्सीवीआ

आक्सीफ्लोरफेन 23.5 प्रतिशत (भार/भार)
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Oxyflourfen 23.5% E.C (w/w)
(Selective Herbicide)

Oxyflourfen 23.5% EC w/w [22.8% EC (w/v)] is a selective herbicide containing oxyflurofen active ingredient 23.5% E.C. It has a residual activity and controls important weeds in crops like Rice, Tea, Potato, Onion, Groundnut and Mentha.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weed	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (ml)			
Groundnut	Echinochloa colonum Digitaria arginata	100–200	425–850	500–750	–	
Mentha	Echinochloa colona, Cyperus spp., Solanum nigrum, Amaranthus spp., Sphenochlea sp., Anagallis arvensis, Chenopodium album, Commelina benghalensis, Digitaria sanguinalis, Eclipta alba, Euphorbia spp., Ludwigia parviflora, Portulaca spp.	206	904.3	500	10	
Onion	Chenopodium, Album, Amaranthus viridis	100–200	425–850	500–750	–	
Potato	Chenopodium, Coronopus, Haliotropium, Trianthema, Cyprus	100–200	425–850	500–750	–	
Rice (Direct sown) as pre-emergence	Echinochloa Spp. Cyperus iria Eclipta alba	150–240	650–1000	500	–	
Tea	Digitaria, Imperata, Paspalum,Borreria hispida	150–250	650–1000	500–750	15	

Direction Of Use
PLANT PROTECTION EQUIPMENTS: For conventional spray (High Volume spray). On field crop quantity of water is recommended above. The most commonly used sprayer are Bucket pump sprayer, Stirrup pump sprayer, Knapsack sprayer, wheel barroe sprayer, compression Knapsack sprayer etc. Use the sprayer with flood jet or flat fan nozzle. Keep the nozzle at fixed height from the ground level. Spray the area in straight line at uniform speed.

Time of Application
Pre emergence application. Use with in 3-4 days from transplanting/plantation.

Precautions
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body aftrer spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning
Primary irritation to skin, eyes and respiratory tract.

First Aid
Wash thoroughly after handling. In case of contact, wash skin with plenty of water and soap. For eyes, flush with plenty of water. Get medical attention.

Phytotoxicity : Refer to CIB guidelines

Antidote
Ingestions of small amounts (less than 10 mg/kg body weight) occuring less than an hour before treatment are best treated by: i) Syrup of lpecac followed by 1-2 glasses of water. Dose for adults and children above 12 years 30 ml. Dose for children under 12 years 12 ml. ii) Activated charcoal administer 30-50 gm as a slurry in tap water after vomiting stops. iii) Sodium/Magnesium sulphate 0.25 gm/kg. in tap water as a cathartic. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. Used packages shall not be left outside to Prevent their reuse. 2. The packages shall be broken and burried away from habitation.
3. Packages or surplus materials and washings of the spary equipments should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions
1. The packages containing the herbicides shall be stored inseparate rooms or premises away from the room or permises used for storing other articles, particularly food and animal feed or herbicides must be stored in separate almiriah under lock and key, depending upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The room or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, cool, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid vapour contamination .

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Description	Weight
1	Oxyflourfen Tech	(Min purity 70%w/w)	33.60 % w/w
2	Emulsifiers : Blend, Anionic Calcium alkyl aryl sulphonate and Non-ionic polyoxy ethylene ether	–	10.20 % w/w
3	Cyclohexanone	–	13.40 % w/w
4	Solvent : Xylene (Dimethyl benzene)		42.80 % w/w
	Total	–	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

English

आक्सीफ्लोरफेन 23.5 प्रतिशत (भार/भार)
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

आक्सीफलोरफेन 23.5% ई.सी भार/भार (22.8% ई.सी भार/आयतन) चुनिंदा खरपतवारनाशक है जिसमें आक्सीफलोरफेन 23.5% ई.सी सक्रिय तत्व है। जिसे सीधी बुआई धान, चाय, आलू, प्याज मूगँफली और मैन्था में होने वाले घासवर्गीय चौड़ी पत्ती वाले और मोथा जैसे खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

उपयोग

फ़सल	खरपतवार के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली.)			
मूंगफली	सांवा, मकरजुली	100–200	425–850	500–750	–	
मैंथा	सवां , मोथा, जंगली चौलाई, कृष्णनील, बथुआ, कैना, सुखारी, भृंगराज, दुधी, लबंगा फूल, लुजी, मकोय, बनमिर्ची	206	904.3	500	10	
प्याज	बथुआ, चौलाई (जंगली)	100–200	425–850	500–750	–	
आलू	बथुआ, जंगली हालो, पत्थर चट्टा, हत्सूरा, मोथा	100–200	425–850	500–750	–	
धान (सीधी बुवाई)	सांवा, मोथा, भंगड़ा	150–240	650–1000	500	–	
चाय	मकरजुली, कोदो, सिरहू, मदन घटी	150–250	650–1000	500–750	15	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
पौध सुरक्षा यंत्र: खेत की फसलों रीतिगत छिड़काव (अधिक मात्रा छिड़काव) के लिए पानी की मात्रा ऊपर दी गई है। साधारणतया प्रयोग में लाये जाने वाले स्प्रेयर है – बकेट पंप स्प्रेयर, स्टिरप पंप स्प्रेयर, नैपसैक स्प्रेयर, व्हील बैरो स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर आदि। स्प्रेयर को फ्लड जेट या फ्लैट नोजल के साथ प्रयोग करें। नोजल को जमीन से एक ही ऊँचाई पर रखें। क्षेत्र पर छिड़काव सीधी लाइन में नियमित गति से करें।

प्रयोग का समय
उगने से पूर्व रोपाई से 3-4 दिन के भीतर उपयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ
1. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुँह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4. छिड़काव के बाद दृष्ट कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पंहने।

विष के लक्षण
त्वचा, आंखों और श्वसनली में जलन।

प्राथमिक चिकित्सा
काम करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। संपर्क होने पर, त्वचा को साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखों के लिए पानी से अच्छी तरह धोएं तथा चिकित्सक को दिखाएं।

पौधविशाक्तता : सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

विष नाशक
थोड़ी मात्रा (10 मि.ग्रा./कि.ग्रा. शरीर के भार से कम) ईलाज के एक घंटा पहले की सर्वोत्तम चिकित्सा विधि इस प्रकार है:
1) एपिकॉक सिरप, उसके बाद 1-2 गिलास पानी। वयस्कों और 12 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए दवा की मात्रा 30 मि. ली. है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए दवा की मात्रा 12 मि. ली. है।
2) 30-50 ग्राम सक्रिय चारकोल को नल के पानी में घोल बनाकर, उल्टी रुक जाने के बाद दें। 3) सोडियम/मैग्निशियम सल्फेट 0.25 ग्रा./कि. ग्रा. नल के पानी में कैथारिटिक के रूप में दें। लक्षणानुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर गाड़ दें।
2. खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिए उन्हें बाहर मत छोड़ें।
3. खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान, डिब्बों तथा मशीनों के धोवन का सावधानीपूर्वक निपटारा करें जिससे जल व पर्यावरण दुष्प्रभावित न हो।

संग्रहण की शर्तें
1. खरपतवारनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए अथवा खरपतवार नाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें।
2. खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशन, मजबूत, शुष्क, हवादार तथा पर्याप्त लंबाई चौड़ाई का होना चाहिये। जिसमें वाष्प द्वारा प्रदूषण ना हो।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक	विवरण	मात्रा
1	आक्सीफ्लोरफेन टैक्निकल	(न्यूनतम शुद्धता 70% भार/भार)	33.60 %भार/भार
2	मिक्षण इमुलसीफायर : अनआयनिक केलशियम अल्काईल एरिल सल्फोनेट और नॉन आयनिक पोली आक्सी इथाइलीन ईथर	–	10.20 %भार/भार
3	साइक्लो हैक्सेनोन	–	13.40 %भार/भार
4	घोलक: जायलीन(डाई मिथाइल बेनज़ीन)	–	42.80 %भार/भार
	कुल		100 %भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

आक्सीफ्लोरफेन 23.5 टक्के (भार/भार)
(निवडक तणनाशक)

आक्सीफ्लोरफेन 23.5% ई.सी भार/भार (22.8% ई.सी भार/घनफळ) निवडक तणनाशक आहे ज्यामध्ये आक्सीफ्लोरफेन 23.5% ई.सी सक्रिय घटक आहे. याचा वापर सरळ बियाणे तांदूळ, चहा, बटाटे, कांदा, मूगफली आणि मेंथा मध्ये होणाऱ्या गवतसदृश रुंदपान व मोथा सारख्या तणांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

शिफारस

पीक	तणांची नावे	प्रति हेक्टर प्रमाण		पाण्याची मात्रा (ली.)	शेवटचे फवारणी व पीक कापण्याच्या दरम्यान अंतर (दिवसांत)	पुन्हा प्रवेश कालावधी प्रत्येक फवारणीनंतर (तास)
		स. घटक (ग्रॅ.)	संरचना (मि.)			
शेंगदाणा	सावांक, मकरजुली	100–200	425–850	500–750	–	
पुदिना (मेंथा)	सावांक, मोठा, जंगली चोळाई, कृष्णनील, बथुआ, केना, मुस्करी, भंगराज, दूधी, लवंगा फूल, लुडी, मकोरा, बनतीर्थी	206	904.3	500	10	
कांदा	बथुआ, चोळाई (जंगली)	100–200	425–850	500–750	–	
बटाटा	बथुआ, जंगली हालो, पाषाणचट्टा, हत्सूरा, मोठा	100–200	425–850	500–750	–	
तांदूळ (सरळ बियाणे)	सावांक, मोठा, भंगड़ा	150–240	650–1000	500	–	
चहा	मकरजुली, कोदो, सिरस, मदन घटी	150–250	650–1000	500–750	15	

वापरासाठी सूचना
पिक संरक्षक उपकरण: शेतातील पिकांवर नियमित फवारणी (अधिक प्रमाणात फवारणी) करण्यासाठी दिलेल्या पाण्याचे प्रमाण वापरा. सामान्यत: वापरण्यात येणारे स्प्रेयर आहेत – बकेट पंप स्प्रेयर, स्टिरप पंप स्प्रेयर, नलसॅटिक स्प्रेयर, व्हीलबॅरो स्प्रेयर, कंप्रेशन नलसॅटिक स्प्रेयर इत्यादी. स्प्रेयर फ्लड जेट किंवा फ्लॅट नोजलसह वापरा. नोजल जमिनीतून एकसमान उंचीवर ठेवा. क्षेत्रात फवारणी सरळ रेषेत नियमित वेगाने करा.

वापराचा वेळ
रोपाईपूर्वी 3-4 दिवसांच्या आत वापरा.

वापरकर्त्यांसाठी खबरदारी अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांची रिकामी पिशव्या आणि प्राण्यांचे चारा पासून दूर ठेवा. तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क टाळा. फवारणीची वाफ श्वासाद्वारे आत जाण्यापासून टाळा. हवा दिशेनुसार फवारणी करा. फवारणी केल्यानंतर कपडे आणि शरीराचे अवयव चांगले धुवा. फवारणीच्या वेळी धूम्रपान, अन्न, पाणी घेणे किंवा काही चावणे टाळा. फवारणी करताना किंवा मिश्रण करताना पूर्ण संरक्षक कपडे परिधान करा.

विषाचे लक्षणे
त्वचा, डोळे आणि श्वसनमार्गात जळजळ.

प्राथमिक उपचार
काम केल्यावर हात चांगले धुवा. संपर्क झाल्यास, त्वचा साबण आणि पाण्याने नीट धुवा. डोळ्यांसाठी पाण्याने नीट धुवा आणि वैद्यकीय सल्ला घ्या.

पिक विषारीपणा: सी.आय.बी. सूचना पाळा.

विषनाशक
थोड्या मात्रेत (10 मि.ग्रा./कि.ग्रा. शरीराच्या वजनापेक्षा कमी) उपचार करण्यापूर्वी उत्तम औषधोपचार पद्धत ही आहे:
1. एपिकॉक सिरप, नंतर 1-2 ग्लास पाणी. प्रौढ आणि 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी औषधाची मात्रा 30 मि.ली. आहे. 12 वर्षांखालील मुलांसाठी औषधाची मात्रा 12 मि.ली. आहे.
2. 30-50 ग्रॅम सक्रिय चारकोल नळाच्या पाण्यात विरघळवा, उलटी थांबल्यानंतर द्या. सोडियम/मॅग्नेशियम सल्फेट 0.25 ग्रॅ./कि. ग्रॅ. नळाच्या पाण्यात केथारिटिक म्हणून द्या.
3. लक्षणांनुसार औषधोपचार करा.

रिकाम्या डब्यांचे निपटारा
1. रिकाम्या डब्यांना फोडून लोकांच्या दृष्टीपासून दूर द्या.
2. रिकाम्या डब्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी त्यांना बाहेर ठेवू नका.
3. रिकामे डबे, उरलेले साहित्य, डबे आणि यंत्र धुण्याचे सावध निपटारा करा जेणेकरुन जल आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही.

साठवणुकीच्या अटी
1. तणनाशक डब्यांचा साठवण वेगळ्या खोलीत किंवा जागी, इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थांच्या साठवणखान्यापासून दूर करावी किंवा तणनाशकाच्या प्रमाणावर आणि स्वभावावर अवलंबून डबे वेगळ्या अलमारीत ठेवा व ताळा ठेवा.
2. तणनाशकांचे साठवणखान किंवा जागा उजेड, मजबूत, कोरडी, हवादार आणि पुरेशी लांबी व रुंदी असावी. ज्यामध्ये वाफेमुळे प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संघटन

अ.क्र.	घटक	वर्णन	प्रमाण
1	ऑक्सिफ्लोर्फेन टेक्निकल	(किमान शुद्धता 70% वजन/वजन)	33.60 % वजन/वजन
2	इमल्सीफायर : एनीऑनिक कॅल्शियम अल्काइल एरिल सल्फोनेट व नॉन-आयोनिक पॉलीऑक्सी एथिलीन ईथर यांचे मिश्रण	–	10.20 % वजन/वजन
3	सायक्लोहेक्सॅनोन	–	13.40 % वजन/वजन
4	विद्रावक : झायलिन (डायमेथिल बेंझीन)	–	42.80 % वजन/वजन
	एकूण		100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

ઓક્સિફ્લોરફેન 23.5 ટકા (ભારે/ભારે)
(નિર્વાચિત વાઘણનાશક)

ઓક્સિફ્લોરફેન 23.5% ઇ.સી. ભાર/ભારે (22.8% ઇ.સી. ભાર/આયતન) નિર્વાચિત વાઘણનાશક છે જેમાં ઓક્સિફ્લોરફેન 23.5% ઇ.સી. સક્રિય તત્વ છે. જેનો ઉપયોગ સીધી વાવણી ચોખા, ચા, બટાટા, ડુંગળી, મગફળી અને મિન્થામાં થતી ઘાસ જેવી પાનવાળા અને મોથા જેવા વાઘણોને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે.

ભલામણ

પાક	નીંદણના નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા (લી.)	અંતિમ છંટકાવ અને પાક કાપણી વચ્ચેનું અંતર (દિવસમાં)	પુનઃ પ્રવેશનો સમયગાળો દરેક છંટકાવ પછી (કલાક)
		સક્રિય તત્વ (ગ્રા.)	સંરચના (મી.લી.)			
મગફળી	સાંવો, મકરજુલિ	100–200	425–850	500–750	–	
ફૂદીનો (મેન્ટા)	સાંવો, મોથા, જંગલી ચોળાઇ, કૃષ્ણનીલ, બથુઆ, કેના, મુસકરી, ભંગરાજ, દૂધી, લવંગા ફૂલ, લુડી, મકોરા, બનતીર્થી	206	904.3	500	10	
ડુંગળી	બથુઆ, ચોળાઇ (જંગલી)	100–200	425–850	500–750	–	
બટાટા	બથુઆ, જંગલી હાલો, પથ્થર ચટ્ટા, હત્સૂરા, મોથા	100–200	425–850	500–750	–	
ધાન (સીધી વાવણી)	સાંવો, મોથા, ભંગડા	150–240	650–1000	500	–	
ચા	મકરજુલિ, કોડો, સિરિસ, મદન ઘાટી	150–250	650–1000	500–750	15	

વાપર માટે સૂચનો
પિંકરક્ષા સાધન: ખેતરમાં પાક પર નિયમિત છંટકાવ (વધારાનું છંટકાવ) માટે ઉપર આપેલા પાણીની માત્રા વાપરો.
સામાન્ય રીતે વપરાતા સ્પ્રેયર છે – બકેટ પમ્પ સ્પ્રેયર, સ્ટિરપ પમ્પ સ્પ્રેયર, નલસેટિક સ્પ્રેયર, વ્હીલ બેરો સ્પ્રેયર,
કંપ્રેશન નલસેટિક સ્પ્રેયર વગેરે. સ્પ્રેયરને ફ્લડ જેટ અથવા ફ્લેટ નોઝલ સાથે વાપરો. નોઝલ જમીનથી સમાન ઊંચાઈએ રાખો.
ક્ષેત્રમાં છંટકાવ સીધી લાઇનમાં નિયમિત ગતિએ કરો.

વાપરનો સમય
રોપણી પહેલાં 3-4 દિવસની અંદર વાપરો.

વાપરનારા માટે સાવધાની
1. ખાદ્ય વસ્તુઓ, ખાદ્ય વસ્તુઓના ખાલી ડબ્બા અને પશુઓના ખોરાકથી દૂર રાખો.
2. મોં, ત્વચા અને આંખોનો સંપર્ક ટાળો.
3. છંટકાવની વાફ શ્વાસ દ્વારા અંદર જતા રોકો. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો.
4. છંટકાવ પછી કપડા અને શરીરના અંગોને સારી રીતે ધોવો.
5. છંટકાવ સમયે ધુમ્રપાન, ખાવું, પીવું અથવા કશું ચાવવું ટાળો.
6. છંટકાવ કરતી વખતે અથવા મિશ્રણ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો.

વિષના લક્ષણો
ત્વચા, આંખો અને શ્વસન માર્ગમાં જળજળ.

પ્રાથમિક સારવાર
કામ પછી હાથ સારી રીતે ધોવો. સંપર્ક થાય તો, ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવો. આંખ માટે પાણીથી સારી રીતે ધોવો અને ડૉક્ટરને બતાવો.

પાક ઝેરીપણું: C.I.B. સૂચનોનું પાલન કરો.

વિષનાશક
થોડી માત્રામાં (10 મિ.ગ્રા./કિ.ગ્રા. શરીરના વજનથી ઓછું) સારવાર પહેલાં શ્રેષ્ઠ દવાઓની પદ્ધતિ છે:
1. એપિકોક સિરપ, પછી 1-2 ગ્લાસ પાણી. પુખ્ત અને 12 વર્ષથી મોટા બાળકો માટે દવાનું પ્રમાણ 30 મિ.લી. છે. 12 વર્ષથી ઓછા બાળકો માટે દવાની માત્રા 12 મિ.લી. છે.
2. 30-50 ગ્રામ સક્રિય ચાર્કોલ નળના પાણીમાં ભળી, ઉલટી બંધ થયા પછી આપો.
3. સોડિયમ/મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ 0.25 ગ્રા./કિ.ગ્રા. નળના પાણીમાં કેટારિટિક રૂપે આપો. લક્ષણ અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બા નિકાલ
1. ખાલી ડબ્બાને ફોડી લોકોની દ્રષ્ટિથી દૂર નાખો.
2. ખાલી ડબ્બાનો ફરી ઉપયોગ અટકાવવા માટે બહાર ન છોડો.
3. ખાલી ડબ્બા, બાકી સામગ્રી, ડબ્બા અને મશીનને ધોવાનો સાવધાનીપૂર્વક નિકાલ કરો જેથી પાણી અને પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય.

સંગ્રહની શરતો
1. વાઘણનાશકના ડબ્બા અલગ રૂમ અથવા જગ્યાએ, અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય વસ્તુઓના સંગ્રહથી દૂર રાખો અથવા વાઘણનાશકની માત્રા અને સ્વભાવ મુજબ ડબ્બા અલગ અલમારીમાં રાખો અને તાળું લગાવો.
2 . વાઘણનાશક સંગ્રહ રૂમ અથવા જગ્યા પ્રકાશ, મજબુત, સૂકી, ઠ અને પૂરતી લંબાઈ-ચૌડાઈની હોવી જોઈએ. જેમાં વાફથી પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક રચના

ક્ર. નં.	ઘટક	વર્ણન	પ્રમાણ
1	ઓક્સિફ્લોર્ફેન ટેક્નિકલ	(ન્યૂનતમ શુદ્ધતા 70% વજન/વજન)	33.60 % વજન/વજન
2	ઇમલ્સીફાયર : એનાયોનિક કેલ્શિયમ એલ્કાઇલ એરિલ સલ્ફોનેટ અને નોન-આયોનિક પોલીઓક્સી ઇથિલિન ઇથરનું મિશ્રણ	–	10.20 % વજન/વજન
3	સાયક્લોહેક્સાનોન	–	13.40 % વજન/વજન
4	દ્રાવક : ઝાઇલિન (ડાઇમેથીલ બેન્ઝિન)	–	42.80 % વજન/વજન
	કુલ		100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੈਨ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਭਾਰ/ਭਾਰ)
(ਚੁਣਿੰਦਾਂ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ)

ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੈਨ 23.5% ਈ.ਸੀ. ਭਾਰ/ਭਾਰ (22.8% ਈ.ਸੀ. ਭਾਰ/ਆਯਤਨ) ਚੁਣਿੰਦਾਂ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੈਨ 23.5% ਈ.ਸੀ. ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਧਾਨ, ਚਾਹ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਮਿੰਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਥਾ ਵਰਗੇ ਘਾਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਘਾਹ-ਫੂੱਸ ਦੇ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ.)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਘੰਟੇ)
		ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੰਰਚਨਾ (ਮੀ.ਲੀ.)			
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਸਾਂਵਾ, ਮਕਰਜੁਲੀ	100–200	425–850	500–750	–	
ਪੁਦੀਨਾ (ਮੈਂਥਾ)	ਸਾਂਵਾ, ਮੋਥਾ, ਜੰਗਲੀ ਚੌਲਾਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨੀਲ, ਬਥੂਆ, ਕੇਨਾ, ਮੁਸਕਰੀ, ਭੰਗਰਾਜ, ਦੂਧੀ, ਲਵੰਗਾ ਫੁੱਲ, ਲੁੜੀ, ਮਕੋਰਾ, ਬੰਤੀਰਥੀ	206	904.3	500	10	
ਪਿਆਜ਼	ਬਥੂਆ, ਚੌਲਾਈ (ਜੰਗਲੀ)	100–200	425–850	500–750	–	
ਆਲੂ	ਬਥੂਆ, ਜੰਗਲੀ ਹਾਲੋ, ਪੱਥਰ ਚੱਟਾ, ਹਤਸੂਰਾ, ਮੋਥਾ	100–200	425–850	500–750	–	
ਧਾਨ (ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ)	ਸਾਂਵਾ, ਮੋਥਾ, ਭੰਗੜਾ	150–240	650–1000	500	–	
ਚਾਹ	ਮਕਰਜੁਲੀ, ਕੋਡੋ, ਸਿਰਿਸ, ਮਦਨ ਘਾਟੀ	150–250	650–1000	500–750	15	

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੌਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ: ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਛਿੜਕਾਅ (ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਛਿੜਕਾਅ) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਹਨ – ਬਕੇਟ ਪੰਪ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਸਟੀਰਪ ਪੰਪ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਵੀਲ ਬੈਰੋ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਆਦਿ। ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਮੂੰਹ, ਤਵਚਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਸਮੇਂ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।
6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਵਿਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਤਵਚਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਾਸਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ।

ਪੌਧ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ : ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ (10 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

1. ਏਪੀਕਾਕ ਸਿਰਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਮਿ.ਲੀ. ਹੈ।
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12 ਮਿ.ਲੀ. ਹੈ।
2. 30-50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਗਰਮ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਉਲਟੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓ।
3. ਸੋਡੀਅਮ/ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 0.25 ਗ੍ਰਾ./ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਥਾਰਟਿਕ ਵਜੋਂ ਦਿਓ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਾੜ ਦਿਓ।
ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਧੋਵਣ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਯਥੇਸ਼ਟ ਲੰਬਾਈ-ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ. ਨੰ.	ਘਟਕ	ਵਰਣਨ	ਮਾਤਰਾ
1	ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੈਨ ਟੈਕਨੀਕਲ	(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 70% ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ)	33.60 % ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ
2	ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ : ਐਨਾਇਓਨਿਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਲਕਾਈਲ ਏਰਿਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਆਇਓਨਿਕ ਪਾਲੀਓਕਸੀ ਈਥਾਈਲੀਨ ਈਥਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ	–	10.20 % ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ
3	ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸਾਨੋਨ	–	13.40 % ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ
4	ਦ੍ਰਾਵਕ : ਜ਼ਾਈਲਿਨ (ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ)	–	42.80 % ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ
	ਕੁੱਲ		100 % ਵਜ਼ਨ/ਵਜ਼ਨ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

অক্সিফ্লোরফেন 23.5 শতাংশ (ভার/ভার)

(নির্বাচিত আগাছানাশক)

অক্সিফ্লোরফেন 23.5% ই.সি. ভার/ভার (22.8% ই.সি. ভার/আয়তন) একটি নির্বাচিত আগাছানাশক, যাতে অক্সিফ্লোরফেন 23.5% ই.সি. সক্রিয় উপাদান রয়েছে। এটি সরাসরি বপন করা ধান, চা, আলু, পেঁয়াজ, চিনাবাদাম এবং মেন্থা ফসলে জন্মানো ঘাসজাতীয় ওড়া পাতার এবং মোথা জাতীয় আগাছা দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সুপারিশ

ফসল	আগাছার নাম	প্রতি হেক্টর পরিমাণ		পানির পরিমাণ (লি.)	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময় (দিনে)	পুনঃ প্রবেশের সময়কাল প্রতিটি ছিটানোর পরে (ঘণ্টা)
		সক্রিয় উপাদান (গ্রা.)	গঠন (মি.লি.)			
চিনাবাদাম	সাঁওয়া, মকরজুলি	100–200	425–850	500–750	–	
পুদিনা (মেন্থা)	সাঁওয়া, মোথা, জংলি চোলাই, কৃষ্ণনীল, বাথুয়া, কেনা, মুসকরি, ভৃঙ্গরাজ, দুধী, লবঙ্গ ফুল, লুড়ি, মকোরা, বনতির্থী	206	904.3	500	10	
পেঁয়াজ	বাথুয়া, চোলাই (জংলি)	100–200	425–850	500–750	–	
আলু	বাথুয়া, জংলি হালো, পাথর চট্টা, হাতসুরা, মোথা	100–200	425–850	500–750	–	
ধান (সরাসরি বপন)	সাঁওয়া, মোথা, ভাঙ্গড়া	150–240	650–1000	500	–	
চা	মকরজুলি, কোদো, সিরিস, মদন ঘাটি	150–250	650–1000	500–750	15	

ব্যবহারের নির্দেশাবলি

উদ্ভিদ সুরক্ষা যন্ত্র: ক্ষেতের ফসলে নিয়মিত স্প্রে (অধিক পরিমাণ স্প্রে) করার জন্য উপরোক্ত পানির পরিমাণ ব্যবহার করুন। সাধারণত ব্যবহৃত স্প্রেয়ার হলো – বালতি পাম্প স্প্রেয়ার, স্টিরাপ পাম্প স্প্রেয়ার, ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, হুইল ব্যারো স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ইত্যাদি। স্প্রেয়ার ফ্লাড জেট অথবা ফ্ল্যাট নোজল সহ ব্যবহার করুন। নোজলটি জমি থেকে একই উচ্চতায় রাখুন। এলাকায় স্প্রে সোজা লাইনে নিয়মিত গতিতে করুন।

ব্যবহারের সময়

অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে রোপণের 3-4 দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা

1. খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্যের খালি পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2. মুখ, ত্বক এবং চোখের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
3. স্প্রের বাষ্প শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে দেবেন না। বাতাসের দিক অনুসারে স্প্রে করুন।
4. স্প্রের পরে দূষিত পোশাক এবং শরীরের অংশগুলি ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন
5. স্প্রের সময় ধূমপান, খাওয়া, পান করা এবং কিছু চিবানো নিষিদ্ধ।
6. স্প্রে করা বা মিশ্রণ করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

ত্বক, চোখ এবং শ্বাসনালীতে জ্বালা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

কাজ শেষ করার পরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলুন। সংস্পর্শে এলে, ত্বক সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। চোখের জন্য পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন এবং চিকিৎসকের কাছে যান।

উদ্ভিদ বিষাক্ততা : সি.আই.বি. নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

বিষনাশক

অল্প মাত্রায় (10 মি.গ্রা./কেজি শরীরের ওজনের কম) চিকিৎসার এক ঘণ্টা আগে সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি নিম্নরূপ:
1. এপিক্যাক সিরাপ, এরপর 1-2 গ্লাস পানি। প্রাপ্তবয়স্ক এবং 12 বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য ওষুধের মাত্রা 30 মি.লি.।
12 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ওষুধের মাত্রা 12 মি.লি.।
2. 30-50 গ্রাম সক্রিয় চারকোল কলের পানিতে গুলে, বমি বন্ধ হওয়ার পরে দিন।
3. সোডিয়াম/ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 0.25 গ্রা./কেজি কলের পানিতে ক্যাথারটিক হিসেবে দিন।
লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডিব্বার নিষ্পত্তি

1. খালি ডিব্বা ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলুন।
2. খালি ডিব্বার পুনঃব্যবহার রোধ করতে সেগুলো বাইরে ফেলে রাখবেন না।
3. খালি ডিব্বা, অবশিষ্ট উপাদান, ডিব্বা এবং যন্ত্র ধোয়ার পানি সাবধানতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করুন যাতে পানি ও পরিবেশ দূষিত না হয়।

সংরক্ষণের শর্তাবলি

1. আগাছানাশকের ডিব্বা আলাদা কক্ষ বা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্যান্য বস্তু বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণস্থান থেকে দূরে রাখতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ডিব্বাগুলো আলাদা আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখুন।
2. আগাছানাশক সংরক্ষণের কক্ষ বা স্থানটি আলোকিত, মজবুত, শুষ্ক, বায়ুচলাচলযুক্ত এবং পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের হতে হবে, যাতে বাষ্পের মাধ্যমে দূষণ না হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্র. নং	উপাদান	বিবরণ	পরিমাণ
1	অক্সিফ্লোরফেন টেকনিক্যাল	(ন্যূনতম বিশুদ্ধতা 70% ওজন/ওজন)	33.60 % ওজন/ওজন
2	ইমালসিফায়ার : অ্যানায়নিক ক্যালসিয়াম অ্যালকাইল এরিল সালফোনেট এবং নন-আয়নিক পলিঅক্সি ইথিলিন ইথারের মিশ্রণ	_	10.20 % ওজন/ওজন
3	সাইক্লোহেক্সানোন	_	13.40 % ওজন/ওজন
4	দ্রাবক : জাইলিন (ডাইমিথাইল বেঞ্জিন)	_	42.80 % ওজন/ওজন
	মোট		100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

ஆக்சிஃப்ளோரஃபென் 23.5 சதவீதம் (எடை/எடை)

(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைநாசினி)

ஆக்சிஃப்ளோரஃபென் 23.5% ஈ.சி. எடை/எடை (22.8% ஈ.சி. எடை/அளவு) என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைநாசினியாகும், இதில் ஆக்சிஃப்ளோரஃபென் 23.5% ஈ.சி. செயலில் உள்ள கூறாக உள்ளது. இது நேரடி விதைப்பு செய்யப்பட்ட நெல், தேயிலை, உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், நிலக்கடலை மற்றும் புதினா பயிர்களில் வளரும் புல்வகை அகல இலைகள் கொண்ட மற்றும் மொத்தா வகை களைகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது.

பரிந்துரை

பயிர்	களை பெயர்கள்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு		தண்ணீர் அளவு (லி.)	கடைசி தெளிப்பு மற்றும் அறுவடைக்கிடையிலான இடைவெளி (நாட்களில்)	மீள் நுழைவு கால அளவு ஒவ்வொரு தெளிப்பிற்குப் பிறகு (மணி)
		செயலில் உள்ள பொருள் (கிராம்)	கலவை (மி.லி.)			
நிலக்கடலை	சாவா, மகர்ஜுலி	100–200	425–850	500–750	–	
புதினா (மெந்தா)	சாவா, மோதா, காட்டுச் சோலை, கிருஷ்ணநீல், பத்துவா, கேனா, முஸ்கரி, பிருங்கராஜ், தூதி, லவங்க மலர், லுடி, மகோரா, பந்தீர்த்தி	206	904.3	500	10	
வெங்காயம்	பத்துவா, சோலை (காட்டு)	100–200	425–850	500–750	–	
உருளைக்கிழங்கு	பத்துவா, காட்டுஹாலோ, கல் சட்டா, ஹட்சூரா, மோதா	100–200	425–850	500–750	–	
நெல் (நேரடி விதைப்பு)	சாவா, மோதா, பங்கடா	150–240	650–1000	500	–	
தேயிலை	மகர்ஜுலி, கோடோ, சிரிஸ், மதன் கட்டி	150–250	650–1000	500 750 –	15	

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்

தாவர பாதுகாப்பு கருவிகள்: வயலில் உள்ள பயிர்களுக்கு வழக்கமான தெளிப்பு (அதிக அளவு தெளிப்பு) செய்ய மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நீரளவை பயன்படுத்தவும். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் தெளிப்பான் கருவிகள் – பக்கெட் பம்ப் தெளிப்பான், ஸ்டிரப் பம்ப் தெளிப்பான், நாப்சாக் தெளிப்பான், வீல் பேரோ தெளிப்பான், கம்பிரஷன் நாப்சாக் தெளிப்பான் போன்றவை. தெளிப்பானை ஃப்ளட் ஜெட் அல்லது ஃப்ளாட் நாசில் உடன் பயன்படுத்தவும். நாசிலை தரையிலிருந்து ஒரே உயரத்தில் வைத்திருங்கள். பகுதியில் நேர்கோட்டில் ஒழுங்கான வேகத்தில் தெளிக்கவும்.

பயன்படுத்தும் காலம்

முளைதல் நடைபெறுவதற்கு முன் நட்டுவைப்பதிலிருந்து 3–4 நாட்களுக்குள் பயன்படுத்தவும்.

பயன்படுத்துவோருக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. உணவுப் பொருட்கள், உணவுப் பொருட்களின் காலியான பாத்திரங்கள் மற்றும் மிருகங்களின் தீவனத்திலிருந்து விலகி வைத்திருங்கள்.
2. வாய், தோல் மற்றும் கண்களுடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் கவனிக்கவும்.
3. தெளிப்பின் வாயு சுவாசத்தின் மூலம் உடலுக்குள் செல்லாமல் கவனிக்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும்.
4. தெளித்த பிறகு மாசடைந்த உடைகள் மற்றும் உடல் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும்.
5. தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், உணவு உட்கொள்வது, குடிப்பது மற்றும் எதையும் மென்றல் கூடாது.
6. தெளிக்கும் அல்லது கலக்கும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்

தோல், கண்கள் மற்றும் சுவாசக் குழாயில் எரிச்சல்.

முதற்கட்ட மருத்துவம்

வேலை முடிந்த பிறகு கைகளை நன்றாக கழுவவும். தொடர்பு ஏற்பட்டால், தோலை சோப்பு மற்றும் நீரால் நன்றாக கழுவவும். கண்களுக்கு நீரால் நன்றாக கழுவி மருத்துவரை அணுகவும்.

தாவர விஷத்தன்மை : சி.ஐ.பி. வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றவும்.

விஷநாசினி

குறைந்த அளவு (10 மி.கி./கி.கி. உடல் எடைக்குக் குறைவாக) சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன் சிறந்த மருத்துவ முறை இதுவாகும்:

1. எபிகாக் சிரப், அதன் பின்னர் 1–2 கிளாஸ் நீர். பெரியவர்கள் மற்றும் 12 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கான மருந்தளவு 30 மி.லி. ஆகும்.
12 வயதிற்குக் குறைந்த குழந்தைகளுக்கான மருந்தளவு 12 மி.லி. ஆகும்.
2. 30–50 கிராம் செயலில் உள்ள சார்கோலை குழாய் நீரில் கரைத்து, வாந்தி நிறுத்தப்பட்ட பிறகு வழங்கவும்.
3. சோடியம்/மக்னீசியம் சல்பேட் 0.25 கிராம்/கி.கி. குழாய் நீரில் கத்தார்டிக் ஆக வழங்கவும்.அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

காலியான டப்பாக்களின் அகற்றுதல்

1. காலியான டப்பாக்களை உடைத்து குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இருந்து தொலைவில் புதைக்கவும்.
2. காலியான டப்பாக்களின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விட்டுவைக்க வேண்டாம்.
3. காலியான டப்பாக்கள், மீதமுள்ள பொருட்கள், டப்பாக்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை கழுவிய நீரை கவனமாக அகற்ற வேண்டும், இதனால் நீரும் சுற்றுச்சூழலும் மாசடையக் கூடாது.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்

1. களைநாசினி டப்பாக்களை தனி அறை அல்லது இடத்தில், பிற பொருட்கள் குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களின் சேமிப்பிடத்திலிருந்து விலகி வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது களைநாசினியின் அளவு மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்ப டப்பாக்களை தனி அலமாரியில் பூட்டி வைத்திருக்க வேண்டும்.
2. களைநாசினி சேமிப்பறை அல்லது இடம் ஒளியுடன், வலுவாக, உலர்ந்ததாக, காற்றோட்டம் உள்ளதாகவும், போதுமான நீளம் அகலம்

வேதியியல் கலவை

வ. எண்	கூறு	விளக்கம்	அளவு
1	ஆக்சிஃப்ளோர்ஃபென் டெக்னிக்கல்	(குறைந்தபட்ச தூய்மை 70% எடை/எடை)	33.60 % எடை/எடை
2	எமல்சிபையர் : அனையோனிக் கால்சியம் ஆல்கைல் ஏரில் சல்போனேட் மற்றும் நான்-அயோனிக் பாலிஆக்சி எத்திலீன் ஈதர் கலவை	–	10.20 % எடை/எடை
3	சைக்க்ளோஹெக்சனோன்	–	13.40 % எடை/எடை
4	கரைப்பான் : ஜைலீன் (டைமெதில் பென்சீன்)	–	42.80 % எடை/எடை
	மொத்தம்		100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ఆక్సీఫ్లోర్ఫెన్ 23.5 శాతం (బరువు/బరువు)

(ఎంచుకున్న కలుపు నివారకం)

ఆక్సీఫ్లోర్ఫెన్ 23.5% ఈ.సి. బరువు/బరువు (22.8% ఈ.సి. బరువు/పరిమాణం) ఎంచుకున్న కలుపు నివారకం, ఇందులో ఆక్సీఫ్లోర్ఫెన్ 23.5% ఈ.సి. క్రియాశీల పదార్థం ఉంది. ఇది నేరుగా విత్తిన వరి, టీ, ఆలుగడ్డ, ఉల్లిపాయ, వేరుశెనగ మరియు పుదీనా పంటల్లో పెరిగే గడ్డి వర్గపు విస్తృత ఆకులు కలిగిన మరియు మోతా వంటి కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

సిఫార్సు

పంట	కలుపు పేర్లు	హెక్టారుకు మోతాదు		నీటి పరిమాణం (లీ.)	చివరి పిచికారీ మరియు కోత మధ్య అంతరం (రోజుల్లో)	మళ్లీ ప్రవేశించే వ్యవధి ప్రతి పిచికారీ తరువాత (గంటలు)
		క్రియాశీల పదార్థం (గ్రా.)	మిశ్రమం (మి.లీ.)			
వేరుసెనగ	సావా, మకర్జులి	100–200	425–850	500–750	–	
పుదీనా (మెంథా)	సావా, మోతా, అడవి చోలై, కృష్ణనీలం, బతువా, కేనా, ముస్కరి, భృంగరాజ్, దూది, లవంగ పువ్వు, లుడి, మకోరా, బంతీర్థి	206	904.3	500	10	
ఉల్లి	బతువా, చోలై (అడవి)	100–200	425–850	500–750	–	
బంగాళాదుంప	బతువా, అడవి హాలో, రాయి చట్టా, హట్సూరా, మోతా	100–200	425–850	500–750	–	
వరి (నేరుగా విత్తనం)	సావా, మోతా, భంగడా	150–240	650–1000	500	–	
టీ	మకర్జులి, కోడో, సిరిస్, మదన్ ఘాటి	150–250	650–1000	500–750	15	

వినియోగానికి మార్గదర్శకాలు

వృక్ష రక్షణ పరికరాలు: పొలాలలోని పంటలపై నియమిత పిచికారీ (ఎక్కువ మోతాదు పిచికారీ) చేయడానికి పైగా పేర్కొన్న నీటి పరిమాణాన్ని ఉపయోగించాలి.
సాధారణంగా ఉపయోగించే స్ప్రేయర్లు – బకెట్ పంప్ స్ప్రేయర్, స్టిరప్ పంప్ స్ప్రేయర్, న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, వీల్ బారో స్ప్రేయర్,
కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ మొదలైనవి. స్ప్రేయర్‌ను ఫ్లడ్ జెట్ లేదా ఫ్లాట్ నాజిల్‌తో ఉపయోగించాలి. నాజిల్‌ను నేల నుండి ఒకే
ఎత్తులో ఉంచాలి. ప్రాంతంలో నేరుగా గీతలో నియమిత వేగంతో పిచికారీ చేయాలి.

వినియోగ సమయం

మొలకెత్తే ముందు నాటిన తరువాత 3–4 రోజులలోపు ఉపయోగించాలి.

వినియోగదారుల కోసం జాగ్రత్తలు

1. ఆహార పదార్థాలు, ఆహార పదార్థాల ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశువుల మేత నుండి దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోరు, చర్మం మరియు కళ్లతో సంపర్కం కాకుండా చూసుకోవాలి.
3. పిచికారీ నుండి వచ్చే ఆవిరి శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. గాలి దిశలో పిచికారీ చేయాలి.
4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి.
5. పిచికారీ సమయంలో పొగ త్రాగడం, తినడం, త్రాగడం లేదా ఏదైనా నమలడం చేయరాదు.
6. పిచికారీ చేయడం లేదా కలపడం సమయంలో పూర్తిగా రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి.

విష లక్షణాలు

చర్మం, కళ్ల మరియు శ్వాసనాళంలో మండటం.

ప్రాథమిక చికిత్స

పని చేసిన తరువాత చేతులను బాగా కడగాలి. సంపర్కం జరిగినట్లయితే, చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. కళ్ల కోసం
నీటితో బాగా కడిగి వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

మొక్కల విషపూరితత : సి.ఐ.బి. మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలి.

విషనాశకము

తక్కువ మోతాదు (10 మి.గ్రా./కిలో శరీర బరువుకంటే తక్కువ) చికిత్సకు ఒక గంట ముందు ఉత్తమ వైద్య విధానం ఈ విధంగా ఉంది:

1. ఎపికాక్ సిరప్, తరువాత 1–2 గ్లాసుల నీరు. పెద్దలు మరియు 12 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ఔషధ మోతాదు 30 మి.లీ.
12 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ఔషధ మోతాదు 12 మి.లీ.
2. 30–50 గ్రాముల క్రియాశీల చార్కోల్‌ను నల్ల నీటిలో కలిపి, వాంతులు ఆగిన తరువాత ఇవ్వాలి.
3. సోడియం/మ్యాగ్నీషియం సల్ఫేట్ 0.25 గ్రా./కిలో నల్ల నీటిలో కాథార్టిక్‌గా ఇవ్వాలి.
లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వాహణ

1. ఖాళీ డబ్బాలను పగలగొట్టి జనావాస ప్రాంతాల నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.
2. ఖాళీ డబ్బాల పునర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి వాటిని బయట వదలరాదు.
3. ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిన పదార్థాలు, డబ్బాలు మరియు యంత్రాలను కడిగిన నీటిని జాగ్రత్తగా నిర్వాహించాలి, తద్వారా నీరు మరియు పర్యావరణం కలుషితం కాకూడదు.

నిల్వ నిబంధనలు

1. కలుపు నివారక డబ్బాలను వేరే గది లేదా ప్రదేశంలో, ఇతర వస్తువులు ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల నిల్వ స్థలాల నుండి దూరంగా ఉంచాలి లేదా కలుపు నివారక పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి డబ్బాలను వేరే అల్మారాలో తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి.
2. కలుపు నివారక నిల్వ గది లేదా ప్రదేశం వెలుతురు కలిగి, బలంగా, పొడిగా, గాలి ప్రసరణ కలిగి మరియు తగిన పొడవు వెడల్పుతో ఉండాలి, అందులో ఆవిరి ద్వారా కాలుష్యం కలగకూడదు.

రసాయన సంయోజనము

క్రమ.సం.	ఘటకం	వివరణ	మోతాదు
1	ఆక్సీఫ్లోర్ఫెన్ టెక్నికల్	(కనీస స్వచ్ఛత 70% బరువు/బరువు)	33.60 % బరువు/బరువు
2	ఎమల్సిఫైయర్లు : అనయానిక్ కాల్షియం ఆల్కైల్ ఏరిల్ సల్ఫోనేట్ మరియు నాన్-అయానిక్ పోలీఆక్సీ ఎథిలీన్ ఈథర్ మిశ్రమం	–	10.20 % బరువు/బరువు
3	సైక్లోహెక్సానోన్	–	13.40 % బరువు/బరువు
4	ద్రావకం : జైలీన్ (డైమెథిల్ బెంజీన్)	–	42.80 % బరువు/బరువు
	మొత్తం		100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರಫೆನ್ 23.5 ಶೇಕಡಾ (ತೂಕ/ತೂಕ)

(ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರಫೆನ್ 23.5% ಇ.ಸಿ. ತೂಕ/ತೂಕ (22.8% ಇ.ಸಿ. ತೂಕ/ಪರಿಮಾಣ) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರಫೆನ್ 23.5% ಇ.ಸಿ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯ ಅಕ್ಕಿ, ಚಹಾ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲು ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೃತ ಎಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಮೋಥಾ ವರ್ಗದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರಮಾಣ		ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಮರು ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ (ಗಂಟೆಗಳು)
		ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಮಿ.ಲೀ.)			
ಶೇಂಗಾ	ಸಾವಾ, ಮಕರಜುಲಿ	100–200	425–850	500–750	–	
ಪುದಿನಾ (ಮೆಂಥಾ)	ಸಾವಾ, ಮೋಥಾ, ಕಾಡು ಚೋಳೈ, ಕೃಷ್ಣನೀಲ, ಬತುಆ, ಕೇನಾ, ಮುಸ್ಕರಿ, ಭೃಂಗರಾಜ್, ದೂಧಿ, ಲವಂಗ ಹೂವು, ಲುಡಿ, ಮಕೋರಾ, ಬಂತೀರ್ಥಿ	206	904.3	500	10	
ಈರುಳ್ಳಿ	ಬತುಆ, ಚೋಳೈ (ಕಾಡು)	100–200	425–850	500–750	–	
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಬತುಆ, ಕಾಡು ಹಾಲೋ, ಕಲ್ಲು ಚಟ್ಟಾ, ಹತ್ಸೂರಾ, ಮೋಥಾ	100–200	425–850	500–750	–	
ಭತ್ತ (ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ)	ಸಾವಾ, ಮೋಥಾ, ಭಂಗಡಾ	150–240	650–1000	500	–	
ಚಹಾ	ಮಕರಜುಲಿ, ಕೊಡೋ, ಸಿರಿಸ್, ಮದನ್ ಘಾಟಿ	150–250	650–1000	500–750	15	

ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಸ್ಯರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು: ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಿಂಪಡಣೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆ) ಮಾಡಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳು – ಬಕೆಟ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಟಿರಪ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವೀಲ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್,
ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಜಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ನೋಜಲ್ ಅನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಒಂದೇ
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನೆಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ 3–4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
2. ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
3. ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಷ್ಪ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
4. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಚವೆಯುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ.
6. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತ್ವ : ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ವಿಷನಾಶಕ

ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (10 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ/ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ:

1. ಎಪಿಕಾಕ್ ಸಿರಪ್, ನಂತರ 1–2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ 30 ಮಿ.ಲಿ.
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ 12 ಮಿ.ಲಿ.
2. 30–50 ಗ್ರಾಂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ವಾಂತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
3.ಸೋಡಿಯಂ/ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 0.25 ಗ್ರಾಂ/ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥಾರ್ಟಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ

1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೂಳಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು.
3. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣದ ಷರತ್ತುಗಳು

1. ಕಳೆನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು.
2. ಕಳೆನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಬಲವಾದ, ಒಣ, ಗಾಳಿಚಲನೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಪದ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಾರದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್ಫೆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್	(ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 70% ತೂಕ/ತೂಕ)	33.60 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್‌ಗಳು : ಅನಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಏರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಐಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಈಥರ್ ಮಿಶ್ರಣ	–	10.20 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್	–	13.40 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ದ್ರಾವಕ : ಜೈಲೀನ್ (ಡೈಮೆಥೈಲ್ ಬೆನ್ಜೀನ್)	–	42.80 % ತೂಕ/ತೂಕ
	ಒಟ್ಟು		100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ഓക്സിഫ്ലോറഫെൻ 23.5 ശതമാനം (ഭാരം/ഭാരം)

(തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കളനാശിനി)

ഓക്സിഫ്ലോറഫെൻ 23.5% ഇ.സി. ഭാരം/ഭാരം (22.8% ഇ.സി. ഭാരം/ആയതനം) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കളനാശിനിയാണ്, ഇതിൽ ഓക്സിഫ്ലോറഫെൻ 23.5% ഇ.സി. സജീവ ഘടകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നേരിട്ട് വിതച്ച നെല്ല്, ചായ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ളി, നിലക്കടല, പുതിന എന്നിവയിൽ വളരുന്ന പുല്ല് വർഗ്ഗത്തിലുള്ള വീതിയുള്ള ഇലകളും മോതാ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കളകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശ

വിള	കളനാമങ്ങൾ	ഹെക്ടറിന്റെ അളവ്		വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് (ലി.)	അവസാന സ്പ്രേയും വിളവെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള (ദിവസങ്ങളിൽ)	വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി ഓരോ തളിക്കലിനുശേഷം (മണിക്കൂർ)
		സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഘടന (മി.ലി.)			
നിലക്കടല	സാവാ, മകർജൂലി	100 – 200	425–850	500–750	–	
പുതിന (മെന്ത)	സാവാ, മോത്ത, കാട്ടുചോളൈ, കൃഷ്ണനീൽ, ബതുവ, കെന, മുസ്കരി, ഭൃംഗരാജ്, ദൂധി, ലവംഗപൂവ്, ലുടി, മകോര, ബന്തീർത്തി	206	904.3	500	10	
ഉള്ളി	ബതുവ, ചോളൈ (കാട്ടു)	100–200	425–850	500–750	–	
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ബതുവ, കാട്ടുഹാലോ, കല്ലുചട്ട, ഹത്സൂര, മോത്ത	100–200	425–850	500–750	–	
നെല്ല് (നേരിട്ട വിത്തിടൽ)	സാവാ, മോത്ത, ഭംഗട	150–240	650–1000	500	–	
ചായ	മകർജൂലി, കൊടോ, സിരിസ്, മദൻ ഘാട്ടി	150–250	650–1000	500–750	15	

ഉപയോഗത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ: കൃഷിയിടത്തിലെ വിളകളിൽ സാധാരണ തളിക്കൽ (കൂടുതൽ അളവിലുള്ള തളിക്കൽ) നടത്തുന്നതിനായി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഉപയോഗിക്കുക.
സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ ഉപകരണങ്ങൾ – ബക്കറ്റ് പമ്പ് സ്പ്രേയർ, സ്റ്റിറപ്പ് പമ്പ് സ്പ്രേയർ, നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, വീൽ ബാരോ സ്പ്രേയർ, കമ്പ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ എന്നിവ. സ്പ്രേയറിനെ ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. നോസിൽ നിലത്തുനിന്ന് ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിലനിർത്തുക. പ്രദേശത്ത് നേരായ വരയിൽ സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ തളിക്കുക.

ഉപയോഗ സമയക്രമം

മുളപ്പുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നട്ടുവച്ചതിന് ശേഷം 3–4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലെ സൂക്ഷിക്കുക.
2. വായ, ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
3. തളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാഷ്പം ശ്വാസത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുക.
4. തളിച്ച ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. തളിക്കൽ സമയത്ത് പുകവലി, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, കുടിക്കൽ, എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കൽ എന്നിവ പാടില്ല.
6. തളിക്കുമ്പോഴും കലർത്തുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ

ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ, ശ്വസനനാളം എന്നിവയിൽ ജലനം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ

ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൈകൾ നന്നായി കഴുകുക. സമ്പർക്കം സംഭവിച്ചാൽ, ചർമ്മം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചും നന്നായി കഴുകുക. കണ്ണുകൾക്കായി
വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുകയും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സസ്യവിഷത്വം : സി. ഐ. ബി. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

വിഷനാശിനി

കുറഞ്ഞ അളവിൽ (10 മി.ഗ്രാം/കിലോ ശരീരഭാരത്തിൽ താഴെ) ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ രീതി ഇപ്രകാരമാണ്:
1. എപിക്കാക് സിറപ്പ്, തുടർന്ന് 1–2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. മുതിർന്നവർക്കും 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും മരുന്നിന്റെ അളവ് 30 മി.ലി. ആണ്.
12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്നിന്റെ അളവ് 12 മി.ലി. ആണ്.
2. 30–50 ഗ്രാം സജീവ ചാർക്കോൾ കുഴൽവെള്ളത്തിൽ കലക്കി, ഛർദ്ദി നിൽക്കുന്നതിന് ശേഷം നൽകുക.
3. സോഡിയം/മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 0.25 ഗ്രാം/കിലോ കുഴൽവെള്ളത്തിൽ കാതാർട്ടിക് ആയി നൽകുക.
ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുക.

ഒഴിഞ്ഞ ഡബ്ബകളുടെ നിക്ഷേപം

1. ഒഴിഞ്ഞ ഡബ്ബകൾ തകർത്ത് ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചുമൂടുക.
2. ഒഴിഞ്ഞ ഡബ്ബകളുടെ പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിനായി അവ പുറത്തുവെക്കരുത്.
3. ഒഴിഞ്ഞ ഡബ്ബകൾ, ശേഷിച്ച വസ്തുക്കൾ, ഡബ്ബകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി നിക്ഷേപിക്കുക, ഇതിലൂടെ വെള്ളവും പരിസ്ഥിതിയും മലിനമാകാതിരിക്കണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ

1. കളനാശിനി ഡബ്ബകൾ വേറിട്ട മുറിയിലോ സ്ഥലത്തിലോ, മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സംഭരണസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അകലെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കളനാശിനിയുടെ അളവും സ്വഭാവവും ആശ്രയിച്ച് ഡബ്ബകൾ വേറിട്ട അലമാരയിൽ പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുക.
2. കളനാശിനി സംഭരണ മുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പ്രകാശമുള്ളതും, ശക്തവുമായതും, വരണ്ടതും, നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും, ആവശ്യമായ നീളവും വീതിയും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. അതിൽ വാഷ്പം മൂലം മലിനീകരണം ഉണ്ടാകരുത്..

രാസ ഘടന

ക്ര. നം.	ഘടകം	വിവരണം	അളവ്
1	ഓക്സിഫ്ലോർഫെൻ ടെക്നിക്കൽ	(കുറഞ്ഞത് ശുദ്ധി 70% ഭാരം/ഭാരം)	33.60 % ഭാരം/ഭാരം
2	ഇമൾസിഫയർ : അനയോണിക് കാല്ഷ്യം ആൽക്കൈൽ ഏരിൽ സൾഫോണേറ്റ് കൂടാതെ നോൺ-ഐയോണിക് പോളിഓക്സി എഥിലീൻ ഈതർ മിശ്രണം	–	10.20 % ഭാരം/ഭാരം
3	സൈക്ലോഹെക്സനോൺ	–	13.40 % ഭാരം/ഭാരം
4	ദ്രാവകം : സൈലിൻ (ഡൈമെത്തിൽ ബെൻസീൻ)	–	42.80 % ഭാരം/ഭാരം
	ആകെ		100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

آکسی فلورفین 23.5 فیصد (وزن/وزن)

(منتخب جڑی بوٹی مار)

آکسی فلورفین 23.5% ای-سی وزن/وزن (22.8% ای-سی وزن/حجم) ایک منتخب جڑی بوٹی مار ہے جس میں آکلورفین ای-سی فعال جزو موجود ہے۔ اس کا استعمال براہِ راست بوئی گئی دھان، چائے، آلو، پیاز، مونگ پھلی اور پودینہ 23.5% میں پیدا ہونے والی گھاس نما چوڑی پتی والی اور موتھا قسم کی جڑی بوٹیوں کی روک تھام کے لیے کیا جاتا ہے۔

سفارشات

فصل	جڑی بوٹیوں کے نام	سفارش				
		فعال جزو (گرام)	ترکیب (ملی لیٹر)	پانی کی مقدار (لیٹر)	آخری اسپرے اور فصل کی کٹائی کے درمیان وقفہ (دنوں میں)	دوبارہ داخلے کی مدت ہر چھڑکاؤ کے بعد (گھنٹے)
مونگ پھلی	سانوا، مکرجولی	100–200	425–850	500–750	–	
پودینہ (مینتھا)	سانوا، موتھا، جنگلی چولائی، کرشن نیل، بتھوا، کینا، مسکری، بھنگراج، دودھی، لونگ پھول، لوڑی، مکورا، بنتیرتھی	206	904.3	500	10	
پیاز	بتھوا، چولائی (جنگلی)	100–200	425–850	500–750	–	
آلو	بتھوا، جنگلی ہالو، پتھر چٹا، ہتسورا، موتھا	100–200	425–850	500–750	–	
دھان (براہ راست بوائی)	سانوا، موتھا، بھنگڑا	150–240	650–1000	500	–	
چائے	مکرجولی، کوڈو، سرس، مدن گھاٹی	150–250	650–1000	500–750	15	

استعمال کے لیے ہدایاتاستعمال کے لیے ہدایات

پودوں کے تحفظ کے آلات: کھیت کی فصلوں پر باقاعدہ چھڑکاؤ (زیادہ مقدار میں چھڑکاؤ) کے لیے پانی کی مقدار اوپر دی گئی ہے۔
عام طور پر استعمال ہونے والے اسپرے آلات یہ ہیں – بالٹی پمپ اسپرے، اسٹرپ پمپ اسپرے، نیپ سیک ،اسپرے، وہیل بیرو اسپرے
کمپریشن نیپ سیک اسپرے وغیرہ۔ اسپرے کو فلڈ جیٹ یا فلیٹ نوزل کے ساتھ استعمال کریں۔ نوزل کو زمین سے ایک ہی
اونچائی پر رکھیں۔ علاقے میں سیدھی لائن میں باقاعدہ رفتار سے چھڑکاؤ کریں۔

استعمال کا وقت

اگاؤ سے پہلے پیوندکاری کے بعد 3-4 دن کے اندر استعمال کریں۔

استعمال کنندگان کے لیے احتیاطی تدابیر

1. غذائی اشیاء، غذائی اشیاء کے خالی برتنوں اور مویشیوں کے چارے سے دور رکھیں۔
2. منہ، جلد اور آنکھوں کے ساتھ رابطے سے بچیں۔
3. چھڑکاؤ کی بھاپ کو سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے بچائیں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں۔
4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔
5. چھڑکاؤ کے دوران تمباکو نوشی، کھانا، پینا اور کچھ چبانا منع ہے۔
6. چھڑکاؤ کرتے یا محلول بناتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔

زہر کی علامات

جلد، آنکھوں اور سانس کی نالی میں جلن۔

ابتدائی طبی امداد

کام کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ رابطہ ہونے کی صورت میں جلد کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ آنکھوں کے لیے
پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

پودوں کی زہریت : سی-آئی-بی ہدایات پر عمل کریں۔

ضدِ زہر

کم مقدار (10 ملی گرام/کلوگرام جسمانی وزن سے کم) کی صورت میں علاج سے ایک گھنٹہ پہلے بہترین طبی طریقہ درج ذیل ہے:

1. اپیکاک شربت، اس کے بعد 1-2 گلاس پانی۔ بالغوں اور 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے دوا کی مقدار 30 ملی لیٹر ہے۔
12 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے دوا کی مقدار 12 ملی لیٹر ہے۔
2. 30-50 گرام فعال چارکول نل کے پانی میں گھول کر، قے رکنے کے بعد دیں۔
3. سوڈیم/میگنیشیم سلفیٹ 0.25 گرام/کلوگرام نل کے پانی میں بطور کیتھارٹک دیں۔
علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کی تلفی

1. خالی ڈبوں کو توڑ کر آبادی سے دور دفن کریں۔
2. خالی ڈبوں کے دوبارہ استعمال کو روکنے کے لیے انہیں باہر مت چھوڑیں۔
3. خالی ڈبے، بچا ہوا مواد، ڈبوں اور مشینوں کے دھوئے ہوئے پانی کی احتیاط سے تلفی کریں تاکہ پانی اور ماحول آلودہ نہ ہو۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط

1. جڑی بوٹی مار کے ڈبوں کو الگ کمرے یا جگہ پر، دیگر اشیاء خصوصاً غذائی اشیاء کے ذخیرہ کرنے کی جگہ سے دور رکھنا چاہیے یا جڑی بوٹی مار کی مقدار اور نوعیت کے مطابق ڈبوں کو الگ الماری میں تالا لگا کر رکھیں۔
2. جڑی بوٹی مار کے ذخیرہ کرنے کا کمرہ یا جگہ روشن، مضبوط، خشک، ہوادار اور مناسب لمبائی اور چوڑائی کی ہونی چاہیے، جس میں بھاپ کے ذریعے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی ترکیب

کیمیائی ترکیب

شمارہ	جزو	وضاحت	مقدار
1	آکسی فلورفین ٹیکنیکل	(کم از کم خالصیت 70% وزن/وزن)	33.60 % وزن/وزن
2	ایملسیفائر : اینیونک کیلشیم الکائل ایرائل سلفونیٹ اور نان آئنک پولی آکسی ایتھلین ایتھر کا مرکب	_	10.20 % وزن/وزن
3	سائیکلوہیکسانون	_	13.40 % وزن/وزن
4	محلل : زائلین (ڈائی میتھائل بینزین)	_	42.80 % وزن/وزن
	کل		100 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu