AgroStar®

PARAQUIT

Paraquat Dichloride 24% SL
(Contact Herbicide)

पैराक्विट
पैराकाट डाईक्लोराइड 24 प्रतिशत घुलनशील तरल
(स्पर्शीय खरपतवारनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Paraquat Dichloride 24% SL
(Contact Herbicide)

It is non selective, contact herbicide which containing 24% w/w active ingredient, Paraquat Dichloride a.i. by mass balance adjuvants.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weed	Dosage / HA (AI Kgs)	Dosage / HA Formulation (Ltr.)	Dilution in Water (Ltrs)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
—	B. Hydrilla	1–1.5 ppm in water	4.2	600	—	—
Aquatic Weeds	A. Eichhonia crassipes,	1	4.25–1000	600–1000	—	—
Cotton	Digera arvensis Cyperus iria	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	—
Grapes	Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus sp. portulaca sp. Tridax Sp.	0.5	2.5	500	90	—
Potato	Chenopodium sp. Angallis arvensis Trianthema monogyna Cyperus rotundus	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	—
Rice	Ageratum conyzides, Commelina benghalensis Echinochloa crusgalli, Panicumrepens Cyperus iria, Brachiaria mutoca,	0.3–0.8	1.25–4.0	250	—	—
Rubber	Digitaria Sp. Eragrostis Sp. Fimbristylis Sp.	0.3–0.6	1.25–2.5	670	—	—
Tea	Imperata cylindrica Seteria sp. Commelina benhgalensis Boerhavia hispida Paspalum conjugatum	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	NA	—
Wheat	Grassy & Broadleaved weeds.	1	4.25	500	120–150	—

Direction Of Use
Plant Protection equipment used: Use manually operated Knapsack sprayer or hand compression sprayer or foot sprayer or motorized sprayer etc.

Time of Application: Refer to CIB Guidelines

Precautions
1. Avoid inhalation and skin contact while diluting.Do not mix with bare hands.
2. The users should use full protective clothings which include rubber gloves, boots and either face shield or mdust mask and overall rubber apron, hood or hat.

Symptoms Of Poisoning
Irritaion, nose bleeding, abdominal discomfort, loseness of bowels & signs of liver and kidney failure etc.

First Aid
If swallowed, induce vomiting by tickling the back of the throat. If clothing is contaminated, wash the same with soap and water. Wash contaminated skin and clothes and irrigate eyes with plenty of water. If inhales, remove the patient in the fresh air.

Phytotoxicity
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote
Induce vomiting repeatedly and wash out stomach. Give 500ml. of 30% suspension of sterilized bento or fullers earh orally. repeat after 2-4 hours. Treat Symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. It shall be the duty of manufactures, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitaion.

Storage Conditions
1. The packages containing the herbicide shall be stored in seperate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing othe articles particularly articles or shall be kept in seperate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well -lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Weight
1	Cocoamine ethoxylate	04.00 % w/w
2	Emetic Dye	00.05 % w/w
3	Water	QS % w/w
4	Nonyl phenol ethylene oxide condensate	01.00 % w/w
5	Silicone – Defoamer	00.10 % w/w
6	Dye acid blue	00.05 % w/w
7	Paraquat Dichloride Tech (based on 100% w/w a.i.)	24.00 % w/w
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

पैराकाट डाईक्लोराइड 24 प्रतिशत घुलनशील तरल
(स्पर्शीय खरपतवारनाशक)

यह एक अचुनिंदा स्पर्शीय घास-पात नाशक है, जिसमें भार के हिसाब से 24 प्रतिशत सक्रिय तत्व पैराक्वाट डाईक्लोराइड 24 प्रतिशत घुलनशील तरल है तथा शेष अन्य सहायक पदार्थ हैं।

उपयोग

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (किग्रा.)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (लीटर.)	पानी में घोल (लीटर)	अंतिम छिड़काव से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिन)	प्रत्येक उपयोग के बाद पुनः प्रवेश (घंटे)
—	ब. हाइडिला	पानी में 1–1.5 में पी. पी. एम.	4.2	600	—	—
जलीय खरपतवार	अ. जलकुंभी	1	4.25–1000	600–1000	—	—
कपास	लहसुआ फूला मोथा	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	—
अंगूर	मोथा, दूब घास, कुल्फा, फूलनी	0.5	2.5	500	90	—
आलू	बथुआ, कृष्णनील, पत्थरचट्टा, मोथा	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	—
धान	महा-कौआ कनकौआ समां कोच घास मोथा वंदरी	0.3–0.8	1.25–4.0	250	—	—
रबर	क्रेब घास रामदाना बडाकोरा	0.3–0.6	1.25–2.5	670	—	—
चाय	लॉगली वदरा-वदरी नकउआ मदन मथी गढीली घास	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	जरूरी नहीं	—
गेहूं	घास व चौडी पत्ती वाले खरपतवार	1	4.25	500	120–150	—

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
उपयोग में आने वाले पौध संरक्षण उपकरण: हाथ से चलने वाला नैपसैक स्प्रेयर, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर या मोटर चालित स्प्रेयर आदि।

प्रयोग का समय: सीआईबी दिशानिर्देशों का संदर्भ लें|

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
घासपातनाशक को सूघे नही तथा स्पर्श से बचें। घासपातनाशक को नंगे हाथों से न मिलाऐं। उपयोगकर्ता को बचाव के पूरे कपडें तथा रबर के दस्ताने, जूते, मंुह ढकने का मुखौटा, कन्टोप तथा एक पूरे शरीर को ढकने वाला ओवर कोट व हैट शामिल है।

विष के लक्षण
जलन, नाक से खून आना, पेट में असुविधा, दस्त तथा यकृत और गुर्दे की विफलता के लक्षण आदि।

प्राथमिक उपचार
यदि निगल लिया गया हो, तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं। यदि कपड़े दूषित हो जाएं, तो साबुन और पानी से धोएं।
दूषित त्वचा और कपड़ों को धोएं तथा आंखों को पर्याप्त पानी से धोएं। यदि श्वास द्वारा गया हो, तो रोगी को ताजी हवा में ले जाएं।

पौधविशाक्तता
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें ।

विष नाशक
रोगी को बार बार उल्टी कराकर पेट साफ करायें। स्टेरिलाइज्ड बेन्टोनाइट या मिटटी का 30 प्रतिशत का घोल 500
मिली. मुँह से दें। 2 से 4 घटों बाद यह प्रकिया दोहराएँ। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. निर्माताओंर्मा तथा उपयोगकर्ताओंर्ता का कर्तव्यर्त है कि खाली डिब्बों या बची हुई दवाओ और धोवन का निपटारा सुरक्षित
तरीके से इस प्रकार करें कि जिससे पीने के पानी तथा वातावरण के प्रदूषण को रोका जा सके।
2. प्रयोग किये गये डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिये बाहर खला न छोड़ें।
3. पैकेटो को उपयोग के बाद तोडफोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

संग्रहण की शर्ते
1. घासपातनाशक के पैकेटो को अलग - अलग कमरो में खाघ पदार्थ रखे जाने वाले कमरो से दरू अलग जगह पर या आलमारियो में दवा के प्रमाण एवं प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में अलग - अलग रखें।
2. जिस कमरें या जगह में घासपातनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयकु , हवादार
तथा पर्याप्तर्या लम्बा चौडा होना चाहिये।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक	भार
1	कोको अमिनो इथोक्सिलेट	04.00 % भार/भार
2	एमेटिक डाई	00.05 % भार/भार
3	पानी	पर्याप्तर्या मात्रा % भार/भार
4	नोनिल फिनोल एथिलीन ऑक्साइड कंडेन्सेट	01.00 % भार/भार
5	सिलिकॉन – डीफोमर	00.10 % भार/भार
6	डाई एसिड नीला	00.05 % भार/भार
7	पेराकाट डाइक्लोराइड ए. आई भारानसार 100 प्रतिशत स.त. पर आधारित	24.00 % भार/भार
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

पॅराक्वाट डाय क्लोराइड 24% एस.एल.
(संपर्क तणनाशक)

हे एक नॉन-सेलेक्टिव, संपर्क तणनाशक असून त्यात 24% w/w सक्रिय घटक पॅराक्वाट डाय-क्लोराईड आहे व उर्वरित भाग ॲडजुव्हंट्सचा आहे.

शिफारस

पीक	तणाचे सामान्य नाव	मात्रा / हेक्टर सक्रिय घटक (कि.ग्रा.)	मात्रा / हेक्टर फॉर्म्युलेशन (ली.)	पाण्यात मिसळण्याचे प्रमाण (ली.)	शेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	फवारणीनंतर पुन्हा प्रवेश (तास)
—	हायड्रिला (हायड्रिला)	पाण्यात 1–1.5 पीपीएम	4.2	600	–	–
जलतण	जलकुंभी (आयकोर्निया क्रॅसिप्स)	1	4.25–1000	600–1000	–	–
कापूस	डिगेरा (डिगेरा अर्वेन्सिस), मोथा (सायपेरस इरिया)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	–
द्राक्ष	नागरमोथा (सायपेरस रोटंडस), दुर्वा (साइनोडॉन डॅक्टिलॉन), हिरणखुरी (कॉन्वॉल्वुलस), कुलफा (पोर्टुलाका), ट्रायडॅक्स (ट्रायडॅक्स)	0.5	2.5	500	90	–
बटाटा	चाकवत (चेनोपोडियम), नीलकंठी (अनॅगॅलिस अर्वेन्सिस), सांठी (ट्रायअँथेमा मोनोगायना), मोथा (सायपेरस रोटंडस)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	–
भात	सहदेवी (एगेरॅटम कोनायझॉइड्स), केंचरा (कोमेलिना बेंघालेन्सिस), सांवा (एकिनोक्लोआ क्रूसगॅली), कांस (पॅनिकम रेपेन्स), मोथा (सायपेरस इरिया), ब्रॅकियारिया (ब्रॅकियारिया म्युटिका)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	–	–
रबर	क्रॅब गवत (डिजिटेरिया), लव्ह गवत (एराग्रोस्टिस), फिम्ब्रिस्टायलिस (फिम्ब्रिस्टायलिस)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	–	–
चहा	कांस गवत (इम्पेराटा सिलिंड्रिका), लोमडी शेपटी गवत (सेटेरिया), केंचरा (कोमेलिना बेंघालेन्सिस), पुनर्नवा (बोएरहाविया हिस्पिडा), पास्पालम (पास्पालम कंजुगेटम)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	लागू नाही	–
गहू	गवत व रुंद पानांचे तण	1	4.25	500	120–150	–

वापरासाठी सूचना
वापरात येणारी वनस्पती संरक्षण उपकरणे: हाताने चालविणारा नॅपसॅक स्प्रेयर, हँड कंप्रेशन स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर किंवा मोटर चालित स्प्रेयर इत्यादी वापरावेत.

फवारणीची वेळ:
सीआयबी (CIB) मार्गदर्शक सूचनांनुसार करा.

काळजी
1. द्रावण तयार करताना श्वसनाद्वारे आत जाणे व त्वचेचा संपर्क टाळावा. उघड्या हाताने मिसळू नये.
2. वापरकर्त्यांनी पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे वापरावेत, ज्यामध्ये रबर हातमोजे, बूट तसेच फेस शिल्ड किंवा डस्ट मास्क आणि रबर एप्रन, हुड किंवा टोपी यांचा समावेश आहे.

विषबाधेची लक्षणे
चिडचिड, नाकातून रक्तस्राव, पोटातील अस्वस्थता, जुलाब व यकृत आणि मूत्रपिंड निकामी होण्याची लक्षणे इत्यादी.

प्राथमिक उपचार
गिळल्यास घशाच्या मागील भागाला स्पर्श करून उलटी करावी. कपडे दूषित झाल्यास साबण व पाण्याने धुवावेत. दूषित त्वचा व कपडे धुवावेत आणि डोळे भरपूर पाण्याने धुवावेत. श्वसनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णाला ताजी हवा मिळेल अशा ठिकाणी हलवावे.

फायटो-टॉक्सिसिटी
शिफारस केलेल्या प्रमाणात वापरल्यास हे उत्पादन पिकांसाठी अपायकारक नाही.

प्रतिविष
वारंवार उलटी करून पोट स्वच्छ करावे. 30% निर्जंतुक बेंटोनाइट किंवा फुलर्स अर्थचे 500 मि.ली. सस्पेंशन तोंडावाटे द्यावे. 2–4 तासांनी पुन्हा द्यावे. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट
1. तणनाशकाचे उत्पादक, फॉर्म्युलेटर व वापरकर्त्यांनी पर्यावरण व पाणी प्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेज, उरलेली सामग्री व धुण्याचे पाणी सुरक्षितरीत्या नष्ट करावे.
2. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर ठेवू नयेत.
3. पॅकेजेस फोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावीत.

साठवणूक अटी
1. तणनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तूंपासून दूर स्वतंत्र खोलीत किंवा स्वतंत्र कपाटात कुलूप लावून ठेवावीत..
2. साठवणूक खोली मजबूत, कोरडी, चांगली प्रकाशयोजना असलेली, हवेशीर व पुरेशी मोठी असावी.

रासायनिक संघटन

अनु.क्र.	घटक	वजन
1	कोकोअमाइन एथॉक्सिलेट	04.00 % व/व
2	एमेटिक डाई	00.05 % व/व
3	पाणी	पुरेशी मात्रा % व/व
4	नॉनिल फिनॉल इथिलीन ऑक्साईड कंडेन्सेट	01.00 % व/व
5	सिलिकॉन – डीफोमर	00.10 % व/व
6	डाई एसिड ब्लू	00.05 % व/व
7	पॅराक्वाट डाय क्लोराइड टेक (100% व/व सक्रिय घटकाच्या आधारे)	24.00 % व/व
	एकूण	100 % व/व

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

પેરાક્વાટ ડાયક્લોરાઇડ 24% એસ.એલ.
(સંપર્ક શાકનાશક)

તે બિન-પસંદગીયુક્ત, સંપર્ક હર્બિસાઇડ છે જેમાં 24% સક્રિય ઘટક, પેરાક્વાટ ડાયક્લોરાઇડ એ.આઈ. બાય માસ બેલેન્સ સહાયકો હોય છે.

ભલામણ

પાક	નીંદણનું સામાન્ય નામ	માત્રા / હેક્ટર સક્રિય તત્વ (કિ.ગ્રા.)	માત્રા / હેક્ટર ફોર્મ્યુલેશન (લી.)	પાણીમાં ભેળવણી (લી.)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધીનો વેઇટિંગ પીરિયડ (દિવસ)	છંટકાવ પછી ફરી પ્રવેશ (કલાક)
—	હાઇડ્રિલા (હાઇડ્રિલા)	પાણીમાં 1–1.5 પીપીએમ	4.2	600	–	–
જળ નીંદણ	જળકુંભી (આઇકોર્નિયા ક્રેસિપ્સ)	1	4.25–1000	600–1000	–	–
કપાસ	ડિગેરા (ડિગેરા અર્વેન્સિસ), મોથા (સાયપેરસ ઇરિયા)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	–
દ્રાક્ષ	નાગરમોથા (સાયપેરસ રોટન્ડસ), દુર્વા (સાયનોડોન ડેક્ટિલોન), હરણખૂરી (કોન્વોલ્વુલસ), કુલફા (પોર્ટુલાકા), ટ્રાઇડેક્સ (ટ્રાઇડેક્સ)	0.5	2.5	500	90	–
બટાટા	બથુઆ (ચેનોપોડિયમ), નીલકંઠી (એનાગેલિસ અર્વેન્સિસ), સાંઠી (ટ્રાયએન્થેમા મોનોગાયના), મોથા (સાયપેરસ રોટન્ડસ)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	–
ભાત	સહદેવી (એજરેટમ કોનીઝોઇડ્સ), કેંચરા (કોમેલિના બેન્ઘાલેન્સિસ), સાંવા (એકિનોક્લોઆ ક્રૂસગલ્લી), કાંસ (પેનિકમ રેપેન્સ), મોથા (સાયપેરસ ઇરિયા), બ્રાકિયારિયા (બ્રાકિયારિયા મ્યુટિકા)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	–	–
રબર	ક્રેબ ઘાસ (ડિજિટેરિયા), લવ ઘાસ (એરાગ્રોસ્ટિસ), ફિમ્બ્રિસ્ટાઇલિસ (ફિમ્બ્રિસ્ટાઇલિસ)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	–	–
ચા	કાંસ ઘાસ (ઇમ્પેરાટા સિલિન્ડ્રિકા), લુમડીપૂંછ ઘાસ (સેટેરિયા), કેંચરા (કોમેલિના બેન્ઘાલેન્સિસ), પુનર્નવા (બોએરહાવિયા હિસ્પિડા), પાસ્પાલમ (પાસ્પાલમ કોન્જુગેટમ)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	લાગુ નથી	–
ઘઉં	ઘાસ તથા પહોળા પાનવાળા નીંદણ	1	4.25	500	120–150	–

ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ
ઉપયોગમાં લેવાતા છોડ સંરક્ષણ સાધનો: હાથથી ચાલતા નેપસેક સ્પ્રેયર, હેન્ડ કમ્પ્રેશન સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર અથવા મોટરચાલિત સ્પ્રેયર વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.

છંટકાવનો સમય:
CIB માર્ગદર્શિકાઓ અનુસાર.

સાવચેતી
1. દ્રાવણ બનાવતી વખતે શ્વાસ દ્વારા અંદર જવાથી અને ચામડીના સંપર્કથી બચો. ખાલી હાથથી મિશ્રણ ન કરો.
2. વપરાશકર્તાએ સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ, જેમાં રબરના હાથમોજાં, બૂટ તેમજ ફેસ શિલ્ડ અથવા ડસ્ટ માસ્ક અને રબર એપ્રન, હૂડ અથવા ટોપી શામેલ છે.

વિષબાધાના લક્ષણો
ચાંભડી, નાકમાંથી લોહી વહી જવું, પેટમાં અસ્વસ્થતા, દસ્ત તથા યકૃત અને વૃક્ક નિષ્ફળતાના લક્ષણો વગેરે.

પ્રાથમિક સારવાર
ગળી લેવાય તો ગળાના પાછળના ભાગને ગૂદગૂદી ઉલ્ટી કરાવો. કપડાં દૂષિત થયાં હોય તો સાબુ અને પાણીથી ધોવો. દૂષિત ચામડી અને કપડાં ધોવો તથા આંખોને પૂરતા પાણીથી ધોવો. શ્વાસ દ્વારા અંદર ગયેલ હોય તો દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાવ.

ફાઇટોટોક્સિસિટી
ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ ઉત્પાદન પાક માટે ઝેરી નથી.

એન્ટિડોટ
વારંવાર ઉલ્ટી કરાવી પેટ સાફ કરો. 30% સ્ટેરિલાઇઝ્ડ બેન્ટોનાઇટ અથવા ફુલર્સ અર્થનું 500 મિ.લી. સસ્પેન્શન મોઢે આપો. 2–4 કલાક પછી ફરી આપો. લક્ષણ મુજબ સારવાર કરો.

વપરાયેલા કન્ટેનરની નિકાલ પ્રક્રિયા
1. તણનાશકના ઉત્પાદકો, ફોર્મ્યુલેટરો અને વપરાશકર્તાઓએ પર્યાવરણ તથા પાણી પ્રદૂષણ અટકાવવા પેકેજ, વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણનો સુરક્ષિત નિકાલ કરવો ફરજિયાત છે.
2. વપરાયેલ પેકેજ ફરી ઉપયોગ ન થાય તે માટે બહાર ન મુકવું.
3. પેકેજ તોડી વસતિથી દૂર જમીનમાં દફન કરવું.

સંગ્રહની શરતો
1. તણનાશક ધરાવતા પેકેજો અન્ય સામગ્રીથી દૂર અલગ રૂમમાં અથવા તાળાબંધ અલગ અલમારીમાં રાખવા.
2..સંગ્રહ રૂમ મજબૂત, સુકા, સારી રોશનીવાળા, હવાદ[illegible]ર અને પૂરતા કદના હોવા જોઈએ.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વજન
1	કોકોએમાઇન ઇથોક્સિલેટ	04.00 % વ/વ
2	એમેટિક ડાઇ	00.05 % વ/વ
3	પાણી	પૂરતી માત્રા % વ/વ
4	નોનિલ ફિનોલ ઇથિલિન ઓક્સાઇડ કન્ડેન્સેટ	01.00 % વ/વ
5	સિલિકોન – ડિફોમર	00.10 % વ/વ
6	ડાઇ એસિડ બ્લૂ	00.05 % વ/વ
7	પેરાક્વાટ ડાયક્લોરાઇડ ટેક (100% વ/વ સક્રિય ઘટકના આધારે)	24.00 % વ/વ
	કુલ	100 % વ/વ

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ 24% ਐਸ.ਐਲ.
(ਸੰਪਰਕ ਘਾਹਨਾਸ਼ਕ)

ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਚੋਣਵਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24% ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ, ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ / ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ / ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ.)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ (ਦਿਨ)	ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟੇ)
—	ਹਾਈਡ੍ਰਿਲਾ (ਹਾਈਡ੍ਰਿਲਾ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 1–1.5 ਪੀਪੀਐਮ	4.2	600	–	–
ਜਲ ਘਾਹ	ਜਲ ਕੁੰਭੀ (ਆਇਕੋਰਨੀਆ ਕਰੈਸਿਪਸ)	1	4.25–1000	600–1000	–	–
ਕਪਾਹ	ਡਿਗੇਰਾ (ਡਿਗੇਰਾ ਅਰਵੈਂਸਿਸ), ਮੋਥਾ (ਸਾਇਪੇਰਸ ਇਰੀਆ)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	–
ਅੰਗੂਰ	ਨਾਗਰਮੋਥਾ (ਸਾਇਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ), ਦੂਬ ਘਾਹ (ਸਾਇਨੋਡਾਨ ਡੈਕਟਿਲੋਨ), ਹਿਰਨਖੁਰੀ (ਕਾਨਵੋਲਵੂਲਸ), ਕੁਲਫਾ (ਪੋਰਟੂਲਾਕਾ), ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ (ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ)	0.5	2.5	500	90	–
ਆਲੂ	ਬਥੂਆ (ਚੇਨੋਪੋਡਿਯਮ), ਨੀਲਕੰਠੀ (ਅਨਾਗੈਲਿਸ ਅਰਵੈਂਸਿਸ), ਸਾਂਠੀ (ਟ੍ਰਾਈਐਂਥੇਮਾ ਮੋਨੋਗਾਈਨਾ), ਮੋਥਾ (ਸਾਇਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	–
ਧਾਨ	ਸਹਦੇਵੀ (ਏਗੇਰੈਟਮ ਕੋਨਾਇਜ਼ੋਇਡਸ), ਕੇਂਚਰਾ (ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਬੈਂਘਾਲੈਂਸਿਸ), ਸਾਂਵਾ (ਇਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕਰੂਸਗੈਲੀ), ਕਾਂਸ (ਪੈਨਿਕਮ ਰੇਪੈਂਸ), ਮੋਥਾ (ਸਾਇਪੇਰਸ ਇਰੀਆ), ਬ੍ਰੈਕਿਆਰੀਆ (ਬ੍ਰੈਕਿਆਰੀਆ ਮਿਊਟਿਕਾ)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	–	–
ਰਬਰ	ਕਰੈਬ ਘਾਹ (ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ), ਲਵ ਘਾਹ (ਇਰੈਗਰੋਸਟਿਸ), ਫਿਮਬ੍ਰਿਸਟਾਈਲਿਸ (ਫਿਮਬ੍ਰਿਸਟਾਈਲਿਸ)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	–	–
ਚਾਹ	ਕਾਂਸ ਘਾਹ (ਇੰਪੇਰਾਟਾ ਸਿਲਿੰਡਰਿਕਾ), ਲੂਮੜੀ ਪੂੰਛ ਘਾਹ (ਸੇਟੇਰੀਆ), ਕੇਂਚਰਾ (ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਬੈਂਘਾਲੈਂਸਿਸ), ਪੁਨਰਨਵਾ (ਬੋਏਰਹਾਵੀਆ ਹਿਸਪਿਡਾ), ਪੈਸਪਾਲਮ (ਪੈਸਪਾਲਮ ਕਾਂਜੂਗੇਟਮ)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	–
ਕਣਕ	ਘਾਹ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ	1	4.25	500	120–150	–

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੌਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ: ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਹੈਂਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਿਤ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ:
CIB ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ।
2. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਡਸਟ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰੱਬੜ ਏਪਰਨ, ਹੁੱਡ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜਲਨ, ਨੱਕੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਦਿ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਗੰਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ।

ਫਾਈਟੋਟੌਕਸਿਸਿਟੀ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਂਟੀਡੋਟ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 30% ਸਟੇਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ ਜਾਂ ਫੁੱਲਰਜ਼ ਅਰਥ ਦਾ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ। 2–4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਓ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
1. ਤਣਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ, ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਵਾਈ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3. ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਤਣਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
2. ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਯਾਪਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ. ਨੰ.	ਘਟਕ	ਭਾਰ
1	ਕੋਕੋਐਮੀਨ ਇਥੋਕਸੀਲੇਟ	04.00 % ਵ/ਵ
2	ਐਮੇਟਿਕ ਡਾਈ	00.05 % ਵ/ਵ
3	ਪਾਣੀ	ਪਰਯਾਪਤ ਮਾਤਰਾ % ਵ/ਵ
4	ਨੋਨਿਲ ਫੀਨੋਲ ਇਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਕੰਡੈਂਸੇਟ	01.00 % ਵ/ਵ
5	ਸਿਲੀਕੋਨ – ਡੀਫੋਮਰ	00.10 % ਵ/ਵ
6	ਡਾਈ ਐਸਿਡ ਬਲੂ	00.05 % ਵ/ਵ
7	ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਕ (100% ਵ/ਵ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ)	24.00 % ਵ/ਵ
	ਕੁੱਲ	100 % ਵ/ਵ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

প্যারাকোয়াট ডাইক্লোরাইড 24% এস.এল.
(সংস্পর্শজাত আগাছানাশক)

এটি একটি অ-নির্বাচনী, সংস্পর্শে থাকা ভেষজনাশক যার মধ্যে ২৪% সক্রিয় উপাদান, প্যারাকোয়াট ডাইক্লোরাইড a.i. ভর ভারসাম্য সহায়ক উপাদান রয়েছে।

সুপারিশ

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর			শেষ স্প্রে থেকে কাটাই পর্যন্ত অপেক্ষার সময় (দিন)	স্প্রে করার পর পুনঃপ্রবেশ (ঘন্টা)
		সক্রিয় উপাদান (কেজি)	ফর্মুলেশন (লি.)	পানিতে মিশ্রণ (লি.)		
—	হাইড্রিলা (হাইড্রিলা)	পানিতে 1–1.5 পিপিএম	4.2	600	–	–
জলজ আগাছা	কচুরিপানা (আইকোর্নিয়া ক্র্যাসিপেস)	1	4.25–1000	600–1000	–	–
তুলা	ডিগেরা (ডিগেরা আরভেনসিস), মোথা (সাইপেরাস ইরিয়া)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	–
আঙুর	নাগরমোথা (সাইপেরাস রোটান্ডাস), দুর্বা (সাইনোডন ড্যাক্টিলন), হরিণখুরি (কনভলভুলাস), কুলফা (পোর্টুলাকা), ট্রাইড্যাক্স (ট্রাইড্যাক্স)	0.5	2.5	500	90	–
আলু	বাথুয়া (চেনোপোডিয়াম), নীলকণ্ঠী (অ্যানাগ্যালিস আরভেনসিস), সাঁঠি (ট্রায়ানথেমা মনোগাইনা), মোথা (সাইপেরাস রোটান্ডাস)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	–
ধান	সহদেবী (এজেরাটাম কনাইজোইডস), কেঁচড়া (কমেলিনা বেঙ্গালেনসিস), সাঁওয়া (একিনোক্লোয়া ক্রুসগ্যালি), কাঁস (প্যানিকাম রেপেন্স), মোথা (সাইপেরাস ইরিয়া), ব্র্যাকিয়ারিয়া (ব্র্যাকিয়ারিয়া মিউটিকা)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	–	–
রাবার	ক্র্যাব ঘাস (ডিজিটেরিয়া), লাভ ঘাস (এরাগ্রোস্টিস), ফিমব্রিস্টাইলিস (ফিমব্রিস্টাইলিস)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	–	–
চা	কাঁস ঘাস (ইম্পেরাটা সিলিন্ড্রিকা), শিয়াললেজ ঘাস (সেটেরিয়া), কেঁচড়া (কমেলিনা বেঙ্গালেনসিস), পুনর্নবা (বোয়েরহাভিয়া হিসপিডা), প্যাসপালাম (প্যাসপালাম কনজুগেটাম)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	প্রযোজ্য নয়	–
গম	ঘাস ও প্রশস্ত পাতা আগাছা	1	4.25	500	120–150	–

ব্যবহারের নির্দেশনা
ব্যবহৃত উদ্ভিদ সুরক্ষা সরঞ্জাম: হাতে চালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, হ্যান্ড কম্প্রেশন স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার বা মোটরচালিত স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

প্রয়োগের সময়:
CIB নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

সতর্কতা
1. দ্রবণ তৈরি করার সময় শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। খালি হাতে মেশাবেন না।
2. ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করা উচিত, যার মধ্যে রাবারের দস্তানা, বুট, ফেস শিল্ড বা ডাস্ট মাস্ক এবং রাবার এপ্রন, হুড বা টুপি অন্তর্ভুক্ত।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
জ্বালা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, পেটের অস্বস্তি, ডায়রিয়া এবং যকৃত ও কিডনি বিকলের লক্ষণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা
গিলে ফেললে গলার পেছনের অংশে গুদগুদে দিয়ে বমি করান। পোশাক দূষিত হলে সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দূষিত ত্বক ও পোশাক ধুয়ে নিন এবং চোখে প্রচুর পানি দিন। শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে রোগীকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান।

ফাইটোটক্সিসিটি
ক্ষেত্র পর্যায়ের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহার করলে এই পণ্যটি ফসলের জন্য ক্ষতিকর নয়।

প্রতিষেধক (এন্টিডোট)
বারবার বমি করিয়ে পেট পরিষ্কার করুন। ৩০% জীবাণুমুক্ত বেন্টোনাইট বা ফুলার্স আর্থের ৫০০ মি.লি. সাসপেনশন মুখে দিন। ২–৪ ঘণ্টা পরে পুনরাবৃত্তি করুন। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি
1. আগাছানাশকের প্রস্তুতকারক, ফর্মুলেটর ও ব্যবহারকারীদের দায়িত্ব হলো পরিবেশ ও জল দূষণ রোধে প্যাকেজ, অতিরিক্ত উপাদান ও ধোয়ার পানি নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করা।
2. পুনঃব্যবহার রোধে ব্যবহৃত প্যাকেজ বাইরে ফেলে রাখা যাবে না।
3. পাত্র ভেঙে বসতি এলাকা থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
1. আগাছানাশকযুক্ত প্যাকেজ অন্যান্য সামগ্রী থেকে দূরে আলাদা কক্ষে বা তালাবদ্ধ আলমারিতে সংরক্ষণ করুন।
2. সংরক্ষণ কক্ষটি মজবুত, শুষ্ক, ভালো আলোযুক্ত, বায়ুচলাচলযুক্ত এবং পর্যাপ্ত আকারের হতে হবে।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্র. নং	উপাদান	ওজন
1	কোকোঅ্যামিন ইথোক্সিলেট	04.00 % ও/ও
2	এমেটিক ডাই	00.05 % ও/ও
3	পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ % ও/ও
4	ননাইল ফেনল ইথিলিন অক্সাইড কনডেনসেট	01.00 % ও/ও
5	সিলিকন –ডিফোমার	00.10 % ও/ও
6	ডাই অ্যাসিড ব্লু	00.05 % ও/ও
7	প্যারাকোয়াট ডাইক্লোরাইড টেক (100% ও/ও সক্রিয় উপাদানের ভিত্তিতে)	24.00 % ও/ও
	মোট	100 % ও/ও

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

ప్యారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్.ఎల్.
(సంపర్క కలుపు నాశిని)

ఇది ఎంపిక కాని, కాంటాక్ట్ కలుపు మందు, ఇది 24% క్రియాశీల పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది, పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ a.i. బై మాస్ బ్యాలెన్స్ అడ్జువాంట్స్.

సిఫారసు

పంట	పొలాల సాధారణ గడ్డి పేరు	మోతాదు / హెక్టేర్ –			చివరి రసాయనపు స్ప్రే నుండి కోత వరకు వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)	స్ప్రే తర్వాత తిరిగి ప్రవేశించే సమయం (గంటలు)
		సక్రియ పదార్థం (కిలోగ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (లీటర్లు)	నీటిలో కలిపే పరిమాణం (లీటర్లు)		
—	హైడ్రిల్లా	నీటిలో 1–1.5 ppm	4.2	600	–	–
జలగడ్డి	జలకుంభి (ఐకోర్నియా క్రాసిప్స్)	1	4.25–1000	600–1000	–	–
పత్తి	డిగేరా (డిగేరా అర్వెన్సిస్), మోతా (సైపెరస్ ఇరియా)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	–
ద్రాక్ష	నగర మోతా (సైపెరస్ రోటాండస్), దుర్వా (సైనోడాన్ డాక్టిలాన్), హిరణ్ ఖురి (కాన్ వాల్వ్యులస్), కుల్ఫా (పోర్టులాకా), ట్రయిడాక్స్ (ట్రయిడాక్స్)	0.5	2.5	500	90	–
ఆలుగడ్డ	చాకవత్ (చెనోపోడియం), నీలకంఠి (అనాగాలిస్ అర్వెన్సిస్), సాంతి (ట్రయాంథెమా మోనోగాయినా), మోతా (సైపెరస్ రోటాండస్)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	–
వరి	సహదేవి (ఏగరేటం కోనాయ్జాయిడ్స్), కెన్చురా (కోమెలినా బెంఘాలెన్సిస్), సాంవా (ఎకినోక్లోఆ క్రూసగాలి), కాన్స్ (పానికం రేపెన్స్), మోతా (సైపెరస్ ఇరియా), బ్రాకియారియా (బ్రాకియారియా మ్యూటికా)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	–	–
రబ్బరు	క్రాబ్ గడ్డి (డిజిటేరియా), లవ్ గడ్డి (ఎరాగ్రోస్టిస్), ఫింబ్రిస్టైలిస్ (ఫింబ్రిస్టైలిస్)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	–	–
టీ	కాన్స్ గడ్డి (ఇంపెరాటా సిలిండ్రికా), లోమడి పేప్ట్ గడ్డి (సెటేరియా), కెన్చురా (కోమెలినా బెంఘాలెన్సిస్), పునర్నవా (బోయెరహవియా హిస్పిడా), పాస్పాలం (పాస్పాలం కంజుగేటం)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	వర్తించదు	–
గోధుమ	గడ్డి & వెడల్పైన ఆకుల గడ్డి	1	4.25	500	120–150	–

వాడక సూచనలు
వాడే సస్య రక్షణ పరికరాలు: చేతితో నడిచే నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, హ్యాండ్ కాంప్రెషన్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్ లేదా మోటరైజ్డ్ స్ప్రేయర్ మొదలైన వాటిని ఉపయోగించండి.

అప్లికేషన్ సమయం:
CIB మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

ఎన్నోచేయవలసిన జాగ్రత్తలు
1. ద్రావణం కలపేటప్పుడు శ్వాస ద్వారా ఊపిరి తీసుకోవడం మరియు చర్మానికి కలవడం నివారించండి. ఖాళీ చేతులతో కలపవద్దు.
2. వాడేవారు పూర్తి రక్షణ గల దుస్తులు ధరించాలి, అందులో రబ్బర్ గ్లోవ్స్, బూట్స్, ముఖకవచం లేదా ధూళి మాస్క్ మరియు రబ్బర్ ఏప్రాన్, హుడ్ లేదా టోపీ ఉండాలి.

విషప్రభావ లక్షణాలు
దాహం, ముక్కు నుండి రక్తస్రావం, పొట్టలో అసౌకర్యం, మలబద్ధకం మరియు కాలేయం, మూత్రపిండ వైఫల్యం వంటి లక్షణాలు.

మొదటి సహాయం
తిన్నట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగాన్ని ఊదిచేలా వాంతులు ఉత్పత్తి చేయండి. దుస్తులు మురికైనట్లయితే, సబ్బు మరియు నీటితో తుడవండి. మురికిపడ్డ చర్మం మరియు దుస్తులు తుడవండి, కన్నులను చాలన్ని నీటితో కడగండి. శ్వాస ద్వారా వెళ్లినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలి కలిగిన ప్రదేశంలోకి తీసుకోండి.

సస్యానికి విషపాత్రం లేదు
నిర్దిష్ట సూచనల ప్రకారం వాడితే ఉత్పత్తి పంటలకు హానికరంగా ఉండదు.

ఎంటిడోట్
మళ్లీ మళ్లీ వాంతులు కలిగించి కడుపు శుభ్రం చేయండి. 30% స్టెరిలైజ్డ్ బెంటో లేదా ఫులర్స్ ఎర్త్ 500 మి.లీ సస్పెన్షన్ మౌఖికంగా ఇవ్వండి. 2–4 గంటల తర్వాత పునరావృతం చేయండి. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయండి.

వాడిన కంటైనర్ల వినియోగం
1. హర్బిసైడ్ తయారీదారులు, ఫార్ములేటర్లు మరియు వాడేవారు ప్యాకేజీలు, మిగిలిన పదార్థాలు మరియు శుభ్రతను పర్యావరణ, నీటి మలినతను నివారించేలా భద్రమైన విధంగా నిర్మూలించాలి.
2. వాడిన ప్యాకేజీలు మళ్లీ వాడకుండా బయట ఉంచకూడదు.
3. ప్యాకేజీలు పగిలించి నివాస ప్రాంతం దూరంలో నేలలో ꠰న్ చేయాలి.

భద్రతా షరతులు
1. హర్బిసైడ్ ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువుల నుండి దూరంగా ప్రత్యేక గదుల్లో లేదా తాళం పెట్టిన అల్మారీలలో ఉంచాలి.
2. కీటనాశకాలను నిల్వ చేయాల్సిన గదులు బలమైన, పొడి, మంచి ప్రకాశం, గాలివెంటిలేషన్ కలిగి, సరిపడా కొలతలలో ఉండాలి.

రసాయనిక సంయోజనం

క్రమ సంఖ్య	ఘటకం	బరువు
1	కోకోఅమైన్ ఎథోక్సిలేట్	04.00 % వ/వ
2	ఎమెటిక్స్ డై	00.05 % వ/వ
3	నీరు	సరిపడిన మోతాదు % వ/వ
4	నోనిల్ ఫీనాల్ ఎథిలిన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్	01.00 % వ/వ
5	సిలికాన్ – డీఫోమర్	00.10 % వ/వ
6	డై ఆసిడ్ బ్లూ	00.05 % వ/వ
7	ప్యారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ టెక్ (100% వ/వ క్రియాశీల పదార్థం ఆధారంగా)	24.00 % వ/వ
	మొత్తం	100 % వ/వ

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

பாராக்வாட் டைக்குளோரைடு 24% எஸ்.எல்.
(தொடர்பு களைக்கொல்லி)

இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதல்லாத, தொடர்பு களைக்கொல்லியாகும், இதில் 24% செயலில் உள்ள மூலப்பொருளான பராகுவாட் டைகுளோரைடு a.i. பை மாஸ் பேலன்ஸ் துணைப்பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது.

பரிந்துரை

பயிர்	களையின் பொதுப் பெயர்	அளவு / ஹெக்டேர்			கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பின் மீள் நுழைவு (மணிநேரம்)
		(AI கி.கி.)	தயாரிப்பு (லிட்டர்)	நீரில் கரைப்பு (லிட்டர்)		
—	ஹைட்ரில்லா (ஹைட்ரில்லா)	நீரில் 1–1.5 ppm	4.2	600	—	—
நீர்க்களைகள்	ஜல்கும்பி (ஐகோர்னியா கிராஸிப்ஸ்)	1	4.25–1000	600–1000	—	—
பருத்தி	டிகேரா (டிகேரா அர்வென்சிஸ்), மோதா (சைபெரஸ் இரியா)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	—
திராட்சை	நகர் மோதா (சைபெரஸ் ரோடண்டஸ்), தூப் புல் (சைனோடான் டாக்டிலான்), ஹிரண்குரி (கான்வோல்வுலஸ்), குல்பா (போர்டுலாக்கா), டிரைடெக்ஸ் (டிரைடெக்ஸ்)	0.5	2.5	500	90	—
உருளைக்கிழங்கு	பத்துவா (செனோபோடியம்), நீலகந்தி (அனகாலிஸ் அர்வென்சிஸ்), சாந்தி (டிரையென்தெமா மோனோகைனா), மோதா (சைபெரஸ் ரோடண்டஸ்)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	—
நெல்	சக்தேவி (அகெராடம் கொன்ய்சொய்ட்ஸ்), கஞ்சரா (கொமேலினா பெங்ஹாலென்சிஸ்), சான்வா (எக்கினோக்லோஆ கிருஸ்கல்லி), காஸ் (பானிகம் ரெபென்ஸ்), மோதா (சைபெரஸ் இரியா), பிரேக்கியாரியா (பிரேக்கியாரியா மியூடிகா)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	—	—
ரப்பர்	கிராப் புல் (டிஜிடீரியா), லவ் புல் (ஏராக்ரோஸ்டிஸ்), பிம்ப்ரிஸ்டைலிஸ் (பிம்ப்ரிஸ்டைலிஸ்)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	—	—
தேநீர்	காஸ் புல் (இம்பெராடா சிலிண்ட்ரிகா), லொம்டி புஞ்சை புல் (செட்டேரியா), கஞ்சரா (கொமேலினா பெங்ஹாலென்சிஸ்), புனர்நவா (போஎர்ஹாவியா ஹிஸ்பிடா), பாஸ்பலம் (பாஸ்பலம் குஞ்ஜுகேடம்)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	பொருந்தாது	—
கோதுமை	புல்கள் மற்றும் பரந்த இலைகள் கொண்ட களப்புப் பயிர்கள் (கிராஸ் அண்ட் ப்ரோட்-லீவ்டு வீட்ஸ்)	1	4.25	500	120–150	—

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்
பயன்படுத்தப்படும் செடிமரச்சு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: கையால் இயங்கும் நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ஹேண்ட் கம்ப்ரெஷன் ஸ்ப்ரேயர், பாத ஸ்ப்ரேயர் அல்லது மோட்டாரைஸ் செய்யப்பட்ட ஸ்ப்ரேயர் போன்றவை பயன்படுத்தவும்.

பயன்பாட்டு நேரம்:
CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.

எச்சரிக்கைகள்
1. தண்ணீரில் கரைத்து பயன்படுத்தும் போது மூச்சுவிடுவதை தவிர்க்கவும் மற்றும் தோலுக்கு நேரடியாக சேராதீர்கள். வெளியில் கையால் கலக்க வேண்டாம்.
2. பயன்படுத்துவோர் முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகள் அணிய வேண்டும்; இதில் ரப்பர் கையுறைகள், பூட்ஸ் மற்றும் முகக்கவசம் அல்லது தூசி முககவசம், ரப்பர் அப்பர்ன், ஹூட் அல்லது தொப்பி அடங்கும்.

விஷத்திற்கான அறிகுறிகள்
அரிப்பு, மூக்கு குருதி, வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் கல்லீரல், சிறுநீரகம் செயலிழப்பு ஆகிய அறிகுறிகள்.

முதலாவது சிகிச்சை
நுகர்ந்தால், தொண்டையின் பின் பகுதியை தொடுவதன் மூலம் வமிப்பு ஏற்படுத்தவும். உடைகள் மாசுபட்டிருந்தால் சோப்பு மற்றும் நீரால் கழுவவும். மாசுபட்ட தோல் மற்றும் உடைகளை கழுவி கண்களை போதுமான நீரில் கழுவவும். மூச்சில் உள்ளே சென்றால், நோயாளியை புதிய காற்றில் கொண்டு செல்லவும்.

செடிமரச்சு விஷப்பொருள் இல்லை
கள பரிந்துரைக்கப்படுவாறு பயன்படுத்தும்போது, இந்த தயாரிப்பு செடிகளுக்கு விஷமில்லாது இருக்கிறது.

மருந்து (அன்டிடோட்)
மீண்டும் மீண்டும் வமிப்பு ஏற்படுத்தி வயிற்றை சுத்தம் செய்யவும். 30% ஸ்டெரிலைஸ் செய்யப்பட்ட பெண்டோ அல்லது புலர்ஸ் அர்த்தின் 500 மில்லி லிட்டர் திரவத்தை வாய்வழியாக கொடுக்கவும். 2–4 மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் செய்யவும். அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை செய்யவும்.

பயன்பட்ட கொள்கலன்கள் மறுசுழற்சி
1. வெண்டி மருந்து தயாரிப்பாளர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் பயன்படுத்துபவர்கள், பைங்குண்டிகள் மற்றும் கழுவும் நீரை சுற்றுப்புறம் மற்றும் நீர் மாசுபாடு இல்லாமல் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும்.
2. பயன்படுத்தப்பட்ட பைங்குண்டிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் வெளியில் வைக்கக் கூடாது.
3. பைங்குண்டிகளை உடைத்து மக்கள் குடியிருப்பிலிருந்து விலகி தரையில் புதைக்கவும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்
1. வெண்டி மருந்து கொண்ட பைங்குண்டிகளை பிற பொருட்களைச் சேர்க்காத தனி அறைகள் அல்லது தனி அலமாரிகளில் பூட்டு வைத்து வைக்கவும்.
2. கீட்டுநாசினி சேமிக்கும் அறைகள் வலுவான, வறண்ட, நல்ல ஒளி, காற்றோட்டம் கொண்ட மற்றும் போதுமான அளவுடையவை இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	எடை
1	கோகோஅமைன் எதாக்ஸிலேட்	04.00 % வ/வ
2	எமெட்டிக் டை	00.05 % வ/வ
3	தண்ணீர்	போதுமான அளவு % வ/வ
4	நோனில் ஃபீனால் எத்திலீன் ஆக்சைடு கண்டென்சேட்	01.00 % வ/வ
5	சிலிகான் – டீஃபோமர்	00.10 % வ/வ
6	டை ஆசிட் ப்ளூ	00.05 % வ/வ
7	பாராக்வாட் டைக்குளோரைடு டெக் (100% வ/வ செயலில் உள்ள கூறின் அடிப்படையில்)	24.00 % வ/வ
	மொத்தம்	100 % வ/வ

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 24% ಎಸ್.ಎಲ್.
(ಸಂಪರ್ಕ ಹುಲ್ಲುನಾಶಕ)

ಇದು ಆಯ್ದವಲ್ಲದ, ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 24% ರಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎ.ಐ. ಬೈ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ / ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳು)
		(AI ಕಿ.ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಲೀಟರ್)	ನೀರಿನ ಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)		
—	ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ (ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1–1.5 ppm	4.2	600	—	—
ಜಲ ಕಳೆ	ಜಲಕುಂಬಿ (ಐಕೋರ್ನಿಯಾ ಕ್ರಾಸಿಪ್ಸ್)	1	4.25–1000	600–1000	—	—
ಹತ್ತಿ	ಡಿಗೇರಾ (ಡಿಗೇರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್), ಮೋತಾ (ಸೈಪೆರಸ್ ಇರಿಯಾ)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	—
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ನಾಗರ ಮೋತಾ (ಸೈಪೆರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್), ಜೂಬ್ ಹುಲ್ಲು (ಸೈನೋಡಾನ್ ಡಾಕ್ಟಿಲಾನ್), ಹಿರಣಕುರು (ಕಾನ್ವೋಲ್ವುಲಸ್), ಕುಲ್ಫಾ (ಪೋರ್ಟುಲಾಕಾ), ಟ್ರೈಡ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಟ್ರೈಡ್ಯಾಕ್ಸ್)	0.5	2.5	500	90	—
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಬಥುವಾ (ಚೆನೋಪೋಡಿಯಂ), ನೀಲಕಂಠಿ (ಅನಗಾಲಿಸ್ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್), ಸಾಂಠಿ (ಟ್ರೈಯಾಂಥೆಮಾ ಮೋನೋಗೈನಾ), ಮೋತಾ (ಸೈಪೆರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	—
ಅಕ್ಕಿ	ಸಹದೇವಿ (ಅಗೆರಾಟಮ್ ಕೊನಿಜೊಯಿಡ್ಸ್), ಕಾಂಚರಾ (ಕೋಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗ್ಹಾಲೆನ್ಸಿಸ್), ಸಾಂವಾ (ಈಚಿನೋಕ್ಲೋಆ ಕ್ರೂಸ್ಗ್ಯಾಲಿ), ಕಾಂಸ್ (ಪ್ಯಾನಿಕಮ್ ರೆಪೆನ್ಸ್), ಮೋತಾ (ಸೈಪೆರಸ್ ಇರಿಯಾ), ಬ್ರಾಕಿಯಾರಿಯಾ (ಬ್ರಾಕಿಯಾರಿಯಾ ಮ್ಯುಟಿಕಾ)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	—	—
ರಬ್ಬರ್	ಕ್ರಾಬ್ ಹುಲ್ಲು (ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ), ಲವ್ ಹುಲ್ಲು (ಏರಾಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್), ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ (ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	—	—
ಚಹಾ	ಕಾಂಸ್ ಹುಲ್ಲು (ಇಂಪೆರಾಟಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಾ), ಲೋಮ್ಡಿ ಕೂಸು ಹುಲ್ಲು (ಸೆಟೇರಿಯಾ), ಕಾಂಚರಾ (ಕೋಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗ್ಹಾಲೆನ್ಸಿಸ್), ಪುನರ್ನವಾ (ಬೋಯೆರ್ಹಾವಿಯಾ ಹಿಸ್ಪಿಡಾ), ಪಾಸ್ಪಲಂ (ಪಾಸ್ಪಲಂ ಕಂಜುಗೇಟಮ್)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	—
ಗೋಧಿ	ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಎಲೆಗಳಿಂದಿರುವ ಕಸಪ್ಪುಗಳು (ಗ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್-ಲೀವ್ಡ್ ವೀಡ್ಸ್)	1	4.25	500	120–150	—

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು: ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಿ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ:
CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
1. ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೈಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು; ಇದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್, ಬೂಟ್ಸ್, ಮುಖದ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಮಾಸ್ಕ್, ರಬ್ಬರ್ ಎಪ್ರಾನ್, ಹೂಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಸೇರಿರಬೇಕು.

ವಿಷಕಾರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಜ್ವಲನೆ, ಮೂಕದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹಸಿವಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಉಡುಪುಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಸಸ್ಯವಿಷವಿಲ್ಲ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲ.

ಔಷಧಿ (ಎಂಟಿಡೋಟ)
ಮರುಮರು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 30% ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಟೋ ಅಥವಾ ಫುಲರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ 500 ಮಿ.ಲೀ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ. 2–4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್ ನಿಷ್ಕರ್ಷಣೆ
1. ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ತಯಾರಕರು, ಫಾರ್ಮುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.
2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹದ ಶರತ್ತುಗಳು
1. ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಹೊಂದಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ, ವಿಭಿನ್ನ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ, ಒಣ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿಪಟ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಘಟಕ	ತೂಕ
1	ಕೋಕೋಅಮೈನ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	04.00 % ವ/ವ
2	ಎಮೆಟಿಕ್ ಡೈ	00.05 % ವ/ವ
3	ನೀರು	ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ % ವ/ವ
4	ನೊನೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಎಥಿಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಟ್	01.00 % ವ/ವ
5	ಸಿಲಿಕಾನ್ – ಡೀಫೋಮರ್	00.10 % ವ/ವ
6	ಡೈ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಲೂ	00.05 % ವ/ವ
7	ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಕ್ (100% ವ/ವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)	24.00 % ವ/ವ
	ಒಟ್ಟು	100 % ವ/ವ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

പാരാക്വാറ്റ് ഡൈക്ലോറൈഡ് 24% SL
(കോൺടാക്റ്റ് കുമിൾനാശിനി)

ഇത് ഒരു നോൺ-സെലക്ടീവ് കോൺടാക്ട് ഹർബിസൈഡാണ്. ഇതിൽ 24% w/w സജീവ ഘടകമായ പാരാക്വാട്ട് ഡൈക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം അഡ്ജുവന്റുകളാണ്।

ശുപാർശ

വിള	കളയുടെ പൊതുപേര്	അളവ് / ഹെക്ടർ			അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് (ദിവസം)	ഓരോ പ്രയോഗത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
		AI കിലോ	ഫോർമുലേഷൻ (ലിറ്റർ)	വെള്ളത്തിൽ കലക്കൽ (ലിറ്റർ)		
—	ഹൈഡ്രില്ലാ (ഹൈഡ്രില്ലാ)	വെള്ളത്തിൽ 1–1.5 ppm	4.2	600	—	—
ജലകളകൾ	ജലകുമ്പി (ഐകോർണിയ ക്രാസിപ്സ്)	1	4.25–1000	600–1000	—	—
പരുത്തി	ഡിഗേരാ (ഡിഗേരാ അർവെൻസിസ്), മോത്താ (സൈപ്പെറസ് ഇറിയ)	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	—
മുന്തിരി	നാഗർ മോത്താ (സൈപ്പെറസ് റോട്ടുണ്ടസ്), ദൂബ് പുല്ല് (സൈനോഡോൺ ഡാക്ടിലോൺ), ഹിരൺകുരി (കോൺവോൾവുലസ്), കുൽഫാ (പോർട്ടുലാക്ക), ട്രൈഡാക്സ് (ട്രൈഡാക്സ്)	0.5	2.5	500	90	—
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ബത്തുവാ (ചെനോപ്പോഡിയം), നീലകണ്ഠി (അനഗാലിസ് അർവെൻസിസ്), സാന്തി (ട്രയാന്തെമ മൊണോഗൈനെ), മോത്താ (സൈപ്പെറസ് റോട്ടുണ്ടസ്)	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	—
നെല്ല്	സഹദേവി (അഗറാടം കൊനിജോയ്ഡ്സ്), കാഞ്ചരാ (കോമെലിന ബംഗ്ഹാലെൻസിസ്), സാമ്വാ (എക്കിനോക്ലോആ ക്രൂസ്ഗല്ലി), കാസ്സ് (പാനികം റെപൈൻസ്), മോത്താ (സൈപ്പെറസ് ഇറിയ), ബ്രാക്കിയാരിയ (ബ്രാക്കിയാരിയ മ്യൂറ്റിക്ക)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	—	—
റബ്ബർ	ക്രാബ് പുല്ല് (ഡിജിറ്റീരിയ), ലവ് പുല്ല് (എരാഗ്രോസ്റ്റിസ്), ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ് (ഫിംബ്രിസ്റ്റൈലിസ്)	0.3–0.6	1.25–2.5	670	—	—
ചായ	കാസ്സ് പുല്ല് (ഇംപെറാറ്റാ സിലിൻഡ്രിക്ക), ലോംഡി പുഞ്ച് പുല്ല് (സെറ്റേറിയ), കാഞ്ചരാ (കോമെലിന ബംഗ്ഹാലെൻസിസ്), പുനർനവാ (ബോവെർഹാവിയ ഹിസ്പിഡാ), പാസ്പാലം (പാസ്പാലം കോൺജുഗേറ്റം)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	ബാധകമല്ല	—
ഗോതമ്പ്	പുല്ലുകളും വീതിയുള്ള ഇലകളും ഉള്ള പയ്യകൾ (ഗ്രാസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്-ലീവ്ഡ് വീഡ്സ്)	1	4.25	500	120–150	—

ഉപയോഗ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യസംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ: കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, ഹാൻഡ് കംപ്രഷൻ സ്പ്രേയർ, ഫുട് സ്പ്രേയർ, മോട്ടറൈസ്ഡ് സ്പ്രേയർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.

പ്രയോഗ സമയത്ത്:
CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുകൾ
1. ദ്രാവണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്വാസമേറ്റുന്നതും ചർമ്മത്തിലെ സാന്നിധ്യവും ഒഴിവാക്കുക. 60ണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ച് കലർത്തരുത്.
2. ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം; ഇതിൽ റബ്ബർ ഗ്ലൗസുകൾ, ബൂട്ടുകൾ, മുഖം കവറാക്കുന്ന ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് മാസ്ക്, റബ്ബർ എപ്രൺ, ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പി ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
ക്ലേശം, മൂക്ക് രക്തസ്രാവം, വയറു അസ്വസ്ഥത, പായബാധ, കരളും വൃക്കയും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ.

ആദ്യ സഹായം
തിങ്കുമ്പോൾ, കഴുത്തിന്റെ പിന് ഭാഗം തൊടുന്നതിലൂടെ ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കുക. വസ്ത്രങ്ങൾ മലിനമായിരുന്നെങ്കിൽ സാബൺ, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. മലിനമായ ചർമ്മവും വസ്ത്രങ്ങളും കഴുകുക; കണ്ണുകൾ മതിയായ വെള്ളത്തിൽ തണുത്തുനീക്കുക. ശ്വാസമാർഗ്ഗം വാരിപ്പോയാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധമായ വായുവുള്ള സ്ഥലത്ത് മാറ്റുക.

സസ്യ വിഷം ഇല്ല
മേഖലാ ശുപാർശപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിളകൾക്ക് വിഷകരമല്ല.

പ്രതിവിഷം (Antidote)
മടങ്ങിവരുന്നത്ര ഛർദ്ദി നടത്തുക, വയറ്റിനെ ശുചിയാക്കുക. 30% സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുലേഴ്സ് എർത്ത് 500 മില്ലി ലിറ്റർ വായുവഴിയിലൂടെ നൽകുക. 2–4 മണിക്കൂറിനുശേഷം ആവർത്തിക്കുക. ലക്ഷണപ്രകാരം ചികിത്സ നടത്തുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളുടെ നാശീകരണം
1. ഹർബിസൈഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫോർമുലേറ്ററുകൾ, ഉപയോഗക്കാർ പാക്കേജ്, ശേഷിച്ച വസ്തുക്കൾ, കഴുകുന്ന വെള്ളം പരിസ്ഥിതി/ജല മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ പുനർവിനിയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ പുറത്തുവിടരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ പൊളിച്ച് ജനവാസം തൊട്ടുയരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മണ്ണിൽ അടിക്കുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1. ഹർബിസൈഡ് ഉള്ള പാക്കേജുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വേറെയും അടച്ചിരിക്കുന്ന അലമാരകളിലോ പ്രത്യേക മുറികളിലോ സൂക്ഷിക്കുക.
2. കീടനാശകം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികൾ ശക്തമായ, വരണ്ട, നല്ല വെളിച്ചമുള്ള, കാറ്റോട്ടമുള്ള, മതിയായ വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	ഭാരം
1	കോക്കോഅമൈൻ എതോക്സിലേറ്റ്	04.00 % വ/വ
2	എമറ്റിക് ഡൈ	00.05 % വ/വ
3	വെള്ളം	പ്രയോജ്യമായ അളവ് % വ/വ
4	നോനൈൽ ഫിനോൾ എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ് കണ്ടൻസേറ്റ്	01.00 % വ/വ
5	സിലിക്കൺ – ഡിഫോമർ	00.10 % വ/വ
6	ഡൈ ആസിഡ് ബ്ലൂ	00.05 % വ/വ
7	പാരാകാാട് ഡൈക്ലോറൈഡ് ടെക് (100% വ/വ സജീവ ഘടകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)	24.00 % വ/വ
	ആകെ	100 % വ/വ

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

پیراکوئٹ ڈائیکلورائیڈ 24٪ ایس ایل
(فکانٹیکٹ ہربیسائیڈ)

فعال جزپیراکوئٹ ڈائیکلورائیڈ شامل ہے، جبکہ باقی w/w ٪یہ ایک نان سلیکٹیو، رابطہ اثر رکھنے والی جڑی بوٹی مار دوا ہے جس میں 24 وزن ایڈجوانٹس پر مشتمل ہے۔

سفارشات

فصل	نام عام کا بوٹی جڑی	بیکٹر / مقدار			اسپرے آخری تک کٹائی سے مدت کی انتظار (دن)	کے استعمال بر داخلہ دوبارہ بعد (گھنٹے)
		AI) (کلوگرام	فارمولیشن (لیٹر)	میں پانی گھول (لیٹر)		
—	(بائیڈرلا) بائیڈرلا	1– میں پانی 1.5 ppm	4.2	600	—	—
آبی جڑی بوٹیاں	(کرسپیس آئیکورنیا) جلکمبی	1	4.25–1000	600–1000	—	—
کپاس	(ایریا سائپرس) موتھا (اروینسس ڈیگرا) ڈیگرا	0.3–0.5	1.25–2.125	500	150–180	—
انگور	سائنوڈون) گھاس (روٹینڈس سائپرس) موتھا ناگر (پورٹولاکا) کلفا (کونولولس) ہرنکھوری (ڈیکٹیلون (ٹرائیڈیکس) ٹرائیڈیکس	0.5	2.5	500	90	—
آلو	(اروینسس اناگلس) نیلکنٹی (چینوپوڈیم) بتھوا سائپرس) موتھا (مونوگائنا ٹرائینتھیما) سانتھی (روٹینڈس	0.25–0.51	1.06–2.125	500	100	—
دھان	لینا کومی) کنچرا (کونیزوائڈز ایگریٹم) سہدیوی کانس (کرسگالی ایچینوکلوا) ساوا (بنگالینسس بریکیاریا (ایریا سائپرس) موتھا (ریپینس پینکم (میوٹیکا بریکیاریا)	0.3–0.8	1.25–4.0	250	—	—
ربڑ	(ایراگروسٹس) گھاس لو (ڈیجیٹیریا) گھاس کریب (فمبرسٹائلز) فمبرسٹائلز	0.3–0.6	1.25–2.5	670	—	—
چائے	گھاس دم لومڑی (سلنڈرکا امپیراٹا) گھاس کانس پونرنوا (بنگالینسس لینا کومی) کنچرا (سیٹیریا) (کونجگیٹم پاسپالم) پاسپالم (ہسپیدہ بونرابایا)	0.2–1.0	0.85–4.25	200–400	نہیں لاگو	—
گندم	گریس) بوٹیاں جڑی والی پتیاں چوڑی اور گھاس (ویڈز لیفڈ براوڈ اینڈ	1	4.25	500	120–150	—

استعمال کی ہدایات
استعمال ہونے والا پودا حفاظتی سازوسامان: دستی طور پر چلنے والا ناپ ساک اسپریئر، ہینڈ کمپریشن اسپریئر، فٹ اسپریئر یا موٹرائزڈ اسپریئر وغیرہ استعمال کریں۔

:لاگو کرنے کا وقت
کے رہنما خطوط کے مطابق عمل کریں۔ CIB

احتیاطی تدابیر
محلول تیار کرتے وقت سانس کے ذریعے اندر جانے اور جلد سے رابطے سے گریز کریں۔ کھالی ہاتھوں سے مکس نہ کریں۔ .1
استعمال کرنے والوں کو مکمل حفاظتی لباس پہننا چاہیے؛ جس میں ربڑ کے دستانے، جوتے اور یا تو فیس شیلڈ یا دھول ماسک، .2 اور ربڑ ایپرن، ہڈ یا ٹوپی شامل ہوں۔

زہر کے اثرات کی علامات
جلن، ناک سے خون آنا، پیٹ میں تکلیف، دست، اور جگر اور گردے کے ناکارہ ہونے کی علامات وغیرہ۔

ابتدائی طبی امداد
اگر نگل لیا جائے تو گلے کے پچھلے حصے کو چھو کر قے کرائیں۔ اگر کپڑے آلودہ ہوں تو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ آلودہ جلد اور کپڑوں کو دھوئیں اور آنکھوں کو وافر پانی سے دھوئیں۔ اگر سانس کے ذریعے داخل ہوا ہو تو مریض کو تازہ ہوا میں منتقل کریں۔

پودوں کے لیے زہریلا نہیں
میدانی سفارش کے مطابق استعمال کرنے پر یہ مصنوعہ پودوں کے لیے زہریلا نہیں ہے۔

ضد زہر (Antidote)
بار بار قے کرائیں اور معدہ صاف کریں۔ 30% جراثیم سے پاک بنتونائٹ یا فلرز ارتھ کا 500 ملی لیٹر محلول زبانی دیں۔ 2–4 گھنٹے بعد دہرائیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ کنٹینرز کا تلف کرنا
ہربیسائیڈ کے تیار کنندگان، فارمولیٹرز اور صارفین کا فرض ہے کہ پیکج، باقی مواد اور دھونے کے پانی کو ماحولیاتی یا آبی آلودگی سے .1 بچانے کے لیے محفوظ طریقے سے تلف کریں۔
استعمال شدہ پیکجز کو دوبارہ استعمال سے روکنے کے لیے باہر نہ چھوڑیں۔ ..2
پیکجز کو توڑ کر رہائشی علاقوں سے دور زمین میں دفن کریں۔ .3

ذخیرہ کرنے کی شرائط
ہربیسائیڈ والے پیکجز کو دیگر اشیاء سے الگ کمروں یا تالا بند الماریوں میں ذخیرہ کریں۔ 1
کیڑوں کے مار دوا کے ذخیرہ کرنے والے کمرے مضبوط، خشک، مناسب روشنی والے، ہوادار اور مناسب حجم کے ہونے .2 چاہئیں تاکہ بھاپ سے آلودگی نہ ہو۔

کیمیائی ترکیب

شمار	جزو	وزن
1	ایتھوکسائلیٹ امائن کوکو	04.00 % و/و
2	ڈائی ایمیٹک	00.05 % و/و
3	پانی	مقدار مناسب %و/و
4	کنڈینسیٹ آکسائیڈ ایتھیلین فینول نونائل	01.00 % و/و
5	ڈیفومر – سلیکون	00.10 % و/و
6	بلیو ایسڈ ڈائی	00.05 % و/و
7	(پر بنیاد کی جزو فعال و/و %100) ٹیک ڈائیکلورائیڈ پیراکوئٹ	24.00 % و/و
	کل	100 % و/و

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu