AgroStar®

RAPIGEN

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC

(Insecticide)

रैपीजेन

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भार/भार एससी

(कीटनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by

ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED

Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC
(Insecticide)

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (20% w/v) is a novel substitute anthranilamide insecticides. It is a board spectrum insecticide and is recommended for controlling pests of Rice, Cabbage, Cotton, Sugarcane, Tomato, Chilli, Soybean, Brinjal, pigeon pea (Red gram), Bengal gram, black gram, bittergourd , okra, Maize and Groundnut crop.

Recommendation

Crop	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (g)	Formulation (ml)	Dilution in Water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Bengal gram	Pod Borer (Spodoptera spp. and H.armigera)	25	125	500	11	—
Bitter gourd	Fruit Borers & Caterpillars (Diaphania sp. & H.armigera)	20–25	100–125	500	7	—
Black gram	Pod Borer (Maruca spp & S.litura)	20	100	500	20	—
Brinjal	Fruit & shoot borer (Leucinodes orbonalis)	40	200	500–750	3	—
Cabbage	Diamond back moth (Plutella xylostella)	10	50	500	3	—
Chilli	Fruit borer (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Spodoptera exigua)	30	150	500	3	—
Cotton	American Boll Warm (Helicoverpa armigera) Spotted bollworm(Earias vittella) Tabacoo caterpillar (Spodoptera litura)	30	150	500	9	—
Groundnut	Tobacco caterpillar	30	150	500	28	—
Maize	Spotted steam borer, Pink steam borer	40	200	500	10	—
Okra	Fruit borer (H. armigera, Earias vitella)	25	125	500	5	—
Pigeon pea	Gram pod borer (Helicoverpa armigera) Pod fly (Melanogromyza obtusa)	30	150	500–750	29	—
Rice	Stem borer (Schirphophaga incertuals)and Leaf Floder (Cnaphalocrocis medinalis)	30	150	500	47	—
Soybean	Green semiloopers (chrysodexis acuta) stem fly Girdle Beetle	30	150	500–750	22	—
Sugarcane	Termite(Odontotermes obesus/Microtermes obesi)	100–125	500–625	1000	208	—
Sugarcane	Top borer(Scirpophaga excerptalis)	75	375	1000	208	—
Sugarcane	Early shoot borer(Chilo infuscatellus)	75	375	1000	208	—
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	30	150	500	3	

Direction Of Use

(Method and Time of application) Sugarcane: Sett Drenching/ Soil Drenching in the sugarcane crop for control of termites and early shoot borer and Top borer. The application fro the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane, should be done as Soil drenching in the month of june Other crops (Rice, cotton, cabbage, tomato,chilli, soybean, brinjal, pigeonpea,bengal gram, black gram, bittergourd, okra) use as foliar spray at ETL of the pest population using knapsack sprayer.

Time of Application : Refer to CIB Guidelines

Precautions

1. leaflet carefully, Save the container with the label to the show the physician in case of accidental poisoning. Read and follow all instructions on the label and
2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in the drift of spray by applying the insecticide with the wind.
3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying.
4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin never by blowing the same.
5. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water.
6. Always change clothing and take bath as soon as the insecticide treatment is over.
7. Wash hands and unprotected parts of the body before eating, drinking or smoking and after handling.
8. Remove and wash contaminated clothing before reuse.
9. Call a physician immediately if any poisoning appear in a person who is using or has recently used this insecticide.

Symptoms Of Poisoning

Mild eye irritant with blurred vision. Vapour inhalation may result in nasal secretion.

First Aid

IF Inhaled; No specific intervention is indicated as the material is not likely to be hazardous by inhalation. If on skin: The material is not likely to be hazardous by skin contact, but clearing the skin after use is advisable. If in eyes: The material is not likely to be hazardous to the eyes is, but if contact occurs, flushing the eyes with plenty of water.

Phytotoxicity

No phytotoxic at recommended dosages.

Antidote

No specific antidote available, treat symptomatically.

Disposal Of Used Container

Container for not reuse. Empty containers should be destroyed and buried in ½ meter deep soil away from habitation. Do not contaminate the environment, water or food by storage of disposal. Do not flush to surface water or sanitary sewer system.

Storage Conditions

Do not store and consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the insecticide in original container only. Tightly closed in a well built, cool, dry place, well lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contaminations with vapours. The material should be kept under lock and key, away from food, animal feed, other pesticide and fertilizers.

Chemical Composition

S. No	Ingredient	Weight
1	Chlorantraniliprole a.i.	18.50 % w/w
2	Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer	3.00 % w/w
3	Ethyleneoxide/propyleneoxide block co-polymer and ethoxylated alcohol	2.00 % w/w
4	Attapulgite clay	1.00 % w/w
5	Xanthan gum	0.25 % w/w
6	1,2-benzisothiazolin-3-one	0.10 % w/w
7	Silicone emulsion	0.50 % w/w
8	Propylene glycol	6.80 % w/w
9	Water	QS % w/w
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भार/भार एससी
(कीटनाशक)

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भा/भा एस सी (20% भा/भा) एक अनूठे किस्म का एवजी ऐन्थ्रनिलामाइड कीटनाशक है।यह एक बहु आयामी असर वाला कीटनाशक है जिसे धान, पत्तागोभी, कपास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अरहर, चना, उड़द, करेला, भिन्डी, मक्का और मूंगफली पर लगने वाले विभिन्न कीटों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है।

उपयोग

फसल	कीट का सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व ग्राम	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
चना	फली छेदक (स्पोडोप्टेरा या हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा)	25	125	500	11	—
करेला	फल छेदक (डिफेनिआ, हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा)	20–25	100–125	500	7	—
उड़द	फली छेदक (मरुका या स्पोडोप्टेरा)	20	100	500	20	—
बैंगन	बैंगन और अंकुर तना छेदक (ल्यूसिनोडेस ऑर्बोनालिस)	40	200	500–750	3	—
पत्ता गोभी	गोभी के चमकीले पंतगे	10	50	500	3	—
मिर्च	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा लिचुरा,स्पोडोप्टेरा एक्सीगुआ))	30	150	500	3	—
कपास	अमेरिकी बोल वर्म धर्म ब्बेदार सुंडी तम्बाकू की इल्ली	30	150	500	9	—
मूंगफली	तंबाकू सुंडी	30	150	500	28	—
मक्का	धब्बेदार तना छेदक, गुलाबी तना छेदक	40	200	500	10	—
भिंडी	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा, एरिआस वित्तेला)	25	125	500	5	—
अरहर	दाल फली छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा), फलियां मक्खी (मेलानोग्रोमाइजा ऐब्टयूसा)	30	150	500–750	29	—
धान	हरे अर्ध छर्ध ल्ला कीट (क्राइसोडेक्सिस एयूटा) तना मक्खी गरडल बीटल	30	150	500	47	—
सोयाबीन	ग्रीन सेमीलूपर, तना मक्खी	30	150	500–750	22	—
गन्ना	दीमक	100–125	500–625	1000	208	—
गन्ना	टॉप बोरर	75	375	1000	208	—
गन्ना	अर्ली शूट बोरर	75	375	1000	208	—
टमाटर	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मिगेरा)	30	150	500	3	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

(प्रयोग का समय व तरीका)

गन्ना: गन्ने के दीमकों, कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए या वंत्र - डंठल या मिट्टी को सरोबर करें, गन्ने के शीर्ष छेदक कीटों के 3रे, 4थे तथा 5वें भ्रूण अंडे को नियंत्रण करने के लिए जून महीने में मिट्टी को सरोबर करना चाहिए। अन्य फसल: चावल, कपास और पत्तागोभी, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अरहर, चना, उड़द, करेला और भिन्डी के मामले में कीट की संख्या जब आर्थिक रूप से नुकसान की देहरी (ETL) पर हो तो नप सैक स्पेयर से छिड़काव करें।

प्रयोग का समय

सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां

1). लेबल व पत्रक पर छपे सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, दुर्घटना या विषाक्तता होने पर लेबल सहित कंटेनर को सुरक्षित रखें, ताकि डॉक्टर को दिखलाया जाए।

2). सामग्री को सूंघना नहीं चाहिए। प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, रंगीन चश्में, चेहरे का नकाब व सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। हवा की बहाव दिशा में छिड़काव करके स्प्रे के छीटों से बचने का प्रयास करें।

3). छिड़काव के समय न तो खाएं, पियें, धूम्रपान करें, न ही तंबाकू/पान चबायें।

4). स्प्रे टैंक को 3/4 से ज्यादा क्षमता में नहीं भरें। नोजल में कणों के फँसने पर मुँह से न फूंकें बल्कि पतले तार या पिन से साफ करें।

5). शरीर पर छलकन गिरने की हालत में खूब सारे पानी से साफ करें।

6). छिड़काव उपचार पूरा होते ही हमेशा कपड़े बदलें और नहायें भी।

7). खाने, पीने, धूम्रपान से पहले तथा प्रयोग के बाद शरीर के खुले हिस्सों व हाथ-पैर को अच्छी तरह धो लें।

8). दुबारा इस्तेमाल करने से पहले दुषित कपड़े निकाल कर धो लें।

9). जिस किसी ने इस कीटनाशक को हाल में इस्तेमाल किया है या कर रहा है, उस पर विषाक्तता के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर बुलायें।

विष के लक्षण

आँखों में हलकी जलन व धुंधलापन दिखना, वाष्प सांस में जाने पर नाक से पानी बहना।

प्राथमिक चिकित्सा

यदि सांस में गई हो, तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती क्योंकि सामग्री सांस में जाने पर इतनी खतरनाक नहीं है। त्वचा पर संपर्क से दुषित होने से भी सामग्री इतनी खतरनाक नहीं हो सकती, फिर भी, त्वचा को साफ करना अच्छा ही होता है। आँख से संपर्क होने पर भी यह सामग्री इतनी खतरनाक होने की संभावना नहीं रखती, फिर संपर्क का असर दिखे, तो खूब सारे पानी से आँखों का प्रक्षालन करें।

पौध विषाक्तता

सिफारिश मात्रा प्रयोग करने पर पौधों के लिए विषाक्त नहीं है।

विष नाशक

कोई विशेष विष हरने वाली दवा नहीं है, लक्षण अनुसार इलाज करना चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटारा

ये कंटेनर दुबारा इस्तेमाल के लिए नहीं होते। खाली कंटेनरों को नष्ट करके, निवास-स्थान से दूर 1/2 मीटर गहरे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। निपटान की चीजों से पर्यावरण, पेय पानी या भोजन संदूषित नहीं होना चाहिए। निपटान के पानी को पानी की सतह या सफाई-गटर निकास सिस्टम से बचाना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें

इस सामग्री से संदूषित भोजन, पेय सामग्री या तंबाकू का सेवन न करें। ये सब चीजें संदूषित न होने पायें इस तरह से दवा का भण्डारण करना चाहिए। कीटनाशक सामग्री को उनके मूल कंटेनर में, अच्छी तरह से बंद करके ठंडी, सूखी जगह में ऐसे कमरे या परिसर में रखना चाहिए, जो कि हवादार हो और जिसे बंद किया जा सके, ताकि वाष्प से संदूषण न फैले। कीटनाशक सामग्री को भोजन, जानवरों के चारे, अन्य कीटनाशकों और खादों से अलग, ताला-कुंजी की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	वज़न
	क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल (स.तत्व)	18.50 % भार/भार
	मिथाइल मिथाक्राइलेट इथोक्सीलेटेड सह पोलिमर का निरोप	3.00 % भार/भार
	ईथाइलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलीन ऑक्साइड सहपोलिमर पिंडक तथा इथोक्सीलेटेड अल्कोहल	2.00 % भार/भार
	अटपुलगाइट	1.00 % भार/भार
	ज़ेनथेन गोंद	0.25 % भार/भार
	1,2-बेन्ज़ीसो थियाज़ोलिन-3-एकल	0.10 % भार/भार
	सिलिकॉन इमल्शन	0.50 % भार/भार
	प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	6.80 % भार/भार
	जल	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भा./भा. एससी
(कीटकनाशक)

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भा/भा एस सी (20% भा/भा) एक अनोख्या प्रकारचा अवजी एंथ्रानिलामाइड कीटकनाशक आहे. हा एक बहुआयामी परिणाम असणारा कीटकनाशक आहे जो तांदूळ, कोबी, कापूस, ऊस, टोमॅटो, मिरची, सोयाबीन, वांगे, तूर, हरभरा, उडद, करेला, भेंडी, मका आणि शेंगदाण्यांवर लागणाऱ्या विविध कीटकांपासून संरक्षणासाठी वापरण्याची शिफारस केली जाते.

शिफारस

पिके	किडीचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय घटक (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)	पाण्यात विरघळविण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुनःप्रवेश कालावधी (तास)
बंगाल हरभरा	शेंग पोखरणारी अळी (स्पोडोप्टेरा जाती व हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा)	25	125	500	11	—
दोडका / कारली	फळ पोखरणारी अळी व अळ्या (डायफानिया प्रजाती व हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा)	20–25	100–125	500	7	—
काळा हरभरा	शेंग पोखरणारी अळी (मरुका प्रजाती व स्पोडोप्टेरा लिटुरा)	20	100	500	20	—
वांगे	फळ व कोंब पोखरणारी अळी (ल्युसिनोडीस ऑर्बोनॅलिस)	40	200	500–750	3	—
कोबी	हिरेमाशी अळी (प्लुटेला झायलोस्टेला)	10	50	500	3	—
मिरची	फळ पोखरणारी अळी (हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा, स्पोडोप्टेरा लिटुरा, स्पोडोप्टेरा एक्झिग्वा)	30	150	500	3	—
कापूस	अमेरिकन बोंडअळी, ठिपकेदार बोंडअळी, तंबाखू अळी (हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा, एरियस व्हिटेला, स्पोडोप्टेरा लिटुरा)	30	150	500	9	—
भुईमूग	तंबाखू अळी (स्पोडोप्टेरा लिटुरा)	30	150	500	28	—
मका	ठिपकेदार खोड पोखरणारी अळी, गुलाबी खोड पोखरणारी अळी	40	200	500	10	—
भेंडी	फळ पोखरणारी अळी (हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा व एरियस व्हिटेला)	25	125	500	5	—
तूर	शेंग पोखरणारी अळी व शेंग माशी (हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा व मेलॅनाग्रोमायझा ऑब्टुसा)	30	150	500–750	29	—
भात	खोड पोखरणारी अळी व पान गुंडाळणारी अळी (स्किर्फोफागा इन्सर्टुलास व क्नॅफालोक्रोसिस मेडिनॅलिस)	30	150	500	47	—
सोयाबीन	हिरवे अळी समूह व गिर्डल भुंगा (क्रायसोडेक्सिस अक्युटा व ओब्लिका गिर्डल भुंगा)	30	150	500–750	22	—
ऊस	खोड पोखरणारी अळी व टॉप बोरर (ओडोन्टोटर्मीस ओबेसस / मायक्रोटर्मीस ओबेसस व स्किर्फोफागा एक्सर्टॅलिस)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
ऊस	लवकर येणारी खोड पोखरणारी अळी (चिलो इन्फ्युस्कॅटेलस)	75	375	1000	208	—
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी (हेलिकोव्हरपा आर्मिजेरा)	30	150	500	3	—

वापरासाठी मार्गदर्शन

(वापराचा वेळ आणि पद्धत)

ऊस: ऊसाच्या टणक कीटकांपासून, कोमल कांड छिदक आणि टोक छिदक कीटकांपासून संरक्षणासाठी किंवा वृक्ष - कांड किंवा मातीवर शिंपडावे, ऊसाच्या टोक छिदक कीटकांच्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या भ्रूण अंड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जून महिन्यात मातीवर शिंपडावे. इतर पीक: तांदूळ, कापूस आणि कोबी, ऊस, टोमॅटो, मिरची, सोयाबीन, वांगे, तूर, हरभरा, उडद, करेला आणि भेंडीमध्ये कीटकांची संख्या आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक पातळीवर असताना स्प्रे करा.

वापराचा वेळ

सी.आय.बी. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.

वापरकर्त्यांसाठी खबरदारी

1). लेबल आणि पत्रकावर दिलेल्या सर्व सूचना काटेकोरपणे पाळा, अपघात किंवा विषबाधा झाल्यास लेबलसह कंटेनर सुरक्षित ठेवा, जेणेकरून डॉक्टरांना दाखवता येईल.

2). सामग्री सुंघू नका. वापराच्या वेळी रबरच्या हातमोजे, रंगीत चष्मे, चेहऱ्याचे मुखवटे व सुरक्षात्मक कपडे वापरा. हवा प्रवाहाच्या दिशेने शिंपण करा आणि स्प्रेच्या थेंबांपासून बचाव करा.

3). शिंपडताना खाऊ, पिऊ नका, धूम्रपान करू नका, तंबाखू/पान चघळू नका.

4). स्प्रे टाकी 3/4 पेक्षा जास्त भरू नका. नोजलमध्ये अडथळा आल्यास तोंडाने फुंकू नका, पातळ तारा किंवा पिनने साफ करा.

5). शरीरावर शिंपडले असल्यास भरपूर पाण्याने साफ करा.

6). शिंपडण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नेहमी कपडे बदला आणि आंघोळ करा.

7). खाणे, पिणे, धूम्रपान करण्यापूर्वी व वापरानंतर शरीराचे उघडे भाग व हात-पाय नीट धुवा.

8). पुन्हा वापरण्यापूर्वी दुषित कपडे काढून धुवा.

9). ज्याने अलीकडेच हे कीटकनाशक वापरले किंवा वापरत आहे, त्यांच्यावर विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांना बोलवा.

विषाची लक्षणे

डोळ्यात सौम्य जळजळ आणि धुंधळेपणा, वाष्प श्वासात गेल्यास नाकातून पाणी वाहणे.

प्राथमिक उपचार

जर श्वासात गेले असेल, तर विशेष प्रतिक्रिया होत नाही कारण सामग्री श्वासात गेल्यावर फार धोकादायक नाही. त्वचेशी संपर्क झाल्यासही सामग्री फार धोकादायक नसते, तरीही त्वचा स्वच्छ करणे चांगले आहे. डोळ्यात संपर्क झाल्यास फार धोकादायक नसले तरी, परिणाम दिसल्यास भरपूर पाण्याने डोळे धुवा.

पीक विषारीपणा

शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरल्यास पिकांसाठी विषारी नाही.

विषनाशक

कोणतीही विशेष विष नष्ट करणारी औषध नाही, लक्षणांनुसार उपचार करावा.

रिकाम्या डब्यांचा निपटारा

हे कंटेनर पुन्हा वापरण्यासाठी नाहीत. रिकाम्या कंटेनर नष्ट करून, राहत्या जागेपासून अर्धा मीटर खोल मातीमध्ये गाडा. निपटारा पर्यावरण, पिण्याचे पाणी किंवा अन्न प्रदूषित होऊ नये. निपटणारे पाणी पृष्ठभाग किंवा साफसफाई गटार/निकास यंत्रणेत जाण्यापासून वाचवा.

साठवण अटी

या सामग्रीमुळे प्रदूषित अन्न, पेय किंवा तंबाखू वापरू नका. हे सर्व वस्तू प्रदूषित होऊ नयेत, अशा प्रकारे औषध साठवा.
कीटकनाशक सामग्री त्यांच्या मूळ कंटेनरमध्ये, नीट बंद करून थंड, कोरड्या जागेत ठेवा, अशा खोली/परिसरात जेथे हवा येईल आणि बंद करता येईल, जेणेकरून वाष्पाने प्रदूषण पसरू नये. कीटकनाशक सामग्री अन्न, प्राणी चारणी, इतर कीटकनाशक व खतांपासून वेगळ्या, ताळेबंदीच्या व्यवस्थेत ठेवावी.

रासायनिक संघटन

अनुक्रमांक	घटकाचे नाव	वजन
1	क्लोरंट्रानिलिप्रॉल सक्रिय घटक	18.50 % वजन/वजन
2	मिथाईल मेथाक्रिलेट एथॉक्सिलेटेड ग्राफ्ट सह-संयुग्मक	3.00 % वजन/वजन
3	एथिलीनऑक्साईड/प्रोपिलीनऑक्साईड ब्लॉक सह-संयुग्मक आणि एथॉक्सिलेटेड अल्कोहोल	2.00 % वजन/वजन
4	अटापल्गाइट माती	1.00 % वजन/वजन
5	झँथन गम	0.25 % वजन/वजन
6	1,2-बेन्झिसोथायझोलिन-3-वन	0.10 % वजन/वजन
7	सिलिकॉन इमल्शन	0.50 % वजन/वजन
8	प्रोपिलीन ग्लायकॉल	6.80 % वजन/वजन
9	पाणी	आवश्यकतेनुसार % वजन/वजन
	एकूण	100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

ક્લોરએન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5% ભાર/ભાર એસસી
(કીટનાશક)

ક્લોરએન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5% ભા/ભા એસ સી (20% ભા/ભા) એક અનોખા પ્રકારનું એવજી એન્થ્રાનિલામાઇડ કીટનાશક છે. આ એક બહુવિધ અસર ધરાવતું કીટનાશક છે જે ચોખા, કોબી, કપાસ, ઊસ, ટમેટા, મરચું, સોયાબીન, વાંગી, તૂર, ચણા, ઉડદ, કરેલા, ભીંડા, મકાઈ અને મગફળી પર લગનારા વિવિધ કીટકોના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ભલામણ

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)	પાણીમાં ઘોળવાનું પ્રમાણ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધીનો સમય (દિવસ)	દરેક છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ સમય (કલાક)
બંગાળ ચણા	શેંગ ભેદક ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા જાતિઓ અને હેલિકોવર્પા આર્મિજરા)	25	125	500	11	—
દૂધી / કરેલા	ફળ ભેદક ઇયળ અને ઇયળો (ડાયફાનિયા જાતિઓ અને હેલિકોવર્પા આર્મિજરા)	20–25	100–125	500	7	—
કાળા ચણા	શેંગ ભેદક ઇયળ (મરુકા જાતિઓ અને સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા)	20	100	500	20	—
રીંગણ	ફળ અને ડાંગર ભેદક ઇયળ (લ્યુસિનોડીસ ઓર્બોનાલિસ)	40	200	500–750	3	—
કોબી	હીરામોથ ઇયળ (પ્લુટેલા ઝાયલોસ્ટેલા)	10	50	500	3	—
મરચું	ફળ ભેદક ઇયળ (હેલિકોવર્પા આર્મિજરા, સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા, સ્પોડોપ્ટેરા એક્ઝિગુઆ)	30	150	500	3	—
કપાસ	અમેરિકન બોલવર્મ, ચિતરેલો બોલવર્મ, તમાકુ ઇયળ (હેલિકોવર્પા આર્મિજરા, એરીયાસ વિટેલા, સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા)	30	150	500	9	—
મગફળી	તમાકુ ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા)	30	150	500	28	—
મકાઈ	ચિતરેલો ડાંગર ભેદક, ગુલાબી ડાંગર ભેદક	40	200	500	10	—
ભીંડા	ફળ ભેદક ઇયળ (હેલિકોવર્પા આર્મિજરા અને એરીયાસ વિટેલા)	25	125	500	5	—
તુવર	શેંગ ભેદક ઇયળ અને શેંગ માખી (હેલિકોવર્પા આર્મિજરા અને મેલાનાગ્રોમાયઝા ઓબ્ટુસા)	30	150	500–750	29	—
ભાત	ડાંગર ભેદક અને પાંદડા વાળનાર ઇયળ (સ્કિર્ફોફાગા ઇન્સર્ટુલાસ અને નેફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	30	150	500	47	—
સોયાબીન	લીલા ઇયળ સમૂહ અને ગર્ડલ ભૃંગો (ક્રિસોડેક્સિસ એક્યુટા અને ગર્ડલ ભૃંગો)	30	150	500–750	22	—
ઊસ	ડાંગર ભેદક અને ટોપ બોરર (ઓડોન્ટોટર્મિસ ઓબેસસ / માઇક્રોટર્મિસ ઓબેસસ અને સ્કિર્ફોફાગા એક્સર્પટાલિસ)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
ઊસ	વહેલો ડાંગર ભેદક (ચિલો ઇન્ફ્યુસ્કાટેલસ)	75	375	1000	208	—
ટામેટાં	ફળ ભેદક ઇયળ (હેલિકોવર્પા આર્મિજરા)	30	150	500	3	—

વાપર માટે માર્ગદર્શિકા

(વાપરનો સમય અને રીત)

ઉસ: ઊસના ટાંકા કીટકો, નરમ તણું છિદક અને ટોપ છિદક કીટકોના નિયંત્રણ માટે અથવા વૃક્ષ - તણું અથવા જમીન પર છાંટવું, ઊસના ટોપ છિદક કીટકોના 3rd, 4th અને 5th ભ્રૂણ ડિમ્બો નિયંત્રણ માટે જૂન મહિનામાં જમીન પર છાંટવું. અન્ય પાક: ચોખા, કપાસ અને કોબી, ઊસ, ટમેટા, મરચું, સોયાબીન, વાંગી, તૂર, ચણા, ઉડદ, કરેલા અને ભીંડામાં કીટકોની સંખ્યા આર્થિક નુકસાનની સપાટીને (ETL) પહોંચી ગઈ હોય ત્યારે સ્પ્રે કરો.

વાપરનો સમય

C.I.B. માર્ગદર્શક સૂચનોનું પાલન કરો.

વપરાશકર્તાઓ માટે સાવચેતી

1). લેબલ અને પત્રક પર આપેલા તમામ સૂચનો કડકપણે અનુસરો, અકસ્માત અથવા ઝેરી પ્રતિક્રિયા થાય તો લેબલ સાથે કન્ટેનર સુરક્ષિત રાખો જેથી ડૉક્ટર દર્શાવી શકે.

2). સામગ્રીને સુગંધ ન આવતી હોય તેવા રીતે ઉપયોગ કરો. ઉપયોગ દરમિયાન રબરનાં દસ્તાના, રંગીન ચશ્મા, ચહેરાનું ઢાંકણું અને સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. હવાના પ્રવાહની દિશામાં છાંટો અને સ્પ્રેના છંટકાવથી બચો.

3). છાંટતી વખતે ખાવો, પીઓ, ધૂમ્રપાન ન કરો, તંબાકૂ/પાન ચબાવશો નહીં.

4). સ્પ્રે ટાંકીને 3/4 કરતા વધારે ભરશો નહીં. નોઝલમાં કણ ફસાય તો મોઢાથી ફૂંકશો નહીં, પાતળા વાયર અથવા પિનથી સાફ કરો.

5). શરીર પર છાંટો પડ્યા હોય તો પૂરતા પાણીથી ધોઈ નાખો.

6). છાંટવાનો કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી હંમેશા કપડા બદલાઓ અને સ્નાન કરો.

7). ખાવા, પીવા, ધૂમ્રપાન પહેલાં તથા ઉપયોગ પછી શરીરના ખુલ્લા ભાગો અને હાથ-પગોને સારી રીતે ધોઈ લો.

8). પુનઃઉપયોગ કરતાં પહેલા દૂષિત કપડાં કાઢીને ધોઈ લો.

9). જે કોઈએ તાજેતરમાં આ કીટનાશક વાપર્યો છે અથવા વાપરી રહ્યો છે, તેના પર ઝેરી લક્ષણો દેખાય તો તરત ડૉક્ટર બોલાવો.

ઝેરી લક્ષણો

આંખમાં હળવી ત્રાસ અને ધુમ્મસાવટ, વાપરવાં પર નાકમાંથી પાણી વહેવું.

પ્રાથમિક સારવાર

જો શ્વાસમાં ગયા હોય, તો ખાસ પ્રતિક્રિયા નહીં થાય કારણ કે સામગ્રી શ્વાસમાં ગયા પછી વધુ જોખમી નથી. ત્વચા પર સંપર્ક થવાથી પણ સામગ્રી વધારે જોખમી નથી, છતાં ત્વચાને સ્વચ્છ કરવું સારું છે. આંખમાં સંપર્ક થાય તો પણ ખૂબ જોખમી નહીં, પરંતુ અસર દેખાય તો પૂરતું પાણી છાંટીને આંખો ધોવો.

પાક ઝેરીપણા

શિફારસ કરેલી માત્રામાં વાપરવાથી પાક માટે ઝેરી નથી.

ઝેરનાશક

કોઈ ખાસ ઝેરી દવા નથી, લક્ષણો પ્રમાણે સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનું નિપટારું

આ કન્ટેનર પુનઃઉપયોગ માટે નથી. ખાલી કન્ટેનર નષ્ટ કરીને, નિવાસસ્થળથી 1/2 મીટર ઊંડા જમીનમાં દફન કરો. નિપટારાથી પર્યાવરણ, પીવાનું પાણી અથવા ખોરાક પ્રદૂષિત નહીં થાય. નિપટારાનું પાણી પાણીની સપાટી અથવા સફાઈ-ગટર/નિકાસ સિસ્ટમથી દૂર રાખો.

સંગ્રહ શરતો

આ સામગ્રીથી પ્રદૂષિત ખોરાક, પીવાનું કે તંબાકૂ ન વાપરો. આ વસ્તુઓ પ્રદૂષિત ન થાય તે રીતે જ દવા ભંડારવી. કીટનાશક સામગ્રી તેના મૂળ કન્ટેનરમાં, સારી રીતે બંધ કરીને ઠંડી, સુકી જગ્યાએ રાખવી, એવા રૂમ/પ્રાંગણમાં કે જ્યાં હવા આવે અને બંધ કરી શકાય, જેથી વાષ્પથી પ્રદૂષણ ન ફેલાય. કીટનાશક સામગ્રી ખોરાક, પ્રાણી ચારો, અન્ય કીટનાશક અને ખાતાંથી અલગ, તાળાવાળી વ્યવસ્થામાં રાખવી.

રાસાયણિક રચના।

ક્રમ સંખ્યા	ઘટકનું નામ	ભાર
1	ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ સક્રિય ઘટક	18.50 % વજન/વજન
2	મિથાઇલ મિથાક્રિલેટ એથોક્સિલેટેડ ગ્રાફ્ટ કો-પોલીમર	3.00 % વજન/વજન
3	ઇથિલીનઓક્સાઇડ/પ્રોપિલીનઓક્સાઇડ બ્લોક કો-પોલીમર અને એથોક્સિલેટેડ આલ્કોહોલ	2.00 % વજન/વજન
4	એટાપલ્ગાઇટ મટી	1.00 % વજન/વજન
5	ઝાન્થાન ગમ	0.25 % વજન/વજન
6	1,2-બેન્ઝિસોથાયઝોલિન-3-વન	0.10 % વજન/વજન
7	સિલિકોન ઇમલ્શન	0.50 % વજન/વજન
8	પ્રોપિલીન ગ્લાયકોલ	6.80 % વજન/વજન
9	પાણી	જરૂરી પ્રમાણે % વજન/વજન
	કુલ	100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਐਸਸੀ
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਭਾ/ਭਾ ਐਸ ਸੀ (20% ਭਾ/ਭਾ) ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਵੀਜੀ ਐਂਥ੍ਰਾਨਿਲਾਮਾਈਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਚੌਲ, ਗੋਭੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਬੈਂਗਣ, ਤੂਰ, ਚਨਾ, ਉਦਦ, ਕਰੇਲਾ, ਭਿੰਡੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖ਼ਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ)
ਬੰਗਾਲ ਚਣਾ	ਫਲੀ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ)	25	125	500	11	—
ਦੂਧੀ / ਕਰੇਲਾ	ਫਲ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ (ਡਾਇਫਾਨੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ)	20–25	100–125	500	7	—
ਕਾਲਾ ਚਣਾ	ਫਲੀ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਮਾਰੂਕਾ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੂਰਾ)	20	100	500	20	—
ਬੈਗਨ	ਫਲ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਲਿਊਸੀਨੋਡਿਸ ਔਰਬੋਨਾਲਿਸ)	40	200	500–750	3	—
ਬੰਦ ਗੋਭੀ	ਹੀਰਾ ਮੋਥ ਸੁੰਡੀ (ਪਲੂਟੇਲਾ ਜ਼ਾਇਲੋਸਟੇਲਾ)	10	50	500	3	—
ਮਿਰਚ	ਫਲ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ, ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੂਰਾ, ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਐਕਜ਼ਿਗੁਆ)	30	150	500	3	—
ਕਪਾਹ	ਅਮਰੀਕੀ ਬੋਲਵਰਮ, ਚਿੱਟੇਦਾਰ ਬੋਲਵਰਮ, ਤਮਾਕੂ ਸੁੰਡੀ (ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ, ਏਰੀਆਸ ਵਿਟੇਲਾ, ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੂਰਾ)	30	150	500	9	—
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਤਮਾਕੂ ਸੁੰਡੀ (ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੂਰਾ)	30	150	500	28	—
ਮੱਕੀ	ਚਿੱਟੇਦਾਰ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਗੁਲਾਬੀ ਤਣਾ ਛੇਦਕ	40	200	500	10	—
ਭਿੰਡੀ	ਫਲ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ ਅਤੇ ਏਰੀਆਸ ਵਿਟੇਲਾ)	25	125	500	5	—
ਤੂਰ	ਫਲੀ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਫਲੀ ਮੱਖੀ (ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨਾਗ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਾ ਓਬਟੂਸਾ)	30	150	500–750	29	—
ਧਾਨ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਸਕਿਰਫੋਫਾਗਾ ਇਨਸਰਟੂਲਾਸ ਅਤੇ ਨੈਫਾਲੋਕ੍ਰੋਸਿਸ ਮੈਡੀਨਾਲਿਸ)	30	150	500	47	—
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਹਰੀ ਸੁੰਡੀ ਟੋਲੀ ਅਤੇ ਗਰਡਲ ਭੂੰਗਾ (ਕ੍ਰਾਇਸੋਡੈਕਸਿਸ ਏਕਿਊਟਾ ਅਤੇ ਗਰਡਲ ਭੂੰਗਾ)	30	150	500–750	22	—
ਗੰਨਾ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਟਾਪ ਬੋਰਰ (ਓਡੋਂਟੋਟਰਮਿਸ ਓਬੇਸਸ / ਮਾਈਕਰੋਟਰਮਿਸ ਓਬੇਸਸ ਅਤੇ ਸਕਿਰਫੋਫਾਗਾ ਐਕਸਰਪਟਾਲਿਸ)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
ਗੰਨਾ	ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਣਾ ਛੇਦਕ (ਚਿਲੋ ਇਨਫਿਊਸਕਾਟੇਲਸ)	75	375	1000	208	—
ਟਮਾਟਰ	ਫਲ ਛੇਦਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਹੇਲਿਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੈਰਾ)	30	150	500	3	—

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

(ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ)

ਗੰਨਾ: ਗੰਨੇ ਦੇ ਟੰਕ ਕੀਟਕਾ, ਨਰਮ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰ ਛੇਦਕ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ - ਤਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਓ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਛੇਦਕ ਕੀਟਾਂ ਦੇ 3rd, 4th ਅਤੇ 5th ਭ੍ਰੂਣ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਓ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ: ਚੌਲ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੋਭੀ, ਗੰਨਾ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਬੈਂਗਣ, ਤੂਰ, ਚਨਾ, ਉਦਦ, ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੱਧਰੀ (ETL) 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ. (C.I.B.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

1). ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਸਮੇਤ ਕੰਟੇਨਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2). ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਰੰਗੀਨ ਚਸ਼ਮੇ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਓ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

3). ਛਿੜਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖਾਉ, ਨਾ ਪਿਓ, ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ/ਪਾਨ ਚਬਾਓ।

4). ਸਪਰੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 3/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋ ਨਾ। ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਣ ਫਸਣ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂੰਕੋ ਨਾ, ਪਤਲੇ ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਿਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।

5). ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

6). ਛਿੜਕਾਓ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪੜੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਨ੍ਹਾਓ।

7). ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਧੂਮਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

8). ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਵੋ।

9). ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣ

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ, ਵਾਸ਼ਪ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣਾ।

ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਇਲਾਜ

ਜੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਵੋ।

ਪੌਦਾ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਸ਼ਕ

ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 1/2 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਾੜੋ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਜਾਂ ਸਫਾਈ-ਗਟਰ/ਨਿਕਾਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰੋ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਕਮਰਾ/ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਲਾ-ਚਾਬੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਰੱਖੋ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਭਾਰ
1	ਕਲੋਰਾਂਟ੍ਰਾਨਿਲੀਪ੍ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ	18.50 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਮੀਥਾਈਲ ਮੇਥਾਕ੍ਰਿਲੇਟ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟਡ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੋ-ਪੋਲਿਮਰ	3.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਈਥੀਲੀਨਆਕਸਾਈਡ/ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨਆਕਸਾਈਡ ਬਲੌਕ ਕੋ-ਪੋਲਿਮਰ ਅਤੇ ਈਥੋਕਸੀਲੇਟਡ ਐਲਕੋਹੋਲ	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਐਟਾਪਲਗਾਈਟ ਮਿੱਟੀ	1.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਜ਼ੈਂਥਨ ਗਮ	0.25 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
6	1,2-ਬੈਂਜ਼ਇਸੋਥਾਇਜੋਲਿਨ-3-ਵਨ	0.10 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
7	ਸਿਲਿਕੋਨ ਇਮਲਸ਼ਨ	0.50 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
8	ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	6.80 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
9	ਪਾਣੀ	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ % ਭਾਰ/ਭਾਰ
	ਕੁੱਲ	100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

ক্লোরএন্ট্রানিলিপ্রল 18.5% ভাগ/ভাগ এসসি
(পোকামাকড়নাশক)

ক্লোরএন্ট্রানিলিপ্রল 18.5% ভা/ভা এস সি (20% ভা/ভা) একটি অনন্য ধরনের এভিজি এন্ট্রানিলামাইড পোকামাকড়নাশক। এটি একটি বহু-দিকীয় প্রভাবসম্পন্ন পোকামাকড়নাশক যা ধান, বাঁধাকপি, তুলা, আখ, টমেটো, মরিচ, সয়াবিন, বেগুন, তুর, ছোলা, উড়দ, করেলা, ভিন্ডি, মকাই এবং মুগফলীতে লাগা বিভিন্ন পোকামাকড়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সুপারিশ

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টর পরিমাণ সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফরমুলেশন (মি.লি.)	পানিতে মিশ্রণের পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল (দিন)	প্রতিটি প্রয়োগের পর পুনঃপ্রবেশ সময় (ঘন্টা)
বাংলা ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা (স্পোডোপটেরা প্রজাতি ও হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা)	25	125	500	11	—
লাউ / করলা	ফল ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা ও শুঁয়োপোকাসমূহ (ডায়াফানিয়া প্রজাতি ও হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা)	20–25	100–125	500	7	—
কালো ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা (মারুকা প্রজাতি ও স্পোডোপটেরা লিটুরা)	20	100	500	20	—
বেগুন	ফল ও ডগা ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা (লিউসিনোডিস অরবোনালিস)	40	200	500–750	3	—
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ শুঁয়োপোকা (প্লুটেলা জাইলস্টেলা)	10	50	500	3	—
মরিচ	ফল ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা (হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা, স্পোডোপটেরা লিটুরা, স্পোডোপটেরা এক্সিগুয়া)	30	150	500	3	—
তুলা	আমেরিকান বলওয়ার্ম, দাগযুক্ত বলওয়ার্ম, তামাক শুঁয়োপোকা (হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা, এ্যারিয়াস ভিটেলা, স্পোডোপটেরা লিটুরা)	30	150	500	9	—
চিনাবাদাম	তামাক শুঁয়োপোকা (স্পোডোপটেরা লিটুরা)	30	150	500	28	—
ভুট্টা	দাগযুক্ত কাণ্ড ছিদ্রকারী, গোলাপি কাণ্ড ছিদ্রকারী	40	200	500	10	—
ঢেঁড়স	ফল ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা (হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা ও এ্যারিয়াস ভিটেলা)	25	125	500	5	—
তুর ডাল	শুঁটি ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা ও শুঁটি মাছি (হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা ও মেলানাগ্রোমাইজা অবটুসা)	30	150	500–750	29	—
ধান	কাণ্ড ছিদ্রকারী ও পাতা মোড়ানো শুঁয়োপোকা (স্কিরফোফাগা ইনসার্টুলাস ও নেফালোক্রোসিস মেডিনালিস)	30	150	500	47	—
সয়াবিন	সবুজ শুঁয়োপোকা দল ও গার্ডল বিটল (ক্রাইসোডেক্সিস একিউটা ও গার্ডল বিটল)	30	150	500–750	22	—
আখ	কাণ্ড ছিদ্রকারী ও টপ বোরার (ওডোন্টোটার্মিস ওবেসাস / মাইক্রোটার্মিস ওবেসাস ও স্কিরফোফাগা এক্সারপটালিস)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
আখ	প্রাথমিক কাণ্ড ছিদ্রকারী (চিলো ইনফিউস্কাটেলাস)	75	375	1000	208	—
টমেটো	ফল ছিদ্রকারী শুঁয়োপোকা (হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা)	30	150	500	3	—

ব্যবহারের নির্দেশনা
(ব্যবহারের সময় ও পদ্ধতি)
আখ: আখের ট্যাঙ্ক পোকা, কোমল কান্ড ছিদ্রক এবং শীর্ষ ছিদ্রক পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য বা গাছ - কান্ড বা মাটিতে ছিটান, আখের শীর্ষ ছিদ্রক পোকাগুলির 3rd, 4th এবং 5th ভ্রূণ ডিম নিয়ন্ত্রণের জন্য জুন মাসে মাটিতে ছিটান। অন্যান্য ফসল: ধান, তুলা এবং বাঁধাকপি, আখ, টমেটো, মরিচ, সয়াবিন, বেগুন, তুর, ছোলা, উড়দ, করেলা এবং ভিন্ডিতে পোকাদের সংখ্যা আর্থিকভাবে ক্ষতির সীমায় (ETL) পৌঁছালে স্প্রে করুন।

ব্যবহারের সময়
সি.আই.বি. (C.I.B.) নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা
1). লেবেল এবং পত্রিকায় দেওয়া সমস্ত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করুন, দুর্ঘটনা বা বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেবেলসহ কন্টেইনার নিরাপদ রাখুন যাতে ডাক্তারকে দেখানো যায়।
2). পদার্থটি গন্ধ না নিন। ব্যবহার সময় রবারের দস্তানা, রঙিন চশমা, মুখোশ এবং সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন। বাতাসের প্রবাহের দিকে ছিটান এবং স্প্রের ছিটে থেকে বাঁচুন।
3). ছিটানোর সময় খান, পান করুন বা ধূমপান করবেন না; তামাক/পান চিবাবেন না।
4). স্প্রে ট্যাংক 3/4 এর বেশি পূর্ণ করবেন না। নোজলে কণার আটকে গেলে মুখ দিয়ে ফুঁকবেন না, পাতলা তার বা পিন দিয়ে পরিষ্কার করুন।
5). শরীরে ছিটলে তবে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।
6). ছিটানোর কাজ শেষ হলে সর্বদা পোশাক পরিবর্তন করুন এবং গোসল করুন।
7). খাওয়া, পান করা, ধূমপানের আগে এবং ব্যবহারের পরে শরীরের উন্মুক্ত অংশ ও হাত-পা ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
8). পুনঃব্যবহারের আগে দূষিত পোশাক বের করে ধুয়ে নিন।
9). যিনি সাম্প্রতিক সময়ে এই পোকামাকড়নাশক ব্যবহার করেছেন বা করছেন, তাদের উপর বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডাকুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
চোখে হালকা জ্বালা এবং ঝাপসা দেখা, বাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাসে গেলে নাক থেকে পানি ঝরে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
যদি শ্বাসপ্রশ্বাসে চলে যায়, বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না কারণ পদার্থ শ্বাসপ্রশ্বাসে গেলে অত্যন্ত বিপজ্জনক নয়। ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শ হলেও পদার্থ খুব বিপজ্জনক নয়, তবুও ত্বক পরিষ্কার করা ভালো। চোখের সঙ্গে সংস্পর্শ হলেও খুব বিপজ্জনক নয়, কিন্তু প্রভাব দেখা দিলে প্রচুর পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে নিন।

ফসলের বিষক্রিয়াশীলতা
প্রস্তাবিত মাত্রায় ব্যবহারে ফসলের জন্য বিষক্রিয়াশীল নয়।

বিষনাশক
কোনও বিশেষ বিষ নাশক ওষুধ নেই, লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।

খালি বাক্সের নিষ্পত্তি
এই কন্টেইনার পুনরায় ব্যবহারের জন্য নয়। খালি কন্টেইনার ধ্বংস করে, বাসস্থানের থেকে 1/2 মিটার গভীর মাটিতে পুঁতে দিন। নিষ্পত্তির পরিবেশ, পানীয় জল বা খাদ্য দূষিত করা যাবে না। নিষ্পত্তির পানি পানির سطح বা পরিষ্কার-নিষ্কাশন সিস্টেম থেকে দূরে রাখুন।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
এই পদার্থ দ্বারা দূষিত খাদ্য, পানীয় বা তামাক ব্যবহার করবেন না। সব জিনিস দূষিত না হওয়ার উপায়ে ওষুধ সংরক্ষণ করুন। পোকামাকড়নাশক পদার্থ তাদের মূল কন্টেইনারে, ভালোভাবে বন্ধ করে ঠান্ডা, শুষ্ক জায়গায় রাখুন, এমন ঘর/প্রাঙ্গণ যেখানে বাতাস চলে এবং বন্ধ করা যায়, যাতে বাষ্প দ্বারা দূষণ না ছড়ায়। পোকামাকড়নাশক পদার্থ খাবার, প্রাণীর চারণ, অন্যান্য পোকামাকড়নাশক এবং সার থেকে আলাদা, তালা-চাবির ব্যবস্থা অনুযায়ী রাখুন।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক সংখ্যা	উপাদানের নাম	ওজন
1	ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল সক্রিয় উপাদান	18.50 % ওজন/ওজন
2	মিথাইল মেথাক্রিলেট ইথক্সিলেটেড গ্রাফট কো-পলিমার	3.00 % ওজন/ওজন
3	ইথিলিনঅক্সাইড/প্রোপিলিনঅক্সাইড ব্লক কো-পলিমার এবং ইথক্সিলেটেড অ্যালকোহল	2.00 % ওজন/ওজন
4	অ্যাটাপালগাইট মাটি	1.00 % ওজন/ওজন
5	জ্যান্থান গাম	0.25 % ওজন/ওজন
6	1,2-বেঞ্জিসোথায়াজোলিন-3-ওয়ান	0.10 % ওজন/ওজন
7	সিলিকন ইমালশন	0.50 % ওজন/ওজন
8	প্রোপিলিন গ্লাইকোল	6.80 % ওজন/ওজন
9	পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী % ওজন/ওজন
	মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

క్లోరెంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% భార/భార ఎస్‌సి
(పోకామోకాళ్ల నాశక)

క్లోరెంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% భా/భా ఎస్‌సి (20% భా/భా) ఒక ప్రత్యేక రకమైన AVJ యాంట్రానిలామైడ్ పోకామోకాళ్ల నాశక. ఇది బహుముఖ ప్రభావం కలిగిన పోకామోకాళ్ల నాశక, ఇది అన్నం, గొబ్బి, పత్తి, చెక్కరిపాద, టమాటా, మిరప, సోయాబీన్, వంకాయ, తూర, శనగ, ఉల్లిపాయ, బీరకాయ, బెండ్, మక్కజొన్న మరియు మినుములపై వచ్చే వివిధ కీటకాల నియంత్రణకు సూచించబడింది

సిఫారసు

పంటలు	కీటకపు సాధారణ పేరు	హెక్టారుకు అవసరమైన మోతాదు క్రియాశీల పదార్థం (గ్రాము)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీటరు)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచిచూడు కాలం (రోజులు)	ప్రతి ప్రయోగం తర్వాత పునఃప్రవేశ సమయం (గంటలు)
బెంగాల్ సెనగ	కాయ త్రవ్వే పురుగు (స్పోడోప్టెరా జాతులు మరియు హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా)	25	125	500	11	—
సొరకాయ / కాకరకాయ	పండు త్రవ్వే పురుగు మరియు పురుగులు (డ్రైఫేనియా జాతులు మరియు హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా)	20–25	100–125	500	7	—
నల్ల శెనగ	కాయ త్రవ్వే పురుగు (మరుకా జాతులు మరియు స్పోడోప్టెరా లిటూరా)	20	100	500	20	—
వంకాయ	పండు మరియు కొమ్మ త్రవ్వే పురుగు (ల్యూసినోడిస్ ఆర్బోనాలిస్)	40	200	500–750	3	—
కోసు	డైమండ్ బ్యాక్ చిమ్మట పురుగు (ప్లూటెల్లా జైలోస్టెల్లా)	10	50	500	3	—
మిరప	పండు త్రవ్వే పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా, స్పోడోప్టెరా లిటూరా, స్పోడోప్టెరా ఎక్సిగ్వా)	30	150	500	3	—
పత్తి	అమెరికన్ బోల్‌వార్మ్, మచ్చల బోల్‌వార్మ్, పొగాకు పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా, ఏరియాస్ విటెల్లా, స్పోడోప్టెరా లిటూరా)	30	150	500	9	—
వేరుశెనగ	పొగాకు పురుగు (స్పోడోప్టెరా లిటూరా)	30	150	500	28	—
మొక్కజొన్న	మచ్చల కాండం త్రవ్వే పురుగు, గులాబీ కాండం త్రవ్వే పురుగు	40	200	500	10	—
బెండ	పండు త్రవ్వే పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా మరియు ఏరియాస్ విటెల్లా)	25	125	500	5	—
కంది	కాయ త్రవ్వే పురుగు మరియు కాయ ఈగ (హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా మరియు మెలానాగ్రోమైజా ఒబ్టూసా)	30	150	500–750	29	—
వరి	కాండం త్రవ్వే పురుగు మరియు ఆకులు మడిచే పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఇన్సర్టులాస్ మరియు నెఫాలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	30	150	500	47	—
సోయాబీన్	ఆకుపచ్చ పురుగుల గుంపు మరియు గర్డిల్ బీటిల్ (క్రైసోడెక్సిస్ అక్యూటా మరియు గర్డిల్ బీటిల్)	30	150	500–750	22	—
చెరకు	కాండం త్రవ్వే పురుగు మరియు టాప్ బోరర్ (ఒడోంటోటెర్మిస్ ఒబేసస్ / మైక్రోటెర్మిస్ ఒబేసస్ మరియు స్కిర్పోఫాగా ఎక్సర్ప్టాలిస్)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
చెరకు	ప్రారంభ కాండం త్రవ్వే పురుగు (చిలో ఇన్ఫ్యూస్కాటెల్లస్)	75	375	1000	208	—
టమోటా	పండు త్రవ్వే పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా)	30	150	500	3	—

వాడుక కోసం మార్గదర్శకాలు
(వాడుకునే సమయం మరియు విధానం)
చెక్కరిపాద: చెక్కరిపాద తండు కీటకాలు, మృదువైన కాండ్ల రంధ్రక కీటకాలు మరియు పై తండు రంధ్రక కీటకాల నియంత్రణ కోసం లేదా వృక్షం - తండు లేదా మట్టిలో చల్లి, చెక్కరిపాద పై తండు రంధ్రక కీటకాల 3వ, 4వ మరియు 5వ గర్భస్థ గుడ్లను నియంత్రించడానికి జూన్ నెలలో మట్టిలో చల్లాలి. ఇతర పంటలు: అన్నం, పత్తి మరియు గొబ్బి, చెక్కరిపాద, టమాటా, మిరప, సోయాబీన్, వంకాయ, తూర, శనగ, ఉల్లిపాయ, బీరకాయ మరియు బెండీలో కీటకాల సంఖ్య ఆర్థిక నష్ట పరిమితి (ETL) చేరినప్పుడు స్ప్రే చేయాలి.

వాడుక సమయం
సి.ఐ.బి. (C.I.B.) మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

వాడుకదారుల కోసం జాగ్రత్తలు
1). లేబుల్ మరియు పత్రాలలో ఇచ్చిన అన్ని సూచనలను కచ్చితంగా పాటించండి, ప్రమాదం లేదా విష ప్రభావం ఉన్నప్పుడు లేబుల్ తో కంటైనర్ ను సురక్షితంగా ఉంచండి, డాక్టర్ కి చూపించగలిగేలా.
2). పదార్థాన్ని వాసన చేయవద్దు. వాడుతున్నప్పుడు రబ్బర్ గ్లోవ్స్, రంగురంగుల కళ్ళజోడులు, ముఖముసుగు మరియు రక్షణ బట్టలు ధరించండి. గాలి ప్రవాహ దిశలో చల్లి స్ప్రే చిమ్మిన ద్రవం నుండి దూరంగా ఉండండి.
3). స్ప్రే సమయంలో తినకండి, త్రాగకండి, పొగ తీయకండి; పొగాకు/పాన్ తీసుకోకండి.
4). స్ప్రే ట్యాంక్ 3/4 కంటే ఎక్కువ నింపవద్దు. నోజిల్‌లో కణాలు చిక్కితే నోటితో ఊదకండి, బారిగా తార లేదా పిన్ తో శుభ్రం చేయండి.
5). శరీరానికి చిమ్మితే ఎక్కువ నీటితో కడగండి.
6). స్ప్రే పూర్తయిన వెంటనే ఎల్లప్పుడూ దుస్తులు మార్చండి మరియు స్నానం చేయండి.
7). తినడం, త్రాగడం, పొగ తీయడం మొదలైన వాటి ముందు మరియు వాడిన తరువాత శరీరపు తేలికైన భాగాలు మరియు చేతులు, కాళ్లను బాగా కడగండి.
8). మళ్ళీ వాడక ముందు మలినమైన దుస్తులను తీసి కడగండి.
9). ఈ పోకామోకాళ్ల నాశకాన్ని ఇటీవల ఉపయోగించిన లేదా ఉపయోగిస్తున్న వ్యక్తులపై విష లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ను పిలవండి.

విష లక్షణాలు
కళ్ళలో తేలికపాటి మంట మరియు మసకవిన చూపు, ఆవిరి శ్వాసలోకి వెళ్ళితే ముక్కు నుండి నీరు పాయడం.

ప్రాథమిక చికిత్స
శ్వాసలోకి పోయినట్లయితే, ప్రత్యేక ప్రతిక్రియ ఉండదు, ఎందుకంటే పదార్థం శ్వాసలోకి వెళ్ళినా ఎక్కువ ప్రమాదకరం కాదు. చర్మానికి సంబంధం ఉన్నా ఎక్కువ ప్రమాదం లేదు, అయినప్పటికీ చర్మాన్ని శుభ్రం చేయడం మంచిది. కళ్ళకు సంబంధం ఉన్నా ఎక్కువ ప్రమాదం లేదు, కానీ ప్రభావం కనిపిస్తే ఎక్కువ నీటితో కళ్ళను కడగండి.

పంట విషాకత
సిఫార్సు చేసిన పరిమాణంలో వాడితే పంటలకు విషాకత లేదు.

విషనాశక
ఏ ప్రత్యేక విషనాశక మందు లేదు, లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వాహణ
ఈ కంటైనర్లు మళ్లీ వాడకం కోసం లేను. ఖాళీ కంటైనర్లను ధ్వంసం చేసి, నివాస స్థలంలో నుండి 1/2 మీటర్ లోతు మట్టిలో పూయాలి. నిర్వీర్యం వల్ల పర్యావరణం, త్రాగునీరు లేదా ఆహారం కాలుష్యం చెందరాదు. నిర్వీర్యపు నీటిని నీటి ఉపరితలములు లేదా శుద్ధి-నికాస వ్యవస్థ నుండి దూరంగా ఉంచాలి.

సంగ్రహ పరిస్థితులు
ఈ పదార్థంతో కాలుష్యమైన ఆహారం, పానీ లేదా పొగాకు వాడకండి. అన్ని వస్తువులు కాలుష్యములేని విధంగా ఉండాలి. పోకామోకాళ్ల నాశక పదార్థాన్ని దాని అసలు కంటైనర్‌లో బాగా మూసి, చల్లని, ఎండిన ప్రదేశంలో ఉంచండి, గాలి వెళ్లే, మూసి పెట్టగలిగిన ప్రాంగణంలో ఉంచాలి, తద్వారా ఆవిరి వల్ల కాలుష్యం వ్యాప్తి చెందదు. పోకామోకాళ్ల నాశక పదార్థాన్ని ఆహారం, జంతు చారం, ఇతర పోకామోకాళ్ల నాశకాలు మరియు ఎరువుల నుండి వేరు చేసి, తాళా-తాళీ సౌకర్యంలో ఉంచాలి.

రసాయనిక సంయోజనం

క్రమ సంఖ్య	పదార్థం పేరు	భారం
1	క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ క్రియాశీలక పదార్థం	18.50 % బరువు/బరువు
2	మీథైల్ మేథాక్రిలేట్ ఎథాక్సిలేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ కో-పోలీమర్	3.00 % బరువు/బరువు
3	ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్/ప్రొపిలీన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కో-పోలీమర్ మరియు ఎథాక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్	2.00 % బరువు/బరువు
4	అటాపుల్గైట్ మట్టి	1.00 % బరువు/బరువు
5	జంతాన్ గం	0.25 % బరువు/బరువు
6	1,2-బెంజిసోథయాజోలిన్-3-వన్	0.10 % బరువు/బరువు
7	సిలికోన్ ఎమల్షన్	0.50 % బరువు/బరువు
8	ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	6.80 % బరువు/బరువు
9	నీరు	అవసరమయితే % బరువు/బరువు
	మొత్తం	100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

குளோரென்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% எடை/எடை எஸ்சி
(பூச்சிக்கொல்லி)

குளோரென்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% எடை/எடை எஸ் சி (20% எடை/எடை) ஒரு தனித்துவமான வகை AVJ ஆந்த்ரானிலமைடு பூச்சிக்கொல்லி. இது ஒரு பல்வழிக் கொண்ட தாக்கம் கொண்ட பூச்சிக்கொல்லி, அரிசி, பீர்க்கங்காய், பருத்தி, கரும்பு, தக்காளி, மிளகாய், சோயாபீன், கத்திரிக்காய், துவரை, சுண்டல், உளுந்து, பீர்க்கங்காய், வெண்டைக்காய், மக்காச்சோளம் மற்றும் நிலக்கடலை போன்ற பயிர்களில் வரும் பல்வேறு பூச்சிகளின் தடுப்பு செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரை

பயிர்கள்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு தேவையான அளவு செயலில் உள்ள கூறு (கிராம்)	தயாரிப்பு அளவு (மி.லி.)	நீரில் கலக்கும் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பின் மீண்டும் நுழையும் காலம் (மணிநேரம்)
வங்காளக் கடலை	தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான் புழு (ஸ்போடோப்டெரா இனங்கள் மற்றும் ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா)	25	125	500	11	—
சுரைக்காய் / பாகற்காய்	பழ துளைப்பான் புழு மற்றும் புழுக்கள் (டையஃபேனியா இனங்கள் மற்றும் ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா)	20–25	100–125	500	7	—
கருப்பு கொண்டைக் கடலை	காய் துளைப்பான் புழு (மருக்கா இனங்கள் மற்றும் ஸ்போடோப்டெரா லிடூரா)	20	100	500	20	—
கத்திரிக்காய்	பழம் மற்றும் கொடி துளைப்பான் புழு (லியூசினோடிஸ் ஆர்போனாலிஸ்)	40	200	500–750	3	—
முட்டைக் கோஸ்	டைமண்ட் பேக் அந்துப்பூச்சி புழு (ப்ளூடெல்லா சைலோஸ்டெல்லா)	10	50	500	3	—
மிளகாய்	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா, ஸ்போடோப்டெரா லிடூரா, ஸ்போடோப்டெரா எக்சிகுவா)	30	150	500	3	—
பருத்தி	அமெரிக்கன் பால் புழு, புள்ளி பால் புழு, புகையிலை புழு (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா, ஏரியாஸ் விட்டெல்லா, ஸ்போடோப்டெரா லிடூரா)	30	150	500	9	—
நிலக்கடலை	புகையிலை புழு (ஸ்போடோப்டெரா லிடூரா)	30	150	500	28	—
மக்காச்சோளம்	புள்ளி தண்டு துளைப்பான், இளஞ்சிவப்பு தண்டு துளைப்பான்	40	200	500	10	—
வெண்டை	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா மற்றும் ஏரியாஸ் விட்டெல்லா)	25	125	500	5	—
துவரை	காய் துளைப்பான் புழு மற்றும் காய் ஈ (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா மற்றும் மெலனாக்ரோமைசா ஒப்டூசா)	30	150	500–750	29	—
நெல்	தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை சுருட்டும் புழு (ஸ்கிர்ஃபோஃபாகா இன்செர்டுலாஸ் மற்றும் நெபாலோக்ரோசிஸ் மெடினாலிஸ்)	30	150	500	47	—
சோயாபீன்	பச்சை புழு கூட்டம் மற்றும் கேர்டில் வண்டு (கிரைசோடெக்சிஸ் அக்யூட்டா மற்றும் கேர்டில் வண்டு)	30	150	500–750	22	—
கரும்பு	தண்டு துளைப்பான் மற்றும் மேல் துளைப்பான் (ஓடோன்டோடெர்மிஸ் ஓபேசஸ் / மைக்ரோடெர்மிஸ் ஓபேசஸ் மற்றும் ஸ்கிர்ஃபோஃபாகா எக்ஸர்ப்டாலிஸ்)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
கரும்பு	ஆரம்ப தண்டு துளைப்பான் (சிலோ இன்ஃப்யூஸ்காடெல்லஸ்)	75	375	1000	208	—
தக்காளி	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	3	—

பயன்பாட்டிற்கான வழிகாட்டி
(பயன்பாட்டு நேரம் மற்றும் முறை)
கரும்பு: கரும்பின் தீம் பூச்சிகள், மென்மையான தண்டு குத்துபவர் மற்றும் மேல் தண்டு குத்துபவர் பூச்சிகளின் தடுப்பு அல்லது மரம் - தண்டு அல்லது மண்ணில் பரப்பவும், கரும்பின் மேல் தண்டு குத்துபவர் பூச்சிகளின் 3வது, 4வது மற்றும் 5 வது முட்டைகளை கட்டுப்படுத்த ஜூன் மாதத்தில் மண்ணில் பரப்ப வேண்டும்.

மற்ற பயிர்கள்: அரிசி, பருத்தி மற்றும் பீர்க்கங்காய், கரும்பு, தக்காளி, மிளகாய், சோயாபீன், கத்திரிக்காய், துவரை, சுண்டல், உளுந்து, பீர்க்கங்காய் மற்றும் வெண்டைக்காயின் போது பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை பொருளாதார நஷ்ட வரம்பில் (ETL) இருந்தால் ஸ்ப்ரே செய்யவும்.

பயன்பாட்டு நேரம்
சி.ஐ.பி. வழிகாட்டல்களை பின்பற்றவும்.

பயன்பாட்டாளர்களுக்கான எச்சரிக்கைகள்
1). லேபிள் மற்றும் குறிப்புகளில் உள்ள அனைத்து வழிகாட்டல்களையும் கடுமையாக பின்பற்றவும், விபத்து அல்லது விஷபிரபாவம் ஏற்பட்டால் லேபிள் உடன் கன்டெய்னரை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள், மருத்துவருக்கு காட்ட முடியும்.
2). பொருளை மூச்சுத் தொட்டு உணர்வது கூடாது. பயன்பாட்டு நேரத்தில் ரப்பர் கையுறைகள், வண்ணமயமான கண்ணாடிகள், முகக்கவசம் மற்றும் பாதுகாப்பான உடைகள் அணியவும். காற்றின் போக்கில் ஸ்ப்ரே செய்யவும் மற்றும் ஸ்ப்ரே துளிகளைத் தவிர்க்கவும்.
3). ஸ்ப்ரே செய்யும் போது சாப்பிடாதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், புகை பிடிக்காதீர்கள்; தம்பாக்கு/பான் இரசிக்காதீர்கள்.
4). ஸ்ப்ரே டேங்க் 3/4ஐத் தாண்டி நிரப்ப வேண்டாம். நொஸலில் துகள் சிக்கியால் வாயிலால் ஊத வேண்டாம், மெல்லிய கம்பி அல்லது பின் கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.
5). உடலுக்கு துளி விழுந்தால் நிறைய நீரில் சுத்தம் செய்யவும்.
6). ஸ்ப்ரே சிகிச்சை முடிந்தவுடன் எப்போதும் உடைகளை மாற்றவும் மற்றும் குளிக்கவும்.
7). சாப்பிடுவதற்கு, குடிப்பதற்கு, புகை பிடிப்பதற்கு முன் மற்றும் பயன்படுத்திய பிறகு உடலின் திறந்த பகுதிகள் மற்றும் கைகள்/கால்களை நன்கு கழுவவும்.
8). மீண்டும் பயன்படுத்தும் முன் மாசுபட்ட உடைகளை எடுத்து கழுவவும்.
9). சமீபத்தில் இந்த பூச்சிக்கொல்லியை பயன்படுத்தியவர்கள் அல்லது பயன்படுத்தும் போது விஷபிரபாவம் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும்.

விஷக்காட்சி
கண்களில் சிறிய எரிச்சல் மற்றும் மங்கலான காட்சி, வாஷ்ப் மூச்சில் சென்றால் மூக்கில் நீர் வடிக்கிறது.

முதன்மை சிகிச்சை
மூச்சில் சென்றால், சிறப்பு பதிலுரை இல்லை, ஏனெனில் பொருள் மூச்சில் சென்றாலும் அதிக ஆபத்தானது இல்லை. தோலில் தொடர்பு ஏற்பட்டால் மிகவும் ஆபத்தானது அல்ல, இருந்தாலும் தோலை சுத்தம் செய்தல் நல்லது. கண்களில் தொடர்பு ஏற்பட்டால் மிகுந்த ஆபத்தானது அல்ல, ஆனால் தாக்கம் தோன்றினால் நிறைய நீரில் கண்களை கழுவவும்.

பயிர் விஷம்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் பயிர்களுக்கு விஷமில்லாதது.

விஷநாசி
சிறப்பு விஷநாசி மருந்து இல்லை, அறிகுறிகள் படி சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்.

காலியான டப்பாக்கள்
இந்த கன்டெய்னர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு அல்ல. காலியான கன்டெய்னர்கள் அழித்து, குடியிருப்பு இடத்திலிருந்து 1/2 மீட்டர் ஆழமான மண்ணில் புதைக்கவும். விஷபொருள் சூழல், குடிநீர் அல்லது உணவு மாசுபட கூடாது. பயன்படுத்திய நீரை நீரின் மேற்பரப்போ அல்லது சுத்திகரிப்பு-கட்டமைப்பில் இருந்து விலக்கி வைக்கவும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்
இந்தப் பொருளால் மாசுபட்ட உணவு, பானம் அல்லது தம்பாக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம். அனைத்தும் மாசுபடாதவாறு வைக்க வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லி பொருளை அதன் அசல் கன்டெய்னரில், நன்கு மூடி, குளிர்ந்த, உலர் இடத்தில் வைக்கவும். காற்று செல்லும் மற்றும் மூடக்கூடிய அறை/பரிசரத்தில் வைக்கவும், வாஷ்ப் மூலம் மாசுபாடு பரவாதபடி கவனிக்கவும். பூச்சிக்கொல்லி பொருளை உணவு, விலங்குகளின் உணவு, மற்ற பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் உரங்களிலிருந்து தனியாக, பூட்டு மற்றும் சாவி வசதியில் வைக்கவும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு பெயர்	எடை
1	க்ளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் செயற்பாட்டு கூறு	18.50 % எடை/எடை
2	மெத்தியில் மெத்தக்ரிலேட் ஈதோக்சிலேட்டட் கிராஃப்ட் கோ-பாலிமர்	3.00 % எடை/எடை
3	ஈதிலீன் ஆக்சைடு/புரோபிலீன் ஆக்சைடு பிளாக் கோ-பாலிமர் மற்றும் ஈதோக்சிலேட்டட் ஆல்கஹால்	2.00 % எடை/எடை
4	அட்டாபல்கைட் மண்	1.00 % எடை/எடை
5	ஜான்தான் காம்	0.25 % எடை/எடை
6	1,2-பென்ஜிஸ்தியாசோத்தியாசோலின்-3-ஒன்	0.10 % எடை/எடை
7	சிலிகான் ஈமல்ஷன்	0.50 % எடை/எடை
8	புரோபிலீன் கிளைகால்	6.80 % எடை/எடை
9	தண்ணீர்	தேவையின்படி % எடை/எடை
	மொத்தம்	100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಕ್ಲೋರೇಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರಾಲ್ 18.5% ಭಾರ/ಭಾರ ಎಸಿಸಿ
(ಹೀಟಕಾನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರೇಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರಾಲ್ 18.5% ಭಾ/ಭಾ ಎಸಿಸಿ (20% ಭಾ/ಭಾ) ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ AVJ ಎಂಥ್ರಾನಿಲಾಮೈಡ್ ಹೀಟಕಾನಾಶಕ. ಇದು ಬಹುಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಹೀಟಕಾನಾಶಕ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಬಿ, ಹತ್ತಿ, ಗದ್ದೆ, ಟೊಮೇಟೋ, ಮೆಣಸು, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬದನೇಕಾಯಿ, ತುರಿ, ಚಣ, ಉದ್ದಿನ, ಕರೇಲಾ, ಬೀನ್ಸ್, ಮಕೆಯಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರುಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲಿ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ ಪುನಃಪ್ರವೇಶ ಸಮಯ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಬೆಂಗಾಳ ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿ ತೂರುವ ಹುಳು (ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ)	25	125	500	11	—
ಸೋರೆಕಾಯಿ / ಹಾಗಲಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ತೂರುವ ಹುಳುಗಳು (ಡೈಫೇನಿಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ)	20–25	100–125	500	7	—
ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿ ತೂರುವ ಹುಳು (ಮರುಕಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟೂರಾ)	20	100	500	20	—
ಬದನೇಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ತೂರುವ ಹುಳು (ಲ್ಯೂಸಿನೋಡಿಸ್ ಆರ್ಬೋನಾಲಿಸ್)	40	200	500–750	3	—
ಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳು (ಪ್ಲೂಟೆಲ್ಲಾ ಜೈಲೊಸ್ಟೆಲ್ಲಾ)	10	50	500	3	—
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ತೂರುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ, ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟೂರಾ, ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಎಕ್ಸಿಗ್ವಾ)	30	150	500	3	—
ಹತ್ತಿ	ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೋಲ್‌ವರ್ಮ್, ಚಿತ್ತಾರದ ಬೋಲ್‌ವರ್ಮ್, ತಂಬಾಕು ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ, ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಟೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟೂರಾ)	30	150	500	9	—
ಶೇಂಗಾ	ತಂಬಾಕು ಹುಳು (ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟೂರಾ)	30	150	500	28	—
ಜೋಳ	ಚಿತ್ತಾರದ ಕಾಂಡ ತೂರುವ ಹುಳು, ಗುಲಾಬಿ ಕಾಂಡ ತೂರುವ ಹುಳು	40	200	500	10	—
ಬೆಂಡೆ	ಹಣ್ಣು ತೂರುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಟೆಲ್ಲಾ)	25	125	500	5	—
ತೊಗರಿ	ಕಾಯಿ ತೂರುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಈಗೆ (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ ಮತ್ತು ಮೆಲನಾಗ್ರೊಮೈಜಾ ಒಬ್ಟೂಸಾ)	30	150	500–750	29	—
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ತೂರುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮಡಚುವ ಹುಳು (ಸ್ಕಿರ್ಪೋಫಾಗಾ ಇನ್ಸರ್ಟುಲಾಸ್ ಮತ್ತು ನೆಫಾಲೊಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	30	150	500	47	—
ಸೋಯಾಬಿನ್	ಹಸಿರು ಹುಳು ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಗರ್ಡಲ್ ಬೀಟಲ್ (ಕ್ರೈಸೊಡೆಕ್ಸಿಸ್ ಅಕ್ಯೂಟಾ ಮತ್ತು ಗರ್ಡಲ್ ಬೀಟಲ್)	30	150	500–750	22	—
ಕಬ್ಬು	ಕಾಂಡ ತೂರುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಬೋರರ್ (ಒಡೊಂಟೋಟರ್ಮಿಸ್ ಒಬೇಸಸ್ / ಮೈಕ್ರೋಟರ್ಮಿಸ್ ಒಬೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿರ್ಪೋಫಾಗಾ ಎಕ್ಸರ್ಪ್ಟಾಲಿಸ್)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
ಕಬ್ಬು	ಆರಂಭಿಕ ಕಾಂಡ ತೂರುವ ಹುಳು (ಚಿಲೋ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಕಾಟೆಲ್ಲಸ್)	75	375	1000	208	—
ಟೊಮೇಟೊ	ಹಣ್ಣು ತೂರುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ)	30	150	500	3	—

ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
(ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ)
ಗದ್ದೆ: ಗದ್ದೆ ದಿಮಕಗಳು, ಸೌಮ್ಯ ತಂಡು ತುದಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲು ತಂಡು ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮರ - ತಂಡು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಗದ್ದೆ ಮೇಲು ತಂಡು ಕೀಟಗಳ 3ನೇ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಗರ್ಭಿತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಇತರ ಪೈರುಗಳು: ಅಕ್ಕಿ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ, ಗದ್ದೆ, ಟೊಮೇಟೋ, ಮೆಣಸು, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬದನೇಕಾಯಿ, ತುರಿ, ಚಣ, ಉದ್ದಿನ, ಕರೇಲಾ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಮಿತಿಗೆ (ETL) ತಲುಪಿದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
1). ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಲೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು.
2). ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುವಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಸ್ತರಕ್ಷಕಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಮೈ, ಮುಖಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬಿದ್ದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪ್ರೇ ತಳೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
3). ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ; ತಂಬಾಕು/ಪಾನ್ ಚಪ್ಪಟಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
4). ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 3/4 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಬೇಡಿ. ನೋಜಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನೋಟದಿಂದ ಊದಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
5). ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
6). ಸ್ಪ್ರೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
7). ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು, ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನಂತರ ದೇಹದ ತೆರೆದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
8). ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಲಿನವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಳೆಯಿರಿ.
9). ಈ ಹೀಟಕಾನಾಶಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಸು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ದೃಷ್ಟಿ, ವಾಷ್ಪ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೂಗಿನ ನಿಂದಿ ಹರಿಯುವುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಪೈರು ವಿಷಕಾರಿ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪೈರುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲ

ವಿಷನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ತ್ಯಾಗ
ಈ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಪುನಃ ಬಳಸಲು ಅಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ, ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ 1/2 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಸಿ. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪರಿಸರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ತ್ಯಾಗದ ನೀರನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ-ನಿಕಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹ ಶರತ್ತುಗಳು
ಈ ವಸ್ತುವಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಬಳಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇಡಿ. ಹೀಟಕಾನಾಶಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಕಂಟೈನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, ತಣಿತ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗಾಳಿ ಹೋದರೂ, ಮುಚ್ಚಬಹುದಾದ ಕೋಣೆ/ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ವಾಷ್ಪನಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಟಕಾನಾಶಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಹಾರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ, ಇತರ ಹೀಟಕಾನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಉರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕದ ಹೆಸರು	ತೂಕ
1	ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ	18.50 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಮೆಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೋ-ಪೋಲಿಮರ್	3.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್/ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋ-ಪೋಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್	2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಅಟಾಪಲ್‌ಗೈಟ್ ಮಣ್ಣು	1.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
5	ಜಾಂಥಾನ್ ಗಮ್	0.25 % ತೂಕ/ತೂಕ
6	1,2-ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನ್-3-ವನ್	0.10 % ತೂಕ/ತೂಕ
7	ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಮಲ್ಶನ್	0.50 % ತೂಕ/ತೂಕ
8	ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	6.80 % ತೂಕ/ತೂಕ
9	ನೀರು	ಅಗತ್ಯತೆಯಂತೆ % ತೂಕ/ತೂಕ
	ಒಟ್ಟು	100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ക്ലോറെൻട്രാനിലിപ്രോൾ 18.5% ഭാര/ഭാര എസ്സി
(പൂച്ചനാശിനി)

ക്ലോറെൻട്രാനിലിപ്രോൾ 18.5% ഭാ/ഭാ എസ്സ് സി (20% ഭാ/ഭാ) ഒരു അതുല്യമായ തരത്തിലുള്ള AVJ ആന്ത്രാനിലാമൈഡ് പൂച്ചനാശിനിയാണ്. ഇത് ബഹുമുഖ ഫലമുള്ള പൂച്ചനാശിനിയാണ്, അരി, കവല്, മിതായി, പറ്റി, തക്കാളി, മുളക്, സോയാബീൻ, വേങ്ങായ, തുവര, കടല, ഉഴുന്ന്, കരീല, വെണ്ട, മക്ക, പയർ തുടങ്ങിയ വിളകളിൽ വന്ന വിവിധ പുഴുവുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു

ശുപാർശ

വിളകൾ	കീടത്തിന്റെ പൊതുപേര്	ഒരു ഹെക്ടറിന് ആവശ്യമായ അളവ് സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ കലർക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന തളിപ്പിൽ നിന്ന് കൊയ്ത്ത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയം (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ പ്രയോഗത്തിനും ശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാനുള്ള സമയം (മണിക്കൂർ)
ബംഗാൾ കടല	കായ് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (സ്പോഡോപ്റ്റേര ഇനങ്ങളും ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറയും)	25	125	500	11	—
ചുരയ്ക്ക / കയ്പ്പക്ക	ഫലം തുളയ്ക്കുന്ന പുഴുക്കൾ (ഡൈഫാനിയ ഇനങ്ങളും ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറയും)	20–25	100–125	500	7	—
കറുത്ത കടല	കായ് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (മരുക്ക ഇനങ്ങളും സ്പോഡോപ്റ്റേര ലിറ്റൂറയും)	20	100	500	20	—
വഴുതന	ഫലവും തണ്ടും തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (ല്യൂസിനോഡിസ് ഓർബോണാലിസ്)	40	200	500–750	3	—
കാബേജ്	ഡയമണ്ട് ബാക്ക് തുമ്പി പുഴു (പ്ലൂട്ടെല്ല സൈലോസ്റ്റെല്ല)	10	50	500	3	—
മുളക്	ഫലം തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറ, സ്പോഡോപ്റ്റേര ലിറ്റൂറ, സ്പോഡോപ്റ്റേര എക്സിഗ്വ)	30	150	500	3	—
പരുത്തി	അമേരിക്കൻ ബോൾവോം, പുള്ളിയുള്ള ബോൾവോം, പുകയില പുഴു (ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറ, ഏരിയാസ് വിറ്റെല്ല, സ്പോഡോപ്റ്റേര ലിറ്റൂറ)	30	150	500	9	—
നിലക്കടല	പുകയില പുഴു (സ്പോഡോപ്റ്റേര ലിറ്റൂറ)	30	150	500	28	—
ചോളം	പുള്ളിയുള്ള തണ്ട് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു, പിങ്ക് തണ്ട് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു	40	200	500	10	—
വെണ്ട	ഫലം തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറയും ഏരിയാസ് വിറ്റെല്ലയും)	25	125	500	5	—
തുവര	കായ് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴുവും കായ് ഈച്ചയും (ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറയും മെലാനാഗ്രോമൈസ ഒബ്ടൂസയും)	30	150	500–750	29	—
നെല്ല്	തണ്ട് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴുവും ഇല ചുരുട്ടുന്ന പുഴുവും (സ്കിർഫോഫാഗ ഇൻസെർട്ടുലാസ്, നെഫലോക്രോസിസ് മെഡിനാലിസ്)	30	150	500	47	—
സോയാബീൻ	പച്ച പുഴു കൂട്ടവും ഗേർഡിൽ വണ്ടും (ക്രൈസോഡെക്സിസ് അക്യൂട്ടയും ഗേർഡിൽ വണ്ടും)	30	150	500–750	22	—
കരിമ്പ്	തണ്ട് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴുവും ടോപ്പ് ബോററും (ഓഡോണ്ടോടെർമിസ് ഒബേസസ് / മൈക്രോടെർമിസ് ഒബേസസ്, സ്കിർഫോഫാഗ എക്സർപ്റ്റാലിസ്)	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
കരിമ്പ്	ആരംഭ തണ്ട് തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (ചിലോ ഇൻഫ്യൂസ്കാറ്റെല്ലസ്)	75	375	1000	208	—
തക്കാളി	ഫലം തുളയ്ക്കുന്ന പുഴു (ഹെലിക്കോവർപാ ആർമിജെറ)	30	150	500	3	—

ഉപയോഗത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം
(ഉപയോഗസമയം, രീതി)
ശർക്കരാച്ചി: ശർക്കരാച്ചിയിലെ തീം പുഴുവുകൾ, മൃദുവായ തണ്ട് കുത്തി പുഴുവുകൾ, മുകളിൽ തണ്ട് കുത്തി പുഴുവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരം - തണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കുക, ശർക്കരാച്ചിയിലെ മുകളിൽ തണ്ട് കുത്തി പുഴുവുകളുടെ 3rd, 4th, 5th ഭ്രൂണ മുട്ടകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജൂൺ മാസത്തിൽ മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കുക.

മറ്റു വിളകൾ: അരി, പറ്റി, കവല്, ശർക്കരാച്ചി, തക്കാളി, മുളക്, സോയാബീൻ, വേങ്ങായ, തുവര, കടല, ഉഴുന്ന്, കരീല, വെണ്ട എന്നിവയിൽ പുഴുവുകളുടെ എണ്ണം സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ പരിധി (ETL) എത്തുന്നവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക.

ഉപയോഗസമയം
സി.ഐ.ബി. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
1). ലേബലിലും ബ്രോഷറിലും നൽകിയ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുക, അപകടമോ വിഷബാധയോ സംഭവിച്ചാൽ ലേബലോടു കൂടി കണ്ടെയ്നർ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഡോക്ടർക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ്.
2). പദാർത്ഥത്തെ സൂങ്ങരിക്കരുത്. ഉപയോഗസമയം റബർ ഗ്ലൗസുകൾ, നിറമുള്ള കണ്ണടകൾ, മുഖാവരണം, സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. കാറ്റ് വീശുന്ന ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് തുള്ളികൾ തോറുക.
3). സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കരുത്, കുടിക്കരുത്, പുകവലിക്കരുത്; പുകയ്ക്ക്/പാൻ ചവിക്കരുത്.
4). സ്പ്രേ ടാങ്ക് 3/4 ക്ക് മേലു നിറയ്ക്കരുത്. നോസിലിൽ കണങ്ങൾ കുടുങ്ങിയാൽ വായിൽ വീശരുത്, സുന്ദരമായ തരം കയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന് ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുക.
5). ശരീരത്തിൽ തുള്ളി പതിച്ചാൽ ഏറെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
6). സ്പ്രേ ചികിത്സ പൂർത്തിയായ ഉടൻ എപ്പോഴും വസ്ത്രം മാറ്റി കുളിക്കുക.
7). ഭക്ഷണത്തിനു, കുടിക്കാനു, പുകവലിക്ക് മുൻപും ഉപയോഗശേഷവും ശരീരത്തിലെ തുറന്ന ഭാഗങ്ങളും കൈ-കാൽ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
8). വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി കഴുകുക.
9). അടുത്തിടെ ഈ പൂച്ചനാശിനി ഉപയോഗിച്ചോ ഉപയോഗിക്കുന്നയാളിൽ വിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
കണ്ണുകളിൽ ചെറിയ ജ്വലനവും മങ്ങലും, വാപ്പർ ശ്വസിച്ചാൽ മൂക്കിൽ നിന്നു വെള്ളം ഒഴുകുക.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാറില്ല, കാരണം പദാർത്ഥം ശ്വസിക്കുന്നതിൽ അത്ര അപകടകാരിയല്ല. ചർമ്മത്തിൽ നേരിട്ട് തൊടുമ്പോഴും അത്ര അപകടകാരിയല്ല, എന്നാൽ ചർമ്മം ശുദ്ധമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കണ്ണുമായി സമ്പർക്കം വന്നാലും വളരെ അപകടകാരിയല്ല, എന്നാൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ കഴുകുക.

വളയ വിഷപ്രഭാവം
പരാമർശിച്ച അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വിളകൾക്ക് വിഷം സംഭവിക്കില്ല.

വിഷനാശിനി
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷനാശിനി മരുന്ന് ഇല്ല, ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാരം ചികിത്സ നടത്തുക.

ശൂന്യമായ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ സംസ്കരണം
ഈ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ശൂന്യ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിച്ച് വാസസ്ഥലത്ത് നിന്നും 1/2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണിൽ തള്ളുക. സംസ്കരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പരിസ്ഥിതിക്ക്, കുടിവെള്ളത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും മലിനമാകരുത്.

സംരക്ഷണ നിബന്ധനകൾ
ഈ പദാർത്ഥത്തിൽ മലിനമായ ഭക്ഷണം, പാനീയങ്ങൾ, തമ്പാക്കു ഉപയോഗിക്കരുത്. എല്ലാം മലിനമാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. പൂച്ചനാശിനി പദാർത്ഥം അതിന്റെ മൂല കണ്ടെയ്നറിൽ നന്നായി മൂടി, തണുത്ത, ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. കാറ്റ് പോകുന്ന, അടയ്ക്കാവുന്ന മുറിയിലോ പരിസരത്തിലോ വയ്ക്കുക, വാപ്പർ മൂലം മലിനീകരണം നടക്കാതിരിക്കണം. പൂച്ചനാശിനി പദാർത്ഥം ഭക്ഷണം, മൃഗങ്ങളുടെ ചാരം, മറ്റ് പൂച്ചനാശിനികളും പാകമഴകളും നിന്ന് വേർതിരിച്ച് താക്കോൽ സംവിധാനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

രാസ ഘടന

ക്രമസംഖ്യ	ഘടകത്തിന്റെ പേര്	ഭാരം
1	ക്ലോറാന്ത്രാനിലിപ്രോൾ സജീവ ഘടകം	18.50 % ഭാര/ഭാര
2	മിഥൈൽ മെഥാക്രിലേറ്റ് ഇഥോക്സിലേറ്റഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് കോ-പോളിമർ	3.00 % ഭാര/ഭാര
3	ഈഥിലീൻഓക്സൈഡ്/പ്രൊപിലീൻഓക്സൈഡ് ബ്ലോക്ക് കോ-പോളിമർ മറ്റും ഇഥോക്സിലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ	2.00 % ഭാര/ഭാര
4	അറ്റാപൾഗൈറ്റ് മണ്ണ്	1.00 % ഭാര/ഭാര
5	ജാന്ഥാൻ ഗം	0.25 % ഭാര/ഭാര
6	1,2-ബെൻസിസോത്തയാസോലിൻ-3-വൺ	0.10 % ഭാര/ഭാര
7	സിലിക്കൺ ഇമൾഷൻ	0.50 % ഭാര/ഭാര
8	പ്രൊപിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ	6.80 % ഭാര/ഭാര
9	വെള്ളം	ആവശ്യത്തിന് % ഭാര/ഭാര
	മൊത്തം	100 % ഭാര/ഭാര

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

کلورینٹرانیلپرول 18.5% وزن/وزن ایس سی
(کیڑوں کا مار)

اینتھرانیل امائڈ کیڑوں کا مار ہے۔ AVJ کلورینٹرانیلپرول 18.5% وزنی/وزن ایس سی (20% وزنی/وزن) ایک منفرد قسم کا یہ ایک کثیر جہتی اثر رکھنے والا کیڑوں کا مار ہے، جو دھان، بند گوبھی، کپاس، گنا، ٹماٹر، مرچ، سویابین، بینگن تور، چنا، اُڑد، کریلا، بھنڈی، مکئی اور مونگ پھلی پر لگنے والے مختلف کیڑوں کے روک تھام کے لیے استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

سفارشات

فصلیں	نام عام کا کیڑے	مقدار ہیکٹر فی (گرام) جزو فعال	فارمولیشن ملی (لیٹر)	گھولنے میں پانی (لیٹر) مقدار کی	آخری اسپرے سے تک کٹائی کی انتظار (دن) مدت	بعد کے استعمال ہر وقت کا داخلہ دوبارہ (گھنٹے)
چنا بنگال	اسپوڈوپٹیرا) کیڑا والا چھیدنے پھلی (آرمیجیرا کوورپا بیلی اور اقسام	25	125	500	11	—
کریلا / لوکی	سنڈیاں اور کیڑا والا چھیدنے پھل کوورپا بیلی اور اقسام ڈایافینیا) (آرمیجیرا	20–25	100–125	500	7	—
چنا کالا	ماروکا) کیڑا والا چھیدنے پھلی (لٹورا اسپوڈوپٹیرا اور اقسام	20	100	500	20	—
بینگن	کیڑا والا چھیدنے شاخ اور پھل (اوربونالس لیوسینوڈس)	40	200	500–750	3	—
گوبھی بند	پلوٹیلا) سنڈی پروانہ بیک ڈائمنڈ (اسٹیلا زائلو	10	50	500	3	—
مرچ	کوورپا بیلی) کیڑا والا چھیدنے پھل ,لٹورا اسپوڈوپٹیرا ,آرمیجیرا (ایگزگوا اسپوڈوپٹیرا	30	150	500	3	—
کپاس	,ورم بال دار داغ ,ورم بال امریکن کوورپا بیلی) سنڈی کی تمباکو ,ویٹیلا ایریاس ,آرمیجیرا (لٹورا اسپوڈوپٹیرا	30	150	500	9	—
پھلی مونگ	(لٹورا اسپوڈوپٹیرا) سنڈی کی تمباکو	30	150	500	28	—
مکئی	تنا گلابی ,والا چھیدنے تنا دار داغ والا چھیدنے	40	200	500	10	—
بھنڈی	کوورپا بیلی) کیڑا والا چھیدنے پھل (ویٹیلا ایریاس اور آرمیجیرا	25	125	500	5	—
دال تور	پھلی اور کیڑا والا چھیدنے پھلی اور آرمیجیرا کوورپا بیلی) مکھی (اوبٹوسا مانزا میلاناگرو	30	150	500–750	29	—
دھان	والا لپیٹنے پتا اور والا چھیدنے تنا اور انسرٹولاس اسکرفوفاگا) کیڑا (میڈینالس کروسس نیفالو	30	150	500	47	—
سویابین	گرڈل اور گروہ کا سنڈیوں سبز اور ایکیوٹا کرائسوڈیکسس) بھنورا (بھنورا گرڈل	30	150	500–750	22	—
گنا	بورر ٹاپ اور والا چھیدنے تنا / اوبیسس اوڈونٹوٹرمیس) اور اوبیسس مائیکروٹرمیس (ایکسرپٹالس اسکرفوفاگا	100–125 / 75	500–625 / 375	1000	208	—
گنا	چلو) کیڑا والا چھیدنے تنا ابتدائی (انفیوسکیٹیلس	75	375	1000	208	—
ٹماٹر	کوورپا بیلی) کیڑا والا چھیدنے پھل (آرمیجیرا	30	150	500	3	—

استعمال کے لیے ہدایات
(استعمال کا وقت اور طریقہ)
گنا: گنے کے دیمک، نرم تنہ سوراخ کرنے والے اور اوپرتنہ سوراخ کرنے والے کیڑوں کی روک تھام کے لیے یا

انڈے کو کنٹرول کرنے کے لیے جون کے مہینے میں مٹی میں چھڑکنا th اور 5 rd، 4th تنہ یا مٹی میں چھڑکیں، گنے کے اوپرتنہ سوراخ کرنے والے کیڑوں کے 3 چاہیے۔

پر (ETL) دیگر فصلیں: دھان، کپاس اور بند گوبھی، گنا، ٹماٹر، مرچ، سویابین، بینگن، تور، چنا، اُڑد، کریلا اور بھنڈی میں کیڑوں کی تعداد جب اقتصادی نقصان کی حد پہنچ جائے تو سپرے کریں۔

استعمال کا وقت
سی-آئی-بی- ہدایات کی پیروی کریں۔

استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر
لیبل اور بروشر پر دی گئی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کریں، حادثہ یا زہریلا پن ہونے کی صورت میں لیبل کے ساتھ کنٹینر کو محفوظ رکھیں تاکہ ڈاکٹر کو دکھایا جا .(1 سکے۔
مواد کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ استعمال کے وقت ربڑ کے دستانے، رنگین چشمے، چہرے کا ماسک اور حفاظتی کپڑے پہنیں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں اور .(2 سپرے کے چھڑکاؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔
سپرے کے وقت نہ کھائیں، نہ پییں، نہ دھوئیں؛ نہ تمباکو/پان چبائیں۔ .(3
سپرے ٹینک کو 3/4 سے زیادہ بھرنے سے گریز کریں۔ نوزل میں ذرات پھنس جائیں تو منہ سے نہ پھونکیں بلکہ پتلے تار یا پن سے صاف کریں۔ .(4
جسم پر چھڑکاؤ گرنے کی صورت میں زیادہ پانی سے صاف کریں۔ .(5
سپرے کے علاج کے فوراً بعد ہمیشہ کپڑے بدلیں اور نہائیں۔ .(6
کھانے، پینے یا دھوئیں سے پہلے اور استعمال کے بعد جسم کے کھلے حصوں اور ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں۔ .(7
دوبارہ استعمال سے پہلے آلودہ کپڑے نکال کر دھوئیں۔ .(8
جس نے حال ہی میں یہ کیڑوں کا مار استعمال کیا ہے یا کر رہا ہے، اس پر زہریلا پن کے علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر کو بلائیں۔ .(9

زہر کی علامات
آنکھوں میں ہلکی جلن اور دھندلا پن، بھاپ سانس میں جانے پر ناک سے پانی بہنا۔

ابتدائی طبی امداد
اگر سانس میں گیا ہو تو کوئی خاص ردعمل نہیں ہوتا کیونکہ مواد سانس میں جانے پر زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ جلد سے رابطے میں آنے پر بھی زیادہ خطرناک نہیں، پھر بھی جلد کو صاف کرنا بہتر ہے۔ آنکھ سے رابطے میں آئے تو زیادہ خطرناک ہونے کا امکان نہیں، لیکن اثر دکھے تو زیادہ پانی سے آنکھیں دھوئیں۔

پودوں کے لیے زہریلا پن
سفارش کردہ مقدار استعمال کرنے پر پودوں کے لیے زہریلا نہیں ہے۔

زہریلا مار
کوئی خاص زہریلا دوا نہیں ہے، علامات کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔

خالی ڈبوں کا تصرف
یہ کنٹینر دوبارہ استعمال کے لیے نہیں ہیں۔ خالی کنٹینرز کو تباہ کر کے رہائش گاہ سے 1/2 میٹر گہرائی میں دفن کریں۔ تصرف سے ماحول، پینے کے پانی یا خوراک آلودہ نہ ہوں۔ تصرف کا پانی پانی کی سطح یا صفائی/گٹر کے نظام سے بچائیں۔

اسٹوریج کی شرائط
اس مواد سے آلودہ خوراک، مشروبات یا تمباکو کا استعمال نہ کریں۔ سب چیزیں آلودہ نہ ہونے دیں۔ کیڑوں کے مارنے والا مواد اس کے اصل کنٹینر میں اچھی طرح بند کر کے ٹھنڈی، خشک جگہ میں رکھیں۔ ہوادار اور بند ہونے والی جگہ میں رکھیں تاکہ بھاپ سے آلودگی نہ پھیلے۔ کیڑوں کے مارنے والا مواد خوراک، جانوروں کے چارہ، دیگر کیڑوں کے مارنے والے مواد اور کھاد سے الگ، تالے اور چابی کے انتظام میں رکھا جانا چاہیے۔
کیمیائی ترکیب

ترکیب کی اجزاء کیمیائی

شمار نمبر	نام کا جزو	وزن
1	جزو فعال ل کلورانٹرانلیپرو	% وزن/وزن 18.50
2	پولیمر-کو گرافٹ ایتھوکسائلیٹڈ میتھاکرائیلیٹ میتھائل	% وزن/وزن 3.00
3	الکحل ایتھوکسائلیٹڈ اور پولیمر-کو بلاک آکسائیڈ پروپیلین/آکسائیڈ ایتھیلین	% وزن/وزن 2.00
4	مٹی ایٹاپلگائٹ	% وزن/وزن 1.00
5	گم زانتھان	% وزن/وزن 0.25
6	ون-3-تھایازولین بینزآئسو-1,2	% وزن/وزن 0.10
7	ایمولشن سلیکون	% وزن/وزن 0.50
8	گلائکول پروپیلین	% وزن/وزن 6.80
9	پانی	% ضرورت حسبِ وزن/وزن
	کل	% وزن/وزن 100

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu