AgroStar®

RAPIGEN-GR

CHLORANTRANILIPROLE 0.4% w/w GR
(Insecticide)

रैपीजेन जीआर

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार/भार जी आर
(कीटनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

CHLORANTRANILIPROLE 0.4% w/w GR
(Insecticide)

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR is a novel granular insecticide which contains 0.4% Chlorantraniliprole active ingredient.

Recommendation

		Dosage/HA				
Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gms)	Formulation (kgs)	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas), Paddy Leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40	10	Broadcast	53	—
Sugarcane	Early Shoot Borer (Chilo infuscatellus), Top Borer (Scirpophaga excerptalis)	75	18.75	Broadcast	147	—

Direction Of Use
Uniformly broadcast Chlorantraniliprole granules @ 4 kg/ acre in Rice and 7.5 kg/ acre in Sugarcane. For Sugarcane, application is to done in furrows at planting or at the base of uoung emerging shoots along the furrows followed by an irrigation.

Time of Application
1. 15-35 DAT (Days after transplanting) for Rice. 2. In case of sugarcane, application between planting to 1st irrigation is recommended for Early Shoot Borer while for Top borer application should conincide with appearance of Top borer moths.

Precautions
1.keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin and inhallation of the insecticide.
3.Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling.
4. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles. eye/face shield while handling.

Symptoms Of Poisoning
Lethargy, nasal secretion and blurred vision.

First Aid
1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water.
2. If on eyes, flushing with plenty of water is plenty of water is advisable. Consult a physician if necessary.
3. If inhaled, no specific intervention is indicated.
4. If swallowed, Consult a physician.

Phytotoxicity
No phytotoxic at recommended stages.

Antidote
No specific antidote is available, treat symtopmatically.

Disposal Of Used Container
1. The packages shall be broken and buried ½meter deep in soil away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages by surplus material and wrapping shall be disposed off in a safe manner so as to prevent enviromental and
water pollution.

Storage Conditions
1. The packages containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articals or shall be kept in separate almarihs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.
2. Don't store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material.
3. The room and premises meant for storing the insecticides shall be well built, cool dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Weight
1	Chlorantraniliprole a.i.	0.40 % w/w
2	Polyacrylic acid	0.40 % w/w
3	Water	0.40 % w/w
4	Dodecyl hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	0.40 % w/w
5	Calcium lignosulphonate	1.00 % w/w
6	Dye blue	0.05 % w/w
7	Talc powder	8.00 % w/w
8	Sand	Q.S. % w/w
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार/भार जी आर
(कीटनाशक)

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार/भार जी आर एक नवीन ग्रैन्यूलयुक्त कीटनाशी है जिसमें 0.4% क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व के रूप में मिश्रित है।

उपयोग

		प्रति हैक्टेयर मात्रा				
फसल	कीट का सामान्य नाम	सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	पीला तना छेदक (स्किर्फोफिगा इंसेरटुलास), धान पत्ती मोड़क (क्नैफालोक्रोसिस मेडिनालिस)	40	10	बिखराव	53	—
गन्ना	तना/कॉपल छेदक (चिलो इन्फ्यूसकैटेलस), शीर्ष छेदक (स्किर्फोफिगा एक्ससर्पटालिस)	75	18.75	बिखराव	147	—

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल ग्रैन्यूल्स 4 कि.ग्रा. प्रति एकड़ धान के खेत में और 7.5 कि.ग्रा. प्रति एकड़ गन्ने के खेत में एक साथ बिखेरें। गन्ने में फरटेरा का प्रयोग बुआई के समय नाली में तथा अंकुरण के समय कल्लों की जड़ों के पास मिट्टी में पंक्ति में डालें और इसके बाद सिंचाई कर दें।

प्रयोग का समय
1). धान की रोपाई के 15–35 दिन बाद बिखराव करें।
2). गन्ने के खेत में बुआई से पहली सिंचाई तक प्रयोग करने पर
तना छेदक से बचाव होता है। शीर्ष छेदक से बचने के लिए शीर्ष छेदक कीटों के अंडे दिखते ही प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां
1). खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2). मुँह, त्वचा, आँखों और साँस द्वारा अंदर जाने से बचाएँ।
3). प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ।
4). प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
5). प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबर के दस्ताने, चश्मे और आँख/चेहरे का नकाब पहनें।

विष के लक्षण
आलस आना, धुंधला दिखना तथा नाक बहना।

प्राथमिक चिकित्सा
1). त्वचा संपर्क पर: त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ।
2). आँख से संपर्क होने पर: आँखों को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि आवश्यक लगे तो चिकित्सक से संपर्क करें।
3). साँस में जाने पर: कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है।
4). निगलने पर चिकित्सक से संपर्क करें।

पौध विषाक्तता
सिफारिश स्तर में छिड़कने पर पौध विषाक्तता नहीं होती।

विष नाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1). खाली डिब्बों को तोड़कर जमीन में 1/2 मीटर गहराई में निवास स्थान से दूर मिट्टी में गाड़ दें।
2). खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लिए बाहर न छोड़ें।
3). कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई से बची हुई सामग्री आदि की निकासी
की व्यवस्था सुरक्षित तरीके से करें, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारा दूषित न हो। खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें
1). कीटनाशक के पैकेटों को अलग-अलग कमरों या जगहों में अन्य वस्तुएँ, खाद्य पदार्थों के भंडारण किए जाने वाले कमरों या
जगहों से दूर, कीटनाशक के प्रकार व परिमाण के अनुसार ताला-चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए।
2). जहाँ भोजन, पेयजल, तंबाकू आदि दूषित हो जाएँ, वैसी जगह पर इस सामग्री को स्टोर न करें और न ही वहाँ खाएँ-पिएँ।
3). जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार व आयतन में पर्याप्त रूप से लंबा-चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक	वजन
1	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व	0.40 % भार/भार
2	पॉलीएक्रिलिक अम्ल	0.40 % भार/भार
3	पानी	0.40 % भार/भार
4	डोडेसाइल हाइड्रॉक्सीपॉली (ऑक्सी-1,2-इथेनडायल) फॉस्फेट	0.40 % भार/भार
5	कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	1.00 % भार/भार
6	डाइ ब्लू	0.05 % भार/भार
7	टाल्क पाउडर	8.00 % भार/भार
8	बालू	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

क्लोरअ‍ॅन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% वजन/वजन जी आर
(कीटकनाशक)

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% वजन/वजन जी आर हा एक नवा ग्रॅन्युलर इन्सेक्टिसाइड आहे ज्यामध्ये 0.4% क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ॲक्टिव्ह इंग्रेडियंट आहे.

शिफारस

		प्रति हेक्टर मात्रा				
पिके	किडीचे सामान्य नाव	सक्रिय घटक (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (किलोग्रॅम)	पाण्यात वापरण्याची पद्धत	शेवटच्या फवारणीनंतर काढणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक वापरानंतर पुनःप्रवेश (तास)
भात	पिवळा खोडकिडा (स्किर्फोफिगा इंसेरटुलास), भात पान गुंडाळणारी अळी (क्नॅफालोक्रोसिस मेडिनालिस)	40	10	प्रसारण पद्धत	53	—
ऊस	प्रारंभिक खोडकिडा (चिलो इन्फ्युस्कॅटेलस), टॉप बोरर (स्किर्फोफिगा एक्ससर्पटालिस)	75	18.75	प्रसारण पद्धत	147	—

वापरासाठी दिशा-निर्देश
क्लोरअ‍ॅन्ट्रानिलिप्रोल दाणेदार औषध 4 कि.ग्रा. प्रति एकर भाताच्या शेतात आणि 7.5 कि.ग्रा. प्रति एकर ऊसाच्या शेतात एकत्र पसरावे। ऊसामध्ये पेरणीच्या वेळी नालीत व उगवणीच्या वेळी कांड्यांच्या मुळांजवळ मातीमध्ये ओळीने टाकावे आणि त्यानंतर पाणी द्यावे।

प्रयोगाची वेळ
1). भाताची रोपणी केल्यानंतर 15–35 दिवसांनी पसरवणी करावी।
2). ऊसाच्या शेतात पेरणीपासून पहिल्या सिंचनापर्यंत वापर केल्यास
खोड पोखरणाऱ्या किडीपासून संरक्षण मिळते। शेंडा पोखरणाऱ्या किडीपासून बचावासाठी त्या किडींची अंडी दिसताच वापर करावा।

प्रयोगकर्त्यांसाठी खबरदारी
1). अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांची रिकामी भांडी व जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा।
2). तोंड, त्वचा, डोळे व श्वसनाद्वारे शरीरात जाण्यापासून टाळा।
3). वापर केल्यानंतर दूषित कपडे व शरीराचे अवयव नीट धुवावेत।
4). वापर करताना धूम्रपान, खाणे, पिणे किंवा काहीही चघळू नये।
5). वापर करताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे जसे रबरचे हातमोजे, चष्मे व डोळे/चेहऱ्याचे मुखवटे वापरावेत।

विषबाधेची लक्षणे
आळस येणे, धूसर दिसणे व नाकातून पाणी वाहणे।

प्राथमिक उपचार
1). त्वचेवर संपर्क झाल्यास: त्वचा साबण व भरपूर पाण्याने धुवावी।
2). डोळ्यांत गेल्यास: डोळे भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवावेत। आवश्यक असल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा।
3). श्वसनाद्वारे गेल्यास: कोणताही विशिष्ट उपचार सांगितलेला नाही।
4). गिळल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा।

पिकांवरील विषारी परिणाम
शिफारस केलेल्या प्रमाणात वापर केल्यास पिकांवर विषारी परिणाम होत नाही।

विषनाशक
कोणतेही विशिष्ट विषनाशक नाही, लक्षणांनुसार उपचार करावेत।

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट
1). रिकामे डबे फोडून राहत्या जागेपासून दूर जमिनीत 1/2 मीटर खोलीवर गाडावेत।
2). रिकामे डबे पुन्हा वापरात येऊ नयेत म्हणून उघडे ठेवू नयेत।
3). कीटकनाशक उत्पादक किंवा वापरकर्त्यांची जबाबदारी आहे की पॅकेज, यंत्र धुण्याचे पाणी व उरलेली सामग्री यांची
विल्हेवाट सुरक्षित पद्धतीने करावी, जेणेकरुन पाणी, पर्यावरण व चारा दूषित होणार नाही। रिकामे डबे व पॅकेज
फोडून वस्तीपासून दूर गाडावेत।

साठवणुकीच्या अटी
1). कीटकनाशकांची पाकिटे अन्नपदार्थ साठवणूक असलेल्या खोल्या किंवा जागांपासून दूर, वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये
कीटकनाशकांच्या प्रकार व परिमाणानुसार कुलूप-चावी लावून ठेवावीत।
2). ज्या ठिकाणी अन्न, पिण्याचे पाणी, तंबाखू इत्यादी दूषित होऊ शकतात, अशा ठिकाणी ही सामग्री साठवू नये व तेथे खाणे-पिणे करू नये।
3). ज्या खोलीत किंवा जागेत कीटकनाशक साठवायचे आहे ती जागा मजबूत, कोरडी, प्रकाशयुक्त, हवेशीर आणि आकाराने पुरेशी लांब-रुंद असावी।

रासायनिक संघटन

अनु.क्र.	घटक	वजन
1	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय घटक	0.40 % वजन/वजन
2	पॉलीॲक्रिलिक आम्ल	0.40 % वजन/वजन
3	पाणी	0.40 % वजन/वजन
4	डोडेसिल हायड्रॉक्सिपॉली (ऑक्सी-1,2-इथेनडायिल) फॉस्फेट	0.40 % वजन/वजन
5	कॅल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	1.00 % वजन/वजन
6	निळा रंग	0.05 % वजन/वजन
7	टॅल्क पावडर	8.00 % वजन/वजन
8	वाळू	आवश्यक प्रमाण % वजन/वजन
	एकूण	100 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

ક્લોરએનત્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી આર
(કીટનાશક)

ક્લોરએનત્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી આર એક નવું દાણાદાર સ્વરૂપનું કીટનાશક છે, જેમાં 0.4% ક્લોરએનત્રાનિલિપ્રોલ સક્રિય ઘટક તરીકે મિશ્રિત છે.

ભલામણ

		પ્રતિ હેક્ટર માત્રા				
પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	સક્રિય ઘટક (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (કિલોગ્રામ)	પાણીમાં ઉપયોગ પદ્ધતિ	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ સમય (દિવસ)	દરેક ઉપયોગ પછી પુનઃપ્રવેશ (કલાક)
ધાન	પીળો કાંડો ભેદક (સ્કિર્ફોફાગા ઇન્સર્ટુલાસ), ધાન પાન વાળનાર (ક્નેફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	40	10	પ્રસાર પદ્ધતિ	53	—
ઊસ	શરૂઆતની કાંડો ભેદક (ચિલો ઇન્ફ્યુસ્કેટેલસ), ટોપ બોરર (સ્કિર્ફોફાગા એક્સરસ્પટાલિસ)	75	18.75	પ્રસાર પદ્ધતિ	147	—

ઉપયોગ માટે માર્ગદર્શિકા
ક્લોરએનત્રાનિલિપ્રોલ દાણાદાર દવા 4 કિ.ગ્રા. પ્રતિ એકર ધાનના ખેતરમાં અને 7.5 કિ.ગ્રા. પ્રતિ એકર શેરડીના ખેતરમાં એકસાથે છાંટવી. શેરડીમાં વાવણી સમયે નાળીમાં તથા અંકુરણ સમયે કાંડાની મૂળ પાસે માટીમાં પંક્તિમાં નાખવી અને ત્યારબાદ સિંચાઈ કરવી.

પ્રયોગનો સમય
1). ધાનની રોપણી પછી 15–35 દિવસમાં છંટકાવ કરવો.
2). શેરડીના ખેતરમાં વાવણીથી પ્રથમ સિંચાઈ સુધી ઉપયોગ કરવાથી તણા ભેદક કીટથી બચાવ થાય છે. ટોચ ભેદક કીટથી બચવા માટે તે કીટના અંડા દેખાય તુરંત ઉપયોગ કરવો.

પ્રયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓ
1). ખાદ્ય સામગ્રી, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી વાસણો અને પશુઓના ચારા થી દૂર રાખો.
2). મોઢા, ત્વચા, આંખો તથા શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ થવાથી બચાવો.
3). ઉપયોગ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના અંગો સારી રીતે ધોઈ લો.
4). ઉપયોગ દરમિયાન ધુમ્રપાન, ખાવું, પીવું કે કંઈપણ ચાવવું નહીં.
5). ઉપયોગ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં જેમ કે રબરના હાથમોજાં, ચશ્માં અને આંખ/ચેહેરાનો માસ્ક પહેરવો.

વિષના લક્ષણો
આળસ આવવી, ધૂંધળું દેખાવું તથા નાકમાંથી પાણી વહેવું.

પ્રાથમિક સારવાર
1). ત્વચા સંપર્ક થાય તો: ત્વચાને પૂરતા પ્રમાણમાં સાબુ અને પાણીથી ધોવો.
2). આંખમાં સંપર્ક થાય તો: આંખોને ઘણાં પાણીથી ધોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જરૂરી જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
3). શ્વાસ દ્વારા જાય તો: કોઈ વિશિષ્ટ સારવાર જણાવેલ નથી.
4). ગળી લેવાય તો તાત્કાલિક ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

પાક પર વિષાક્તતા
ભલામણ કરેલ માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી પાક માટે વિષાક્ત નથી.

વિષનાશક
કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી, લક્ષણ મુજબ સારવાર કરવી.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
1). ખાલી ડબ્બાઓ તોડી ને રહેણાંક સ્થળથી દૂર જમીનમાં 1/2 મીટર ઊંડે દફન કરવા.
2). ખાલી ડબ્બાઓ ફરી ઉપયોગમાં ન આવે તે માટે ખુલ્લા ન રાખવા.
3). કીટનાશક ઉત્પાદક અથવા ઉપયોગકર્તાની ફરજ છે કે પેકેજ, યંત્ર ધોવાની બાકી રહેલી સામગ્રી વગેરેનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરે, જેથી પાણી, પર્યાવરણ અને ચારો દૂષિત ન થાય. ખાલી ડબ્બા અને પેકેજ તોડી ને વસતિથી દૂર દફન કરવા.

સંગ્રહની શરતો
1). કીટનાશકના પેકેટો ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતા રૂમો અથવા સ્થળોથી દૂર, અલગ રૂમો અથવા સ્થળોમાં
કીટનાશકના પ્રકાર અને અસર મુજબ તાળા-ચાવીમાં બંધ રાખવા.
2). જ્યાં ખોરાક, પીવાનું પાણી, તમાકુ વગેરે દૂષિત થવાની શક્યતા હોય તેવી જગ્યાએ આ સામગ્રી સંગ્રહ ન કરવી અને ત્યાં ખાવું-પીવું નહીં.
3). જે રૂમ અથવા સ્થળમાં કીટનાશક સંગ્રહ કરવાનું હોય તે મજબૂત, સૂકું, પ્રકાશયુક્ત અને કદમાં પૂરતું લાંબું-પહોળું હોવું જોઈએ.

રાસાયણિક રચના

ક્ર.નં.	ઘટક	વજન
1	ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ સક્રિય ઘટક	0.40 % વજન/વજન
2	પોલીએક્રિલિક એસિડ	0.40 % વજન/વજન
3	પાણી	0.40 % વજન/વજન
4	ડોડેસિલ હાઇડ્રોક્સીપોલી (ઓક્સી-1,2-ઇથેનડાયલ) ફોસ્ફેટ	0.40 % વજન/વજન
5	કેલ્શિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	1.00 % વજન/વજન
6	નીલો રંગ	0.05 % વજન/વજન
7	ટેલ્ક પાવડર	8.00 % વજન/વજન
8	રેતી	જરૂરી માત્રા % વજન/વજન
	કુલ	100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਕਲੋਰਐਨਟਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਜੀ ਆਰ
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਕਲੋਰਐਨਟਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਜੀ ਆਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.4% ਕਲੋਰਐਨਟਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

		ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ				
ਫਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ	ਆਖ਼ਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ (ਘੰਟੇ)
ਧਾਨ	ਪੀਲਾ ਤਣਾ ਛੇਦਕ (ਸਕਿਰਫੋਫਾਗਾ ਇਨਸਰਟੂਲਾਸ), ਧਾਨ ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ (ਕਨੈਫਾਲੋਕਰੋਸਿਸ ਮੇਡੀਨਾਲਿਸ)	40	10	ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਧੀ	53	—
ਗੰਨਾ	ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਣਾ ਛੇਦਕ (ਚੀਲੋ ਇਨਫਿਊਸਕਾਟੇਲਸ), ਟੌਪ ਬੋਰਰ (ਸਕਿਰਫੋਫਾਗਾ ਐਕਸਰਪਟਾਲਿਸ)	75	18.75	ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਧੀ	147	—

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਲੋਰਐਨਟਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾ 4 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7.5 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਛਿੜਕੋ। ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ
ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ।

ਪਰਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ
1). ਧਾਨ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ 15–35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
2). ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਕੀਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਛੇਦਕ ਕੀਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਸਣ, ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਪਰਯੋਗਕਰਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1). ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2). ਮੂੰਹ, ਤਵਚਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
3). ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
4). ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
5). ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖ/ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਆਲਸ ਆਉਣਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿੱਸਣਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
1). ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ: ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
2). ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ: ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
3). ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ 'ਤੇ: ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
4). ਨਿਗਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੌਧਾ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਧਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
1). ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 1/2 ਮੀਟਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਗਾੜ ਦਿਓ।
2). ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3). ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ
ਤੋੜ ਕੇ ਵਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਾੜੇ ਜਾਣ।

ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1). ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾ-ਚਾਬੀ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
2). ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਤਮਾਕੂ ਆਦਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਖਾਓ-ਪੀਓ।
3). ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੁਕਤ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਭਾਰ
1	ਕਲੋਰਾਂਟ੍ਰਾਨਿਲੀਪ੍ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ	0.40 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਪੋਲੀਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਐਸਿਡ	0.40 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਪਾਣੀ	0.40 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਡੋਡੇਸਿਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਪੋਲੀ (ਆਕਸੀ-1,2-ਇਥੇਨਡਾਇਲ) ਫਾਸਫੇਟ	0.40 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	1.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
6	ਨੀਲਾ ਰੰਗ	0.05 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
7	ਟੈਲਕ ਪਾਊਡਰ	8.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
8	ਰੇਤ	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ % ਭਾਰ/ਭਾਰ
	ਕੁੱਲ	100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

ক্লোরঅ্যান্ট্রানিলিপ্রোল 0.4% ওজন/ওজন জি আর
(কীটনাশক)

ক্লোরঅ্যান্ট্রানিলিপ্রোল 0.4% ওজন/ওজন জি আর একটি নতুন দানাদার ধরনের কীটনাশক, যাতে 0.4% ক্লোরঅ্যান্ট্রানিলিপ্রোল সক্রিয় উপাদান হিসেবে মিশ্রিত রয়েছে।

সুপারিশ

		প্রতি হেক্টর পরিমাণ				
ফসল	পোকার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	ফরমুলেশন (কিলোগ্রাম)	পানিতে প্রয়োগ পদ্ধতি	শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময় (দিন)	প্রতিটি প্রয়োগের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘন্টা)
ধান	হলুদ কাণ্ড ছিদ্রকারী (স্কির্ফোফাগা ইনসারটুলাস), ধান পাতা মোড়ানো পোকা (ক্ন্যাফালোক্রোসিস মেডিনালিস)	40	10	ছিটিয়ে প্রয়োগ	53	—
আখ	প্রাথমিক কাণ্ড ছিদ্রকারী (চিলো ইনফিউস্কাটেলাস), টপ বোরার (স্কির্ফোফাগা এক্সারপটালিস)	75	18.75	ছিটিয়ে প্রয়োগ	147	—

ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলি
ক্লোরঅ্যান্ট্রানিলিপ্রোল দানাদার ওষুধ 4 কেজি প্রতি একর ধানের জমিতে এবং 7.5 কেজি প্রতি একর আখের জমিতে একসাথে
ছড়িয়ে দিতে হবে। আখের ক্ষেত্রে বপনের সময় নালিতে এবং অঙ্কুরোদ্গমের সময় কুশির শিকড়ের কাছে মাটির মধ্যে
সারি করে প্রয়োগ করতে হবে এবং এর পরে সেচ দিতে হবে।

প্রয়োগের সময়
1). ধানের রোপণের 15–35 দিনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।
2). আখের জমিতে বপন থেকে প্রথম সেচ পর্যন্ত প্রয়োগ করলে
কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শীর্ষ ছিদ্রকারী পোকার হাত থেকে রক্ষা পেতে সেই পোকার ডিম দেখা মাত্রই প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগকারীদের জন্য সতর্কতা
1). খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্যের খালি পাত্র এবং পশুর খাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2). মুখ, ত্বক, চোখ এবং শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকুন।
3). ব্যবহার করার পরে দূষিত পোশাক এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
4). ব্যবহারকালে ধূমপান, খাওয়া, পান করা বা কিছু চিবানো নিষিদ্ধ।
5). ব্যবহার করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক যেমন রাবারের দস্তানা, চশমা এবং চোখ/মুখের মাস্ক পরিধান করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ
অলসতা, ঝাপসা দেখা এবং নাক দিয়ে পানি পড়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা
1). ত্বকের সংস্পর্শে এলে: ত্বক প্রচুর পরিমাণে সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
2). চোখে লাগলে: চোখ প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
3). শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে: কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা উল্লেখ করা নেই।
4). গিলে ফেললে: অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

উদ্ভিদের বিষক্রিয়া
প্রস্তাবিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত নয়।

বিষনাশক
কোনো নির্দিষ্ট বিষনাশক নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

খালি পাত্রের নিষ্পত্তি
1). খালি পাত্র ভেঙে বসতবাড়ি থেকে দূরে মাটিতে 1/2 মিটার গভীরে পুঁতে ফেলুন।
2). খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার রোধ করার জন্য খোলা জায়গায় ফেলে রাখবেন না।
3). কীটনাশক প্রস্তুতকারক বা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হলো প্যাকেট, যন্ত্র ধোয়ার অবশিষ্ট উপাদান ইত্যাদির
নিরাপদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা, যাতে পানি, পরিবেশ ও পশুখাদ্য দূষিত না হয়। খালি পাত্র ও প্যাকেট ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সংরক্ষণের শর্তাবলি
1). কীটনাশকের প্যাকেট খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের কক্ষ বা স্থান থেকে দূরে, পৃথক কক্ষ বা স্থানে কীটনাশকের ধরন ও প্রভাব অনুযায়ী তালা-চাবির ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।
2). যেখানে খাদ্য, পানীয় জল, তামাক ইত্যাদি দূষিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেই স্থানে এই উপাদান সংরক্ষণ করবেন না এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন না।
3). যে কক্ষ বা স্থানে কীটনাশক সংরক্ষণ করা হবে, তা মজবুত, শুষ্ক, আলোকযুক্ত, বায়ু চলাচলযোগ্য এবং আয়তনে পর্যাপ্ত বড় হতে হবে।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	ওজন
1	ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল সক্রিয় উপাদান	0.40 % ওজন/ওজন
2	পলিএক্রিলিক অ্যাসিড	0.40 % ওজন/ওজন
3	পানি	0.40 % ওজন/ওজন
4	ডোডেসিল হাইড্রোক্সিপলি (অক্সি-1,2-ইথেনডাইল) ফসফেট	0.40 % ওজন/ওজন
5	ক্যালসিয়াম লিগনোসালফোনেট	1.00 % ওজন/ওজন
6	নীল রং	0.05 % ওজন/ওজন
7	ট্যালক পাউডার	8.00 % ওজন/ওজন
8	বালি	প্রয়োজন অনুযায়ী % ওজন/ওজন
	মোট	100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

క్లోరాన్ట్రానిలిప్రోల్ 0.4% బరువు/బరువు జి ఆర్
(కీటకనాశిని)

క్లోరాన్ట్రానిలిప్రోల్ 0.4% బరువు/బరువు జి ఆర్ ఒక కొత్త రకమైన దాణాదార కీటకనాశిని. ఇందులో 0.4% క్లోరాన్ట్రానిలిప్రోల్ క్రియాశీల పదార్థంగా కలపబడింది.

సిఫారసు

		హెక్టారుకు అవసరమైన మోతాదు				
పంటలు	పురుగు సాధారణ పేరు	క్రియాశీల పదార్థం (గ్రాము)	ఫార్ములేషన్ (కిలోగ్రాము)	నీటిలో వినియోగ విధానం	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచిచూడు కాలం (రోజులు)	ప్రతి వినియోగం తర్వాత పునఃప్రవేశం (గంటలు)
వరి	పసుపు కాండం తొలిచే పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఇన్సర్టులాస్), వరి ఆకు మడిచే పురుగు (క్నాఫాలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	40	10	ప్రసరణ పద్ధతి	53	—
చెరకు	ప్రారంభ కాండం తొలిచే పురుగు (చిలో ఇన్ఫ్యుస్కాటెల్లస్), పై కాండం తొలిచే పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఎక్సెర్ప్టాలిస్)	75	18.75	ప్రసరణ పద్ధతి	147	—

వినియోగానికి మార్గదర్శకాలు
క్లోరాన్ట్రానిలిప్రోల్ దాణాదార మందును ఒకేసారి ఒక ఎకరాకు 4 కిలోల చొప్పున వరి పొలంలో మరియు ఒక ఎకరాకు 7.5 కిలోల చొప్పున చెరకు పొలంలో
చల్లాలి. చెరకులో విత్తే సమయంలో కాలువలో మరియు మొలకెత్తే సమయంలో మొక్కల వేర్ల సమీపంలోని మట్టిలో
వరుసలుగా వేయాలి. అనంతరం నీరు పెట్టాలి.

వినియోగ సమయం
1). వరి నాట్లు వేసిన 15–35 రోజుల తర్వాత చల్లాలి.
2). చెరకు పొలంలో విత్తిన తరువాత మొదటి సాగునీటి వరకూ ఉపయోగిస్తే
కాండం తొలిచే పురుగుల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. పైభాగం తొలిచే పురుగుల నుండి రక్షణ పొందేందుకు ఆ పురుగుల గుడ్లు కనిపించిన వెంటనే ఉపయోగించాలి.

వినియోగదారుల కోసం జాగ్రత్తలు
1). ఆహార పదార్థాలు, ఆహార పదార్థాల ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశువుల మేత నుండి దూరంగా ఉంచాలి.
2). నోరు, చర్మం, కళ్ళు మరియు శ్వాస ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
3). వినియోగించిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి.
4). వినియోగ సమయంలో పొగతాగడం, తినడం, త్రాగడం లేదా ఏదైనా నమలడం చేయకూడదు.
5). వినియోగ సమయంలో రబ్బరు చేతి తొడుగులు, కళ్లద్దాలు మరియు కంటి/ముఖ రక్షణ కవచం వంటి పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి.

విష లక్షణాలు
అలసట రావడం, మసకగా కనిపించడం మరియు ముక్కు నుండి నీరు కారడం.

ప్రాథమిక చికిత్స
1). చర్మానికి తాకినట్లయితే: చర్మాన్ని ఎక్కువ పరిమాణంలో సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి.
2). కళ్ళకు తాకినట్లయితే: కళ్ళను ఎక్కువ నీటితో కడగాలని సూచించబడింది. అవసరమైతే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
3). శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళితే: ప్రత్యేక చికిత్స ఏదీ సూచించబడలేదు.
4). మింగినట్లయితే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

పంటలకు విష ప్రభావం
సిఫారసు చేసిన మోతాదులో వినియోగిస్తే పంటలకు విష ప్రభావం ఉండదు.

విష నివారిణి
ప్రత్యేకమైన విష నివారిణి ఏదీ లేదు, లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వాహణ
1). ఖాళీ డబ్బాలను విరగదీసి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా మట్టిలో 1/2 మీటర్ లోతులో పాతాలి.
2). ఖాళీ డబ్బాలను మళ్లీ వినియోగించకుండా బయట ఉంచకూడదు.
3). కీటకనాశిని తయారీదారు లేదా వినియోగదారుడి బాధ్యత ఏమిటంటే ప్యాకెట్లు, యంత్రాలు కడిగిన తరువాత మిగిలిన పదార్థాలు మొదలైన వాటిని సురక్షితంగా నిర్వాహణ చేయాలి, తద్వారా నీరు, పర్యావరణం మరియు మేత కలుషితం కాకుండా ఉండాలి. ఖాళీ డబ్బాలు మరియు ప్యాకెట్లను
విరగదీసి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతాలి.

నిల్వ నిబంధనలు
1). కీటకనాశినుల ప్యాకెట్లను ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ప్రదేశాల నుండి దూరంగా, వేరు వేరు గదులు లేదా ప్రదేశాలలో
కీటకనాశినుల రకం మరియు ప్రభావాన్ని బట్టి తాళం-తాళపు చెవి ఏర్పాటుతో నిల్వ చేయాలి.
2). ఆహారం, తాగునీరు, పొగాకు మొదలైనవి కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాలలో ఈ పదార్థాన్ని నిల్వ చేయకూడదు మరియు అక్కడ తినడం-త్రాగడం చేయకూడదు.
3). కీటకనాశిని నిల్వ చేసే గది లేదా ప్రదేశం బలంగా, పొడిగా, వెలుతురు కలిగి, గాలి ప్రవాహం ఉండే విధంగా మరియు పరిమాణంలో తగినంత పొడవు-వెడల్పుతో ఉండాలి.

రసాయనిక సంయోజనం

క్రమ సంఖ్య	భాగం	బరువు
1	క్లోరాన్ట్రానిలిప్రోల్ క్రియాశీల పదార్థం	0.40 % బరువు/బరువు
2	పాలీయాక్రిలిక్ ఆమ్లం	0.40 % బరువు/బరువు
3	నీరు	0.40 % బరువు/బరువు
4	డోడేసిల్ హైడ్రాక్సీపోలీ (ఆక్సీ-1,2-ఎథేన్‌డయిల్) ఫాస్ఫేట్	0.40 % బరువు/బరువు
5	కాల్షియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	1.00 % బరువు/బరువు
6	నీలి రంగు	0.05 % బరువు/బరువు
7	టాల్క్ పొడి	8.00 % బరువు/బరువు
8	ఇసుక	అవసరమైన పరిమాణం % బరువు/బరువు
	మొత్తం	100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% எடை/எடை ஜி ஆர்
(பூச்சிக்கொல்லி)

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% எடை/எடை ஜி ஆர் என்பது ஒரு புதிய துகள்மயமான வகை பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். இதில் 0.4% குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் செயலில் உள்ள கூறாக கலந்து உள்ளது.

பரிந்துரை

		ஒரு ஹெக்டேருக்கு தேவையான அளவு				
பயிர்கள்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	செயலில் உள்ள பொருள் (கிராம்)	கலவை (கிலோகிராம்)	நீரில் பயன்படுத்தும் முறை	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மீண்டும் நுழைவு (மணிநேரம்)
நெல்	மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான் (ஸ்கிர்ஃபோபாகா இன்செர்டுலாஸ்), நெல் இலை மடிப்பான் (க்னாபாலோக்ரோசிஸ் மெடினாலிஸ்)	40	10	பரவல் முறை	53	—
கரும்பு	ஆரம்ப தண்டு துளைப்பான் (சிலோ இன்ஃப்யூஸ்கடெல்லஸ்), மேல்தண்டு துளைப்பான் (ஸ்கிர்ஃபோபாகா எக்செர்ப்டாலிஸ்)	75	18.75	பரவல் முறை	147	—

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்
குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் துகள்கள் 4 கிலோ ஒரு ஏக்கர் நெற்பயிர் வயலில் மற்றும் 7.5 கிலோ ஒரு ஏக்கர் கரும்பு வயலில் ஒரே நேரத்தில்
சமமாகப் பரப்ப வேண்டும். கரும்பில் விதைப்பு நேரத்தில் பள்ளங்களில் மற்றும் முளைப்பு நேரத்தில் கிளைகளின் வேர் அருகே மண்ணில்
வரிசையாக இட வேண்டும். அதன் பின் பாசனம் செய்ய வேண்டும்.

பயன்பாட்டு நேரம்
1). நெல் நடவு செய்யப்பட்ட 15–35 நாட்களுக்குப் பிறகு பரப்ப வேண்டும்.
2). கரும்பு வயலில் விதைப்பிலிருந்து முதல் பாசனம் வரை பயன்படுத்தினால்
தண்டு துளைக்கும் பூச்சியிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும். மேல்தண்டு துளைக்கும் பூச்சியிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு அந்த பூச்சியின் முட்டைகள் காணப்படும் உடனே பயன்படுத்த வேண்டும்.

பயன்படுத்துபவர்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்
1). உணவுப் பொருட்கள், உணவுப் பொருட்களின் காலி பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடைகளின் தீவனங்களிலிருந்து விலகி வைத்திருக்க வேண்டும்.
2). வாய், தோல், கண்கள் மற்றும் மூச்சு வழியாக உடலுக்குள் செல்லாமல் கவனிக்க வேண்டும்.
3). பயன்படுத்திய பின் மாசடைந்த ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பகுதிகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும்.
4). பயன்படுத்தும் போது புகைபிடித்தல், உண்பது, குடிப்பது அல்லது எதையும் மெல்வது கூடாது.
5). பயன்படுத்தும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகள் ரபர ரப்பர் கையுறை, கண்ணாடி மற்றும் கண்/முக கவசம் அணிய வேண்டும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்
சோர்வு, மங்கலான பார்வை மற்றும் மூக்கில் இருந்து நீர் வடிதல்.

முதற்கட்ட சிகிச்சை
1). தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: தோலை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் நீரால் கழுவ வேண்டும்.
2). கண்களில் ஏற்பட்டால்: கண்களை அதிகமான நீரால் கழுவ பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தேவையெனில் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
3). மூச்சு வழியாக சென்றால்: தனிப்பட்ட சிகிச்சை எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
4). விழுங்கினால்: உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

பயிர் நச்சுத்தன்மை
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் பயிர்களுக்கு நச்சுத்தன்மை ஏற்படாது.

நச்சு நீக்கி
தனிப்பட்ட நச்சு நீக்கும் மருந்து எதுவும் இல்லை, அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்.

காலி பெட்டிகளின் அகற்றல்
1). காலி பெட்டிகளை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்து விலகி மண்ணில் 1/2 மீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்க வேண்டும்.
2). காலி பெட்டிகளை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதபடி வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது.
3). பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்பாளர் அல்லது பயன்படுத்துபவரின் கடமை என்னவெனில், பொதிகள், கருவி கழுவிய பின் மீதமுள்ள பொருட்கள் போன்றவற்றின் அகற்றலை பாதுகாப்பான முறையில் செய்ய வேண்டும். இதனால் நீர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தீவனம் மாசுபடக்கூடாது. காலி பெட்டிகள் மற்றும் பொதிகளை உடைத்து குடியிருப்புகளிலிருந்து விலகி புதைக்க வேண்டும்.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்
1). பூச்சிக்கொல்லி பொதிகளை உணவுப் பொருட்கள் சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது இடங்களிலிருந்து விலகி, தனித்தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் பூச்சிக்கொல்லியின் வகை மற்றும் விளைவுகளுக்கேற்ப பூட்டு-சாவி முறையில் சேமிக்க வேண்டும்.
2). உணவு, குடிநீர், புகையிலை போன்றவை மாசுபடும் வாய்ப்புள்ள இடங்களில் இந்த பொருளை சேமிக்கக் கூடாது; அங்கு உண்பதும் குடிப்பதும் கூடாது.
3). பூச்சிக்கொல்லி சேமிக்கப்படும் அறை அல்லது இடம் உறுதியானது, உலர்ந்தது, ஒளியுடன் கூடியது, காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் பரப்பளவில் போதுமான நீளமும் அகலமும் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	விளக்கம்	எடை
1	குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் செயலில் உள்ள கூறு	—	0.40 % எடை/எடை
2	போலிஅக்ரிலிக் அமிலம்	—	0.40 % எடை/எடை
3	தண்ணீர்	—	0.40 % எடை/எடை
4	டோடெசில் ஹைட்ராக்ஸிபோலி (ஆக்சி-1,2-எத்தேன் டையல்) பாஸ்பேட்	—	0.40 % எடை/எடை
5	கால்சியம் லிக்னோசல்போனேட்	—	1.00 % எடை/எடை
6	நீல நிறம்	—	0.05 % எடை/எடை
7	டால்க் தூள்	—	8.00 % எடை/எடை
8	மணல்	—	தேவையான அளவு % எடை/எடை
	மொத்தம்		100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.4% ಭಾರ/ಭಾರ ಜಿ ಆರ್
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.4% ಭಾರ/ಭಾರ ಜಿ ಆರ್ ಒಂದು ನವೀನ ದಾಣಾದಾರ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 0.4% ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

		హెక్టారుకు అవసరమైన మోతాదు				
పంటలు	పురుగు సాధారణ పేరు	క్రియాశీల పదార్థం (గ్రాము)	ఫార్ములేషన్ (కిలోగ్రాము)	నీటిలో వినియోగ విధానం	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వేచిచూడు కాలం (రోజులు)	ప్రతి వినియోగం తర్వాత పునఃప్రవేశం (గంటలు)
వరి	పసుపు కాండం తొలిచే పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఇన్సర్టులాస్), వరి ఆకు మడిచే పురుగు (క్నాఫాలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	40	10	ప్రసరణ పద్ధతి	53	—
చెరకు	ప్రారంభ కాండం తొలిచే పురుగు (చిలో ఇన్ఫ్యుస్కాటెల్లస్), పై కాండం తొలిచే పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఎక్సెర్ప్టాలిస్)	75	18.75	ప్రసరణ పద్ధతి	147	—

ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ದಾಣಾದಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7.5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚದರಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮೊಳಕೆಯ ಬೇರುಗಳ ಸಮೀಪದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
1). ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 15–35 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚದರಿಸಬೇಕು.
2). ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ
ಕಾಂಡ ತೊಳೆಯುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೊಳೆಯುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಳಸಬೇಕು.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
1). ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
2). ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
3). ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
4). ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ತಿನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚಬ್ಬಿಸುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.
5). ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕಣ್ಣಜ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು/ಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖವಾಡದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಆಲಸ್ಯ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1). ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಕಿದಲ್ಲಿ: ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
2). ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಕಿದಲ್ಲಿ: ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
3). ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ: ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
4). ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿತನ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿತನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
1). ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ 1/2 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.
2). ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3). ಕೀಟನಾಶಕ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು
1). ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಅನುಸಾರ ತಾಳೆ-ಕೀಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
2). ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ತಂಬಾಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಬಾರದು.
3). ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು, ಒಣವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಕುಳ್ಳದು, ಗಾಳಿ ಹರಿವಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಉದ್ದ-ಅಗಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ	ತೂಕ
1	ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಘಟಕ	—	0.40 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ಪಾಲಿಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ	—	0.40 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ನೀರು	—	0.40 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೋಲಿ (ಆಕ್ಸಿ-1,2-ಇಥೇನ್ ಡೈಯಿಲ್) ಫಾಸ್ಫೇಟ್	—	0.40 % ತೂಕ/ತೂಕ
5	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	—	1.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
6	ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ	—	0.05 % ತೂಕ/ತೂಕ
7	ಟಾಲ್ಕ್ ಪುಡಿ	—	8.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
8	ಮರಳು	—	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ % ತೂಕ/ತೂಕ
	ಒಟ್ಟು		100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ 0.4% ഭാര/ഭാര ജി ആർ
(കീടനാശിനി)

ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ 0.4% ഭാര/ഭാര ജി ആർ എന്നത് ഒരു നവീന ഗ്രാന്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനിയാകുന്നു. ഇതിൽ 0.4% ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ സജീവ ഘടകമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ശുപാർശ

		ഒരു ഹെക്ടറിന് ആവശ്യമായ അളവ്				
വിളകൾ	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	സജീവ ഘടകം (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (കിലോഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം	അവസാന തളിക്കലിൽ നിന്ന് കൊയ്ത്ത് വരെ കാത്തിരിപ്പ് കാലം (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
നെല്ല്	മഞ്ഞ തണ്ട് തുരപ്പൻ (സ്കിർഫോഫാഗ ഇൻസെർടുലാസ്), നെല്ല് ഇല മടക്കുപുഴു (ക്നാഫലോക്രോസിസ് മെഡിനാലിസ്)	40	10	വിതരണ രീതി	53	—
കരിമ്പ്	പ്രാരംഭ തണ്ട് തുരപ്പൻ (ചിലോ ഇൻഫ്യൂസ്കാറ്റെല്ലസ്), മുകള്ളണ്ട് തുരപ്പൻ (സ്കിർഫോഫാഗ എക്സർപ്റ്റാലിസ്)	75	18.75	വിതരണ രീതി	147	—

ഉപയോഗത്തിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ ഗ്രാന്യൂൾ ഒരേ സമയം ഒരു ഏക്കറിന് 4 കിലോഗ്രാം വീതം നെൽവയലിലും ഒരു ഏക്കറിന് 7.5 കിലോഗ്രാം വീതം കരിമ്പ് വയലിലും ചിതറിക്കണം. കരിമ്പിൽ വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുഴികളിൽ ചേർക്കുകയും
മുളക്കാലത്ത് കൂമ്പാരങ്ങളുടെ വേരുകളുടെ സമീപമുള്ള മണ്ണിൽ നിരയായി ഇടുകയും ചെയ്യണം. ഇതിന് ശേഷം ജലസേചനം നടത്തണം.

ഉപയോഗ സമയം
1). നെൽ നട്ടതിന് 15 മുതൽ 35 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിതറിക്കണം.
2). കരിമ്പ് വയലിൽ വിതച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യ ജലസേചനത്തിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ കീടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും.
മുകളിൽ തുരപ്പൻ കീടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ അവയുടെ മുട്ടകൾ കാണുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം.

ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
1). ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ശൂന്യ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗാഹാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലെ സൂക്ഷിക്കുക.
2). വായ, ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ, ശ്വസനം എന്നിവ വഴി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
3). ഉപയോഗത്തിനുശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകണം.
4). ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലി, ഭക്ഷണം, പാനം അല്ലെങ്കിൽ ചവയ്ക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യരുത്.
5). ഉപയോഗ സമയത്ത് റബ്ബർ കയ്യുറകൾ, കണ്ണട, കണ്ണ്/മുഖ സംരക്ഷണ മാസ്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള
പൂർണ്ണ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
ആലസ്യം തോന്നുക, കാഴ്ച മങ്ങിയതായി തോന്നുക, മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുക.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
1). ചർമ്മത്തിൽ തട്ടിയാൽ: ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം.
2). കണ്ണിൽ തട്ടിയാൽ: ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ കഴുകാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
ആവശ്യമായി തോന്നിയാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
3). ശ്വസനത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ: പ്രത്യേക ചികിത്സ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.
4). ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.

സസ്യവിഷത
ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് വിഷബാധ ഉണ്ടാകില്ല.

വിഷനാശിനി
പ്രത്യേകമായ വിഷനാശിനിയില്ല, ലക്ഷണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ചികിത്സ നൽകണം.

ശൂന്യ പാത്രങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം
1). ശൂന്യ പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ
അര മീറ്റർ ആഴത്തിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണം.
2). ശൂന്യ പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ തുറന്നുവെക്കരുത്.
3). കീടനാശിനി നിർമ്മാതാവിന്റെയോ ഉപയോക്താവിന്റെയോ കടമയാണ്
പാക്കറ്റുകൾ, യന്ത്രം കഴുകിയ ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ
സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം വെള്ളം, പരിസ്ഥിതി, മൃഗാഹാരം എന്നിവ മലിനമാകരുത്.
ശൂന്യ പാത്രങ്ങളും പാക്കറ്റുകളും പൊട്ടിച്ച് താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചിടണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1). കീടനാശിനി പാക്കറ്റുകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്ന് അകലെ വേർതിരിച്ച മുറികളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ, കീടനാശിനിയുടെ സ്വഭാവവും ഫലവും അനുസരിച്ച് താക്കോൽ-പൂട്ടോടെ സൂക്ഷിക്കണം.
2). ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, തുമ്പാകു മുതലായവ മലിനമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഈ വസ്തു സംഭരിക്കരുത്, അവിടെയിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
3). കീടനാശിനി സംഭരിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ദൃഢമായതും, വരണ്ടതും, വെളിച്ചമുള്ളതും, നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും വലിപ്പത്തിൽ മതിയായ നീളവും വീതിയും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	ഭാരം
1	ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ സജീവ ഘടകം	0.40 % ഭാരം/ഭാരം
2	പോളിയാക്രിലിക് ആസിഡ്	0.40 % ഭാരം/ഭാരം
3	വെള്ളം	0.40 % ഭാരം/ഭാരം
4	ഡോഡെസിൽ ഹൈഡ്രോക്സിപോളി (ഓക്സി-1,2-എഥേൻഡൈൽ) ഫോസ്ഫേറ്റ്	0.40 % ഭാരം/ഭാരം
5	കാൽസ്യം ലിഗ്നോസൾഫോണേറ്റ്	1.00 % ഭാരം/ഭാരം
6	നീല നിറം	0.05 % ഭാരം/ഭാരം
7	ടാൽക്ക് പൊടി	8.00 % ഭാരം/ഭാരം
8	മണൽ	ആവശ്യമായ അളവ് % ഭാരം/ഭാരം
	ആകെ	100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

کلورانٹرانیلیپرول 0.4٪ وزن/وزن جی آر
(کیڑے ماردوا)

،کلورانٹرانیلیپرول 0.4٪ وزن/وزن جی آر ایک جدید دانے دار قسم کی کیڑے ماردوا ہے
جس میں 0.4٪ کلورانٹرانیلیپرول بطور فعال جز شامل ہے۔

سفارشات

بعد کے استعمال پر داخلہ دوبارہ (گھنٹے)	سے اسپرے آخری انتظار تک کٹائی (دن) مدت کی	میں پانی کا استعمال طریقہ	فارمولیشن (کلوگرام)	جزو فعل (گرام)	نام عام کا کیڑے	فصلیں
			مقدار ہیکٹر فی			
—	53	طریقہ نشری	10	40	سکرفوفاگا) کیڑا والا چھیدنے تنا پیلا کیڑا والا موڑنے پتا دھان ،(انسرٹولاس (میڈینالس کنافالوکرازوسس)	دھان
—	147	طریقہ نشری	18.75	75	انفیو چلو) کیڑا والا چھیدنے تنا ابتدائی کیڑا والا چھیدنے تنا اوپری ،(سکاٹیلس (ایکسرپٹالس سکرفوفاگا)	گنا

استعمال کے لیے ہدایات
کلورانٹرانیلیپرول گرینولز کو ایک ساتھ
فی ایکڑ 4 کلوگرام دھان کے کھیت میں اور
فی ایکڑ 7.5 کلوگرام گنے کے کھیت میں بکھیر دیں۔
گنے میں بوائی کے وقت نالی میں ڈالیں اور
اُگاؤ کے وقت پودوں کی جڑوں کے قریب مٹی میں قطار کی صورت میں ڈالیں۔
اس کے بعد آبپاشی کریں۔

استعمال کا وقت
دھان کی روپائی کے 15 سے 35 دن بعد بکھیراؤ کریں۔ .(1
گنے کے کھیت میں بوائی کے بعد پہلی آبپاشی تک استعمال کرنے سے .(2
تنے میں سوراخ کرنے والے کیڑوں سے تحفظ ملتا ہے۔
اوپری سوراخ کرنے والے کیڑوں سے بچاؤ کے لیے
جیسے ہی ان کے انڈے نظر آئیں فوراً استعمال کریں۔

استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر
خوراکی اشیاء، خوراک کے خالی برتنوں اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ .(1
منہ، جلد، آنکھوں اور سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے بچائیں۔ .(2
استعمال کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ .(3
استعمال کے دوران سگریٹ نوشی، کھانا، پینا یا کچھ چبانا منع ہے۔ .(4
استعمال کے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں .(5
جیسے ربڑ کے دستانے، چشمہ اور آنکھ/چہرے کا ماسک۔

زہر کی علامات
سستی محسوس ہونا، نظر کا دھندلا ہونا اور ناک بہنا۔

ابتدائی طبی امداد
جلد پر لگنے کی صورت میں: صابن اور زیادہ مقدار میں پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ .(1
آنکھ میں جانے کی صورت میں: آنکھوں کو خوب زیادہ پانی سے دھونے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ .(2
ضرورت محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
سانس کے ذریعے اندر جانے کی صورت میں: کوئی خاص علاج تجویز نہیں کیا گیا۔ .(3
نگلنے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ .(4

پودوں پر زہریلا اثر
سفارش کردہ مقدار میں استعمال کرنے سے پودوں پر زہریلا اثر نہیں ہوتا۔

زہر کا تریاق
کوئی خاص تریاق موجود نہیں ہے، علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کی تلفی
خالی ڈبوں کو توڑ کر رہائشی علاقے سے دور .(1
آدھا میٹر گہرائی میں زمین میں دفن کریں۔
خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال سے روکنے کے لیے کھلا نہ چھوڑیں۔ .(2
کیڑے ماردوا کے بنانے والے یا استعمال کرنے والے کی ذمہ داری ہے .(3
کہ پیکٹ، مشین کی دھلائی سے بچی ہوئی اشیاء وغیرہ کی
نکاسی محفوظ طریقے سے کریں تاکہ
پانی، ماحول اور چارہ آلودہ نہ ہو۔
خالی ڈبوں اور پیکٹوں کو توڑ کر آبادی سے دور دفن کریں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
کیڑے ماردوا کے پیکٹوں کو خوراکی اشیاء رکھنے والے کمروں یا جگہوں سے دور .(1
، علیحدہ کمروں یا جگہوں میں
کیڑے ماردوا کی نوعیت اور اثر کے مطابق
تالا اور چابی کے انتظام کے ساتھ محفوظ کریں۔
ایسی جگہ پر اس مواد کو ذخیرہ نہ کریں .(2
،جہاں خوراک، پینے کا پانی یا تمباکو آلودہ ہو سکتا ہو
اور نہ ہی وہاں کھائیں یا پئیں۔
جس کمرے یا جگہ میں کیڑے ماردوا ذخیرہ کی جائے .(3
وہ مضبوط، خشک، روشنی والی، ہوا دار
اور رقبے میں مناسب لمبائی اور چوڑائی والا ہونا چاہیے۔

کیمیائی ترکیب

رامش ربمن	وزج	نزو
1	وزج لاعف ل ورپیلیانارٹنارولک	نزو/نزو % 0.40
2	ڈسیا کلئاریکا یلوپ	نزو/نزو % 0.40
3	ینا پ	نزو/نزو % 0.40
4	ٹیفساف (لئاڈ ینئاتھیا-1,2-یسکآ) یلوپ یسکورڈیئاہ لسیڈوڈ	نزو/نزو % 0.40
5	ٹینئاف وسونگل میشلیک	نزو/نزو % 1.00
6	گنر الین	نزو/نزو % 0.05
7	رڈؤاپ کلیٹ	نزو/نزو % 8.00
8	تیر	نزو/نزو % تروریض بسح
	لک	نزو/نزو % 100

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu