AgroStar®

ROZTAM®

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC
(Fungicide)

रोजतम

एजॉक्सीस्ट्राबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% व/व एस सी
(फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC (Fungicide)

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC is a suspensible concentrate fungicide for control of fruit rot, Die back and powdery mildew in Chilli; Downy mildew, Powdery mildew in Grape; Scab (Venturia inaequalis), Powdery mildew (Podosphra leucotncha), Premature leaf fall (Marssonia coronaria) in Apple; purple blotch (alternaria porri) on Onion; Sheath blight on Rice; yellow rust (puccinia striformis) in Wheat;early blight (alternaria solani), late blight (phytophora infestans) in Potato crop. This formulation is equivalent to Azoxystrobin 12% + Tebuconazole 20% SC on w/v basis. Caution :- The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore, not to be used near aquaculture.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Fungus	Dosage/HA AI (gms)	Formulation (ml)	Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Apple	Scab (Venturia inaequalis), Powdery mildew (Podosphra leucotricha), Premature leaf fall (Marssonina coronaria)	0.11 + 0.183/L	1.0/L of water	8-12 L/ tree	10	–
Chilli	Fruit rot Powdery mildew Dieback	72 + 120	600	500–750	5	–
Grape	Downy mildew, Powdery mildew	82.5 + 137.25	750	500	10	–
Onion	Purple blotch (Alternaria porri)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
Potato	Early blight (Alternaria solani), Late blight (phytophthora infestans)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
Rice	Sheath blight (Rhizoctonia solani)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
Tomato	Early blight (Alternaria solani)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
Wheat	Yellow rust (Puccinia striiformis)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

Direction Of Use
Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to from final spray solution.

Time of Application
To be applied preventively and to be repeated at 15 days interval depending upon prevailing weather conditions and disease pressure.

Precautions
1. During spraying wear suitable respiratory equipment.
2. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots.
3. Wear suitable gloves.
4. Wear chemical goggles or face shield.

Symptoms Of Poisoning
Irritating to eyes. May cause sensitization by skin contact.

First Aid
1. Inhalation: Remove victim to fresh air. Keep victim warm and at rest. If breathing is difficult, give oxygen obtain medical attention.
2. Ingestion: Do not induce vomiting. Wash out mouth with plenty of water. Rinse mouth before giving glass of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If breathing is difficult, give oxygen get medical attention.
3. Skin Contact: Remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse. Consult a doctor in the event of any complaints.
4. Eye contact: Wash off with plenty of water if pain persists, consult an eye specialist.

Phytotoxicity
Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote
There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportively therapy.

Disposal Of Used Container
1. Empty containers should not be re-used.
2. Destroy the empty container after use and bury them ½ meter deep in soil away from habitation.
3. Surplus spray material or washings from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions
1. Do not store consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material.
2. Store the fungicide in its original pack tightly closed, away from the reach of children, irresponsible persons and livestock in a separate room, away from the rooms used for storing foodstuffs, animal feeds and other articles, under lock
and key.
3. The rooms or premises meant for storing shall be well built, cool, dry, well lit and ventilated and should be of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.
4. Transport the fungicide in such a manner so as not to come in contact with foodstuffs and animal feed.

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Weight
1	Azoxystrobin a.i.	11.00 % w/w
2	Tebuconazole a.i.	18.30 % w/w
3	Magnesium Aluminium Silicate	0.92 % w/w
4	Polyalkoxylated butyl ether	1.83 % w/w
5	Methyl methacrylate graft copolymer	2.75 % w/w
6	Sodium alkyl naphthalene sulfonate formaldehyde condensate	0.92 % w/w
7	Dimethylpolysiloxane	0.37 % w/w
8	1,2 Benzisothiazolin-3-one	0.09 % w/w
9	Propylene glycol	7.3 % w/w
10	Heteropolysaccharide 2% solution	0.028 % w/w
11	Water	Q.S. %
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

एजॉक्सीस्ट्राबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% व/व एस सी (फफूंदीनाशक)

एजॉक्सीस्ट्राबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% व/व एस सी मिर्च की फसल में फल गलन, डाई बैक और भस्मी फफूंद अंगूर में चुर्णी फफूंदी, मृदु रोमिल फफूंदी, सेब में पामा (बेटूरिया इनए कालिस), चुर्णी फफूंदी (पोडोस्पोरा लुकोट्रिचा), समय पूर्व गिरावट (मारसोनीअ करोनारिज), प्याज में बैंगनी मुहासा व धान में पर्णछंद अंगमारी; गेंहूमें पीला रतुआ; टमाटर में अगेती अंगमारी; आलू में अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी की रोकथाम हेतु असरदार निलंबित होने वाला सांद्र फफूंदनाशक है। यह फॉर्मुलेशन वजन/आयतन आधार पर एजॉक्सीस्ट्राबिन 12 % + टेबुकोनाजोल 20 % एस सी के समतुल्य है। सावधान :- मछली और जलीय जंतुओं के लिए विषाक्त है अत: मत्स्य पालन एवम जल जीवन के पास इस्तेमाल निषेध है।

उपयोग

फसल	फफूंदी के नाम	मात्रा/हेक्टेयर स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि. ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
सेब	पामा (बेटूरिया इनए कालिस), चुर्णी फफूँदी (पोडोस्पोरा लुकोट्रिचा), समय पूर्व गिरावट (मारसोनीअ करोनारिज)	0.11 + 0.183/ली	1.0/ली पानी में	8-12 ली/पेड़	10	–
अंगूर	चुर्णी फफूँदी, मृदुरोमिल फफूँदी	82.5 + 137.25	750	500	10	–
मिर्च	फल गलन भस्मी फफूंदी डाई बैक	72 + 120	600	500–750	5	–
प्याज	बैंगनी मुहासा	82.5 + 137.25	750	800	7	–
आलू	अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी	82.5 + 137.25	750	500	–	–
धान	पर्णछंद अंगमारी	82.5 + 137.25	750	800	–	–
टमाटर	अगेती अंगमारी	82.5 + 137.25	750	500	7	–
गेहूं	पीला रतुआ	82.5 + 137.25	750	500	–	–

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए घोलकर अंतिम छिड़काव घोल बना लें।

प्रयोग का समय
बचावकारी रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा दबाव के अनुसार मौजूदा मौसम दशाओ तथा रोग के 15 दिनों पर दोहराया जाना चाहिए।

प्रयोगकर्ता ओं के लिए सावधानियां
1. छिड़काव के दौरान उपयक्तु श्वसन उपकरण पहने।
2. उपयक्तु सुरक्षात्मक कपड़े और रासायनिक प्रतिरोधी जूते पहनें।
3. उपयक्तु दस्ताने पहनें।
4. रासायनिक चश्मे या चेहरा कवच पहनें।

विष के लक्षण
आँखों में जलन। त्वचा से सम्पर्क होने से संवेदीकरण का कारण हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा
1. अगर साँस द्वारा शरीर में चला गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। अगर साँस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन ल दें। डॉक्टर को बुलाएं।
2. अगर निगल लिया गया हो तो उल्टी कराने की कोशिश न करें। पानी से मुँह धो लें। पानी पिलाने से पहले मुँह को अच्छे से कुल्ला करें। बेहोश व्यक्ति को कभी मुँह से कुछ न दें। अगर साँस लेने में कुछ असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन दें। डॉक्टर को बुलायें।
3. अगर फफूंदनाशक त्वचा पर लग गया हो तो प्रभावित कपड़े निकाले और त्वचा को भरपूर पानी से और साबुन से धोएं। शिकायत की घटना में चिकित्सक से परामर्श कर्श रें।
4. आँखों से सम्पर्क होने से खूब पानी से धो लें। दर्द बना रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श कर्श रें।

पौधविशाक्तता
सुझायी गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौध विषाक्त नही।

विष नाशक
कोई विशिष्ट औषधोपचार नही है। लक्षण के अनसार उपचार करें तथा सम्पर्क उपचार दें।

खाली डिब्बों का नि पटारा
1. खाली डिब्बों को फिर से इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए।
2. इस्तेमाल के बाद खाली डिब्बे को नष्ट करते रिहायशी स्थान से दूर जमीन 1/2 मीटर की गहराई में गाड़ दें।
3. बची हुई छिड़काव सामग्री या मशीनों तथा डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्ते
1. इस सामग्री से प्रदषिू त हुए स्थान पर खाध, पेय पदार्थ या त र्थ म्बाकू का सेवन या उपभोग न करें।
2.फफूंदनाशक का भंडारण उसके मूल डिब्बे में करें तथा इसे कस कर बंद करके बच्चो, गैर जिम्मेदार व्यक्तियों तथा पशुओ की पहुँच से दरु किसी अलग कमरे में ताला बंद करके करें जो कि खाध-पदार्थो, पशुआहारो तथा अन्य चीजो के भंडारण हेतु इस्तेमाल होने वाले कमरों से दरु हो। जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करण हो वह सूखा, अच्छी तरह निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्यापर्या बड़ा होना चाहिए ताकि उनकी वाष्प से कोई प्रदूषण न हो।
3. फफूंदनाशक के डिब्बों को खाद्य पदार्थ तथा पशु आहार के सम्पर्क में न आएं।

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	वजन
1	एजॉक्सीस्ट्राबिन स.त.	11.00 % भार/भार
2	टेबुकोनाजोल टेक्निकल स.त.	18.30 % भार/भार
3	मैग्नेशियम अल्युमीनियम सिलिकेट	0.92 % भार/भार
4	पोलीएल्कऑक्सीलेटेड ब्यूटाइल इथर	1.83 % भार/भार
5	मिथाइल मेथाक्राइलेट ग्राफ्ट कोपॉलिमर	2.75 % भार/भार
6	सोडियम एल्किल नेफ्थलीन सल्फोनेट फॉर्मल्डिहाइड कंडेन्सेट	0.92 % भार/भार
7	डायमिथाइल पॉलिसिलोक्सेन	0.37 % भार/भार
8	1,2 बेन्झआयसोथिझोलिन-3-वन	0.09 % भार/भार
9	प्रोपिलीन ग्लायकॉल	7.3 % भार/भार
10	हेट्रोपॉलीसैक्रेराइड 2% सॉल्यूशन	0.028 % भार/भार
11	पानी	बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा %
	कुल	100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

एझॉक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाझोल 18.3% व/व एस.सी. (बुरशीनाशक)

एझॉक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाझोल 18.3% व/व एस.सी. हे निलंबित होणारे सांद्र बुरशीनाशक असून त्याचा उपयोग मिरची पिकामधील फळ कुजणे, डायबॅक व भस्मी बुरशी; द्राक्षामधील भुरी बुरशी व मृदुरोमिल बुरशी; सफरचंदामधील स्कॅब (व्हेंटुरिया इनेक्वालिस), भुरी बुरशी (पोडोस्पोरा ल्युकोट्रिचा), अकाली पानगळ (मार्सोनिना कोरोनारिया); कांद्यातील जांभळा करपा; भातामधील शीथ ब्लाइट; गव्हामधील पिवळा तांबेरा; टोमॅटोमधील अगेती करपा; तसेच बटाट्यामधील अगेती करपा व पछेती करपा यांच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी आहे. हे फॉर्म्युलेशन वजन/आयतन आधारावर एझॉक्सीस्ट्रोबिन 12% + टेबुकोनाझोल 20% एस.सी. यास समतुल्य आहे. सावधान :- हे संयुग उत्पादन मासे व जलीय जीवांसाठी विषारी आहे, म्हणून मत्स्यपालन क्षेत्र व जलजीवनाच्या जवळ वापर निषिद्ध आहे.

शिफारस

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टेयर AI (ग्रॅम)	फॉर्म्युलेशन (मि.ली.)	पाण्यातील द्रावण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून काढणीपर्यंत कालावधी (दिवस)	पुनः प्रवेश कालावधी प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
सफरचंद	स्कॅब (वेंचुरिया इनएक्वालिस), भुरी (पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिचा), अकरली पान करपा (मार्सोनिना कोरोनारिया)	0.11 + 0.183/ली	1.0/ली पाणी	8–12 ली/झाड	10	–
द्राक्ष	डाउनी मिल्ड्यू, भुरी	82.5 + 137.25	750	500	10	–
मिरची	फळ कुज, भुरी, डायबॅक	72 + 120	600	500–750	5	–
कांदा	जांभळा करपा (अल्टरनेरिया पोरी)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
बटाटा	लवकर करपा (अल्टरनेरिया सोलानी), उशिरा करपा (फायटोफ्थोरा इन्फेस्टन्स)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
भात	लवकर करपा (अल्टरनेरिया सोलानी)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
टोमॅटो	शीथ ब्लाइट (रायझोक्टोनिया सोलानी)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
गहू	पिवळा करपा (पुक्सिनिया स्ट्रायफॉर्मिस)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

वापराची पद्धत
मोजलेली फफुंदनाशक मात्रा घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घाला. लाकडी काठी किंवा रॉडने चांगले हलवा आणि नंतर उर्वरित पाणी घालून अंतिम फवारणी द्रावण तयार करा.

लागवडीची वेळ
फवारणी प्रतिबंधक पद्धतीने करावी आणि सध्याच्या हवामानाच्या परिस्थिती व रोगदबावानुसार 15 दिवसांच्या अंतराने पुन्हा फवारणी करावी.

सावधगिरी
1. फवारणी करताना योग्य श्वसनयंत्र वापरा.
2. योग्य सुरक्षित कपडे आणि रासायनिक प्रतिरोधक बूट घालावे.
3. योग्य हातमोजे वापरा.
4. रासायनिक चष्मा किंवा फेस शील्ड वापरा.

विषबाधेची लक्षणे
डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो. त्वचेच्या संपर्कामुळे संवेदनशीलता निर्माण होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार
1. श्वासोच्छवास: पीडिताला ताज्या हवेवर घेऊन जा. त्याला उबदार ठेवा आणि विश्रांती द्या. श्वास घेताना अडचण असल्यास ऑक्सिजन द्या आणि वैद्यकीय मदत घ्या.
2. घासाळणे: उलटी करायला लावू नका. तोंड भरपूर पाण्याने धुवा. पाणी देण्याआधी तोंड स्वच्छ धुवा. अचेतन व्यक्तीस तोंडून काहीही देऊ नका. श्वास घेताना अडचण असल्यास ऑक्सिजन द्या व वैद्यकीय मदत घ्या.
3. त्वचेस संपर्क: प्रभावित कपडे काढा आणि सर्व उघड्या त्वचेच्या भागांना साबण व पाण्याने धुवा, नंतर उबदार पाण्याने धुवा. कोणतीही तक्रार असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
4. डोळे: भरपूर पाण्याने धुवा. वेदना राहिल्यास डोळ्यांचे तज्ज्ञ सल्ला घ्या.

वनस्पती विषबाधा
शिफारसीनुसार वापरल्यास फळझड, भाजीपाला किंवा इतर पिकांवर विषबाधा होत नाही.

उपचार
विशिष्ट औषध नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा आणि सहाय्यक थेरपी द्या.

वापरलेल्या डब्यांचा निपटारा
1. रिकाम्या डब्यांचा पुन्हा वापर करू नका.
2. वापरानंतर रिकामे डबे नष्ट करा आणि लोकसंख्येपासून दूर 1/2 मीटर खोलीत दफन करा.
3. अतिरिक्त फवारणी द्रावण किंवा मशीन/डब्यांमधील धुवा सुरक्षित पद्धतीने निपटवा, पर्यावरण आणि जलप्रदूषण टाळण्यासाठी.

साठवण अटी
1. या साहित्याच्या संपर्कात येईल असे अन्न, पेय किंवा तंबाखू येथे ठेवू नका.
2. फफुंदनाशक त्याच्या मूळ पॅकिंगमध्ये घट्ट बंद ठेवून, मुलं, असंवेदनशील व्यक्ती व पाळीव प्राण्यांच्या पोहोचेतून दूर एका वेगळ्या खोलीत ठेवा, अन्नधान्य, प्राणी खुराक किंवा इतर वस्तू ठेवलेल्या खोलीपासून वेगळ्या ठिकाणी.
3. साठवणीची खोली चांगली बांधलेली, थंड, कोरडी, चांगली प्रकाश व वेंटिलेशन असलेली असावी आणि वाष्पांपासून दूषण टाळण्यासाठी पर्याप्त मापदंडांची असावी.
4. फफुंदनाशक वाहतूक करताना अन्नधान्य आणि प्राणी खुराकाशी संपर्क होऊ नये.

रासायनिक संघटन

अनु. क्र.	घटक	वजन
1	अझॉक्सीस्ट्रोबिन ए.आय.	11.00 % व/व
2	टेबुकोनाझोल ए.आय.	18.30 % व/व
3	मॅग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट	0.92 % व/व
4	पॉलीअल्कॉक्सिलेटेड ब्यूटिल ईथर	1.83 % व/व
5	मिथाइल मेथाक्रिलेट ग्राफ्ट कोपॉलिमर	2.75 % व/व
6	सोडियम अल्किलनॅफ्थलीन सल्फोनेट फॉर्माल्डिहाइड कंडेन्सेट	0.92 % व/व
7	डायमेथाइलपॉलिसिलॉक्सेन	0.37 % व/व
8	1,2-बेंझिसोथायझोलिन-3-वन	0.09 % व/व
9	प्रोपिलीन ग्लायकोल	7.3 % व/व
10	हेटेरोपॉलिसॅकेराइड 2% द्रावण	0.028 % व/व
11	पाणी	आवश्यकतेनुसार
	एकूण	100 % व/व

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબુકોનાઝોલ 18.3% વઝન/વઝન એસ.સી. (ફૂગનાશક)

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબુકોનાઝોલ 18.3% વ/વ એસ.સી. એક સસ્પેન્ડેબલ સાંદ્ર ફૂગનાશક છે. તેનો ઉપયોગ મરચાંની પાકમાં ફળ સડવું, ડાયબેક અને ભસ્મી રોગ; દ્રાક્ષમાં ચૂર્ણી ફૂગ અને ડાઉની મિલ્ડ્યૂ; સફરજનમાં સ્કેબ (વેન્ટુરિયા ઇનિક્વાલિસ), ચૂર્ણી ફૂગ (પોડોસ્ફોરા લ્યુકોટ્રિયા), સમય પહેલાં પાંદડાં ઝરવું (માર્સોનિના કોરોનારિયા); ડુંગળીમાં જાંબલી ધબ્બો; ધાનમાં શીથ બ્લાઈટ; ઘઉંમાં પીળો તાંબેરો; ટમેટામાં અગ્ર કરપ; તથા બટાટામાં અગ્ર કરપ અને પાછળનો કરપ નિયંત્રણ માટે અસરકારક છે. આ ફોર્મ્યુલેશન વજન/આયતન આધાર પર એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 12% + ટેબુકોનાઝોલ 20% એસ.સી. ને સમકક્ષ છે. ચેતવણી :- આ સંયુક્ત ઉત્પાદન માછલીઓ અને જલીય જીવો માટે વિષાક્ત છે, તેથી મત્સ્ય પાલન વિસ્તાર તથા જલીય જીવનની નજીક ઉપયોગ કરવો નિષેધ છે..

ભલામણ

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર AI (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)	પાણીમાં ધોળાણ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધીનો સમય (દિવસ)	પુનઃ પ્રવેશ સમયગાળો દરેક છાંટણી પછી (કલાક)
સફરજન	સ્કેબ (વેન્ચુરિયા ઇનએક્વાલિસ), ભૂરી (પોડોસ્ફેરા લ્યુકોટ્રિયા), અકરલી પાન ઝુલસા (માર્સોનિના કોરોનારિયા)	0.11 + 0.183/લી	1.0/લી પાણી	8–12 લી/ઝાડ	10	–
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડ્યૂ ભૂરી	82.5 + 137.25	750	500	10	–
મરચાં	ફળ સડાં, ભૂરી, ડાયબેક	72 + 120	600	500–750	5	–
ડુંગળી	જાંબલી કરપા (અલ્ટરનેરિયા પોરી)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
બટાટા	વહેલો કરપા (અલ્ટરનેરિયા સોલાની), મોડો કરપા (ફાઇટોફથોરા ઇન્ફેસ્ટન્સ)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
ભાત	વહેલો કરપા (અલ્ટરનેરિયા સોલાની)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
ટામેટા	શીથ બ્લાઇટ (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
ઘઉં	પીળો કરપા (પક્સિનિયા સ્ટ્રાઇફોર્મિસ)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

ઉપયોગની રીત
નાપેલી ફંગિસાઈડની માત્રા લો અને તેમાં થોડી પાણી ઉમેરો. લાકડાની કાંઠી અથવા રોડથી સારી રીતે હલાવો અને પછી બાકીની પાણી ઉમેરો, અંતિમ સ્પ્રે સોલ્યુશન તૈયાર કરો.

લાગુ કરવાની સમયરેખા
આરોપણ નિવારક તરીકે કરો અને વર્તમાન હવામાનની સ્થિતિ અને રોગના દબાણ અનુસાર ૧૫ દિવસના અંતરે પુનરાવર્તન કરો.

સાવચેતીઓ
1. સ્પ્રે કરતી વખતે યોગ્ય શ્વસન ઉપકરણ પહેરો.
2. યોગ્ય રક્ષણાત્મક કપડાં અને રાસાયણિક પ્રતિકારક બૂટ પહેરો.
3. યોગ્ય દસ્તાનાં પહેરો.
4. રાસાયણિક ચશ્મા અથવા ફેસ શિલ્ડ પહેરો.

વિષપ્રદ્રાવનાં લક્ષણો
આંખોને પ્રભાવિત કરે છે. ત્વચા સંપર્કથી સંવેદનશીલતા આવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર
1. શ્વસન: દર્દીને તાજી હવામાં લાવો. તેમને ગરમ રાખો અને આરામ કરાવો. શ્વસન મુશ્કેલ હોય તો ઓક્સિજન આપો અને ડોકટરની સલાહ લો.
2. ગ્રંથિ: વમિતી કરાવશો નહીં. મોઢું પૂરતું પાણીથી ધોઈ લો. જો બેભાન હોય તો મોઢું કશું પણ ન આપો. શ્વસનમાં તકલીફ હોય તો ઓક્સિજન આપો અને તબીબી મદદ લો.
3. ત્વચા સંપર્ક: પ્રભાવિત કપડા ઉતારો અને તમામ ખુલ્લા ત્વચા વિસ્તારને સાબુ અને પાણીથી ધોવો. તકલીફ હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
4. આંખો: પૂરતું પાણીથી ધોવો, જો પીડા રહે તો આંખના નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

પારદર્શકતા
શિફારસ મુજબ ઉપયોગ કરવાથી પિકો પર કોઈ નુકસાન થતું નથી.

ઉપચાર
કોઈ વિશિષ્ટ ઔષધ નથી. લક્ષણ મુજબ સારવાર કરો અને સહાયક સારવાર આપો.

ખાલી કન્ટેનરનું નિકાલ
1. ખાલી કન્ટેનર ફરી વાપરશો નહીં.
2. ઉપયોગ પછી ખાલી કન્ટેનર નાશ કરો અને બસ્તીથી દૂર ૧/૨ મીટર ઊંડા દફન કરો.
3. વધુ સ્પ્રે મટીરિયલ અથવા મશીન/કન્ટેનરથી ધોઈ કચરો સુરક્ષિત રીતે ફેંકવો.

સંગ્રહની શરતો
1. આ પદાર્થના સંપર્કમાં આવતી ખાદ્ય વસ્તુ, પીણું અથવા તંબાકૂ અહીં ન રાખો.
2. મૂળ પેકિંગમાં કન્ટેનર સિક્યોર રાખો, બાળકો, અવ્યવસ્થિત લોકો અને પશુઓની પહોચથી દૂર, ખાદ્યપદાર્થ અને પશુભોજનથી અલગ.
3. સંગ્રહની જગ્યા ઠંડી, સુકી, પ્રકાશવાળી અને હોવી જોઈએ.
4. પરિવહન દરમિયાન ખાદ્યપદાર્થ અને પશુભોજનનો સંપર્ક ન થાય.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વજન
1	એઝોકસીસ્ટ્રોબિન એ.આઇ.	11.00 % વ/વ
2	ટેબુકોનાઝોલ એ.આઇ.	18.30 % વ/વ
3	મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ	0.92 % વ/વ
4	પોલીઆલ્કોક્સિલેટેડ બ્યુટાઇલ ઇથર	1.83 % વ/વ
5	મેથાઇલ મેથાક્રિલેટ ગ્રાફ્ટ કોપોલિમર	2.75 % વ/વ
6	સોડિયમ એલ્કિલનાફ્થેલિન સલ્ફોનેટ ફોર્માલ્ડિહાઇડ કન્ડેન્સેટ	0.92 % વ/વ
7	ડાઇમેથાઇલ પોલિસિલોક્સેન	0.37 % વ/વ
8	1,2-બેન્ઝઇસોથાયાઝોલિન-3-વન	0.09 % વ/વ
9	પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ	7.3 % વ/વ
10	હેટરોપોલિસેકેરાઇડ 2% દ્રાવણ	0.028 % વ/વ
11	પાણી	જરૂરી મુજબ
	કુલ	100 % વ/વ

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਐਜ਼ੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 11% + ਟੈਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 18.3% ਐਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਫੰਗਸਾਈਡ)

ਐਜ਼ੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 11% + ਟੇਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 18.3% ਵ/ਵ ਐਸ.ਸੀ. ਇੱਕ ਨਿਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਫਫੂੰਦਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲ ਸੜਨ, ਡਾਈ ਬੈਕ ਅਤੇ ਭਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ; ਅੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ ਫਫੂੰਦੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਦੁ ਰੋਮਿਲ ਫਫੂੰਦੀ; ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਸਕੈਬ (ਵੈਂਟੂਰੀਆ ਇਨੇਕੁਆਲਿਸ), ਭੂਰੀ ਫਫੂੰਦੀ (ਪੋਡੋਸਪੋਰਾ ਲਿਊਕੋਟ੍ਰਿਚਾ), ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਾ ਝੜਨਾ (ਮਾਰਸੋਨੀਨਾ ਕੋਰੋਨਾਰੀਆ); ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣੀ ਕਰਪਾ; ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ; ਗੇਹੂੰ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਤਾਂਬੇਰਾ; ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਕਰਪਾ; ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਕਰਪਾ ਤੇ ਪਛੇਤੀ ਕਰਪਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਭਾਰ/ਆਯਤਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਜ਼ੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 12% + ਟੇਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 20% ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮਤੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ :- ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੀਯ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ AI (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਘੰਟੇ)
ਸੇਬ	ਸਕੈਬ (ਵੈਂਚੂਰਿਆ ਇਨਇਕੁਆਲਿਸ), ਭੂਰੀ (ਪੋਡੋਸਫੈਰਾ ਲਿਊਕੋਟ੍ਰਿਚਾ), ਅਕਰਲੀ ਪੱਤਾ ਝੁਲਸਾ (ਮਾਰਸੋਨਿਨਾ ਕੋਰੋਨਾਰੀਆ)	0.11 + 0.183/ਲੀ	1.0/ਲੀ ਪਾਣੀ	8–12 ਲੀ/ਦਰੱਖਤ	10	–
ਅੰਗੂਰ	ਡਾਊਨੀ ਮਿਲਡੀਊ, ਭੂਰੀ	82.5 + 137.25	750	500	10	–
ਮਿਰਚ	ਫਲ ਸੜਨ, ਭੂਰੀ, ਡਾਈਬੈਕ	72 + 120	600	500–750	5	–
ਪਿਆਜ਼	ਜਾਮਣੀ ਕਰਪਾ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਪੋਰੀ)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
ਆਲੂ	ਅਗੇਤ ਕਰਪਾ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਸੋਲਾਨੀ), ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਪਾ (ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ ਇਨਫੈਸਟੈਂਸ)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
ਧਾਨ	ਅਗੇਤ ਕਰਪਾ (ਅਲਟਰਨੇਰੀਆ ਸੋਲਾਨੀ)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
ਟਮਾਟਰ	ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ (ਰਾਈਜ਼ੋਕਟੋਨੀਆ ਸੋਲਾਨੀ)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
ਗੇਹੂੰ	ਪੀਲਾ ਕਰਪਾ (ਪੁਕਸਿਨੀਆ ਸਟ੍ਰਾਈਫੋਰਮਿਸ)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਮਾਪੀ ਗਈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੜੀ ਜਾਂ ਰਾਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਪਰੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਨਿਵਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਪਹਿਨੋ।
2. ਢੰਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਾਇਣਿਕ ਬੂਟ ਪਹਿਨੋ।
3. ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।
4. ਰਾਸ਼ਾਇਣਿਕ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਚ/ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
1. ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ: ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ। ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।
2. ਗਿਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ: ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ।
3. ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਪੜੇ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
4. ਅੱਖਾਂ: ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਦਰਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਫਾਈਟੋਟੌਕਸਿਸਿਟੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।

ਉਪਚਾਰ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਡੋਟ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿਓ।

ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ
1. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਮੁੜ ਨਾ ਵਰਤੋ।
2. ਵਰਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਤੀ ਤੋਂ 1/2 ਮੀਟਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ।
3. ਵਾਧੂ ਸਪਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ/ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਧੋਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ।

ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।
2. ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਕਸਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਇਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ।
3. ਸਟੋਰਿੰਗ ਰੂਮ ਠੰਢਾ, ਸੁੱਕਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ।।
4. ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਵਜ਼ਨ
1	ਐਜ਼ੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਏ.ਆਈ.	11.00 % ਵ/ਵ
2	ਟੇਬੁਕੋਨਾਜੋਲ ਏ.ਆਈ.	18.30 % ਵ/ਵ
3	ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲਿਕੇਟ	0.92 % ਵ/ਵ
4	ਪੋਲੀਅਲਕੌਕਸੀਲੇਟਡ ਬਿਊਟਾਈਲ ਈਥਰ	1.83 % ਵ/ਵ
5	ਮਿਥਾਈਲ ਮੈਥਾਕ੍ਰਿਲੇਟ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੋਪੋਲਿਮਰ	2.75 % ਵ/ਵ
6	ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕਾਈਲਨੈਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ਫਾਰਮਾਲਡਿਹਾਈਡ ਕੰਡੈਂਸੇਟ	0.92 % ਵ/ਵ
7	ਡਾਈਮੈਥਾਈਲ ਪੋਲਿਸਿਲੋਕਸੇਨ	0.37 % ਵ/ਵ
8	1,2-ਬੈਂਜ਼ਇਸੋਥਾਇਜ਼ੋਲਿਨ-3-ਓਨ	0.09 % ਵ/ਵ
9	ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	7.3 % ਵ/ਵ
10	ਹੈਟਰੋਪੋਲਿਸੈਕਰਾਈਡ 2% ਘੋਲ	0.028 % ਵ/ਵ
11	ਪਾਣੀ	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
	ਕੁੱਲ	100 % ਵ/ਵ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

অ্যাজক্সিস্ট্রোবিন ১১% + টেবুকোনাজল ১৮.৩% w/w এস.সি.

(ছত্রাকনাশক)

অ্যাজক্সিস্ট্রোবিন 11% + টেবুকোনাজল 18.3% ও/ও এস.সি. একটি সাসপেন্ডেবল ঘন ফাঙ্গিসাইড। এটি মরিচ ফসলে ফল পচা, ডাই-ব্যাক ও ভস্মী রোগ; আঙুরে পাউডারি মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ; আপেলে স্ক্যাব (ভেন্টুরিয়া ইনইকুয়ালিস), পাউডারি মিলডিউ (পোডোস্পোরা লিউকোট্রিচা), অকাল পাতা ঝরা (মারসোনিনা করোনারিয়া); পেঁয়াজে বেগুনি দাগ; ধানে শীথ ব্লাইট; গমে হলুদ মরিচা; টমেটোতে আগাম ঝলসা; এবং আলুতে আগাম ঝলসা ও দেরি ঝলসা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। এই ফর্মুলেশন ওজন/আয়তন ভিত্তিতে অ্যাজক্সিস্ট্রোবিন 12% + টেবুকোনাজল 20% এস.সি.-এর সমতুল্য। সতর্কতা :- এই যৌগিক পণ্যটি মাছ ও জলজ জীবের জন্য বিষাক্ত, অতএব মৎস্যচাষ এলাকা ও জলজ পরিবেশের নিকটে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সুপারিশ

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর AI (গ্রাম)	মাত্রা/হেক্টর ফর্মুলেশন (মি.লি.)	পানিতে মিশ্রণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল (দিন)	পুনঃ প্রবেশের সময়কাল প্রতিটি ছিটানোর পরে (ঘণ্টা)
আপেল	স্ক্যাব (ভেনচুরিয়া ইনএকুয়ালিস), ভুরি (পোডোসফেরা লিউকোট্রিচা), আকারলি পাতা ঝলসা (মার্সোনিনা করোনারিয়া)	0.11 + 0.183/লি	1.0/লি পানি	8–12 লি/গাছ	10	–
মরিচ	ডাউনি মিলডিউ, ভুরি	72 + 120	600	500–750	5	–
আঙুর	ফল পচা, ভুরি, ডাইব্যাক	82.5 + 137.25	750	500	10	–
পেঁয়াজ	বেগুনি দাগ (অল্টারনারিয়া পোরি)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
আলু	আগাম দাগ (অল্টারনারিয়া সোলানি), দেরি দাগ (ফাইটোফথোরা ইনফেস্টান্স)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
ধান	আগাম দাগ (অল্টারনারিয়া সোলানি)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
টমেটো	শিথ ব্লাইট (রাইজোক্টোনিয়া সোলানি)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
গম	হলুদ মরিচা (পুক্সিনিয়া স্ট্রাইফর্মিস)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

ব্যবহারের নির্দেশাবলী

পরিমাপ করা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ নিন এবং তাতে অল্প পরিমাণ পানি যোগ করুন। একটি কাঠি বা দণ্ড দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন, এরপর বাকি পানি যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে চূড়ান্ত স্প্রে দ্রবণ তৈরি করুন।

প্রয়োগের সময়

প্রতিরোধমূলকভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতি ও রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ১৫ দিন অন্তর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা

1. স্প্রে করার সময় উপযুক্ত শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করুন।
2. উপযুক্ত সুরক্ষামূলক পোশাক ও রাসায়নিক প্রতিরোধী বুট পরুন।
3. উপযুক্ত দস্তানা পরুন।
4. রাসায়নিক সুরক্ষা চশমা অথবা ফেস শিল্ড ব্যবহার করুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

চোখে জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে। ত্বকের সংস্পর্শে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

1. শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে: আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান। উষ্ণ ও বিশ্রামে রাখুন। শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন দিন এবং চিকিৎসা সহায়তা নিন।
2. গলাধঃকরণ: বমি করাবেন না। প্রচুর পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। অচেতন ব্যক্তিকে মুখে কিছু দেবেন না। শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন দিন ও চিকিৎসা সহায়তা নিন।
3. ত্বকের সংস্পর্শ: দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং আক্রান্ত ত্বক সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কোনো সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
4. চোখে পড়লে: প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা থাকলে চোখের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ফাইটো টক্সিসিটি

সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহার করলে ফসলের কোনো ক্ষতি করে না।

প্রতিষেধক

কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা ও সহায়ক থেরাপি দিন।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি

1. খালি পাত্র পুনরায় ব্যবহার করবেন না।
2. ব্যবহারের পর খালি পাত্র ধ্বংস করে বসতি এলাকা থেকে দূরে মাটির নিচে ১/২ মিটার গভীরে পুঁতে ফেলুন।
3. অতিরিক্ত স্প্রে দ্রবণ বা যন্ত্র ও পাত্র ধোয়ার পানি নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করুন যাতে পরিবেশ ও জল দূষণ না হয়।

সংরক্ষণ শর্তাবলি

1. এই উপাদানের সংস্পর্শে আসতে পারে এমন খাদ্য, পানীয় বা তামাক সংরক্ষণ করবেন না।
2. ছত্রাকনাশকটি তার মূল প্যাকেটে শক্তভাবে বন্ধ করে শিশু, দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি ও গবাদিপশুর নাগালের বাইরে আলাদা কক্ষে রাখুন।
3. সংরক্ষণ কক্ষটি মজবুত, শীতল, শুষ্ক, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলযুক্ত হতে হবে।
4. পরিবহনের সময় খাদ্যদ্রব্য ও পশুখাদ্যের সংস্পর্শে না আসে সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	ওজন
1	অ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন এ.আই.	11.00 % ও/ও
2	টেবুকোনাজোল এ.আই.	18.30 % ও/ও
3	ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট	0.92 % ও/ও
4	পলিআলকক্সিলেটেড বুটাইল ইথার	1.83 % ও/ও
5	মিথাইল মেথাক্রিলেট গ্রাফট কোপলিমার	2.75 % ও/ও
6	সোডিয়াম অ্যালকাইন্যাফথালিন সালফোনেট ফরমালডিহাইড কনডেনসেট	0.92 % ও/ও
7	ডাইমিথাইল পলিসিলোক্সেন	0.37 % ও/ও
8	1,2-বেনজইসোথিয়াজোলিন-3-ওন	0.09 % ও/ও
9	প্রোপিলিন গ্লাইকোল	7.3 % ও/ও
10	হেটেরোপলিস্যাকারাইড 2% দ্রবণ	0.028 % ও/ও
11	পানি	প্রয়োজন অনুযায়ী
	মোট	100 % ও/ও

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

ایزوکسی اسٹرابن 11% + ٹیبوکونازول 18.3% وزن/وزن ایس سی

(فنگس کش دوا)

س کا استعمال مرچ کی فصل میں پھل سڑن، ڈائی بیک اور بھسی بیماری؛ انگور میں بھوری پھپھوندی اور بدھرول پھپھوندی؛ سیب میں اسکیب (وینٹوریا اِن ایکوئیلس)، بھوری پھپھوندی (پوڈوسپورا لیوکوٹریچا)، قبل از وقت پتوں کا جھڑنا (مارسونیہ کورونا ریا)؛ پیاز میں جامنی دھبہ؛ دھان میں شیتھ بلائٹ؛ گندم میں پیلا زنگ؛ ٹماٹر میں ابتدائی جھلساؤ؛ اور آلو میں ابتدائی جھلساؤ اور پچھیتی جھلساؤ کے کنٹرول کے لیے مؤثر ہے۔ یہ فارمولیشن وزن/حجم کی بنیاد پر ایزوکسی اسٹرابن 12% + ٹیبوکونازول 20% ایس۔سی۔ کے مساوی ہے۔ انتباہ:- یہ مرکب مصنوعات مچھلیوں اور آبی جانداروں کے لیے زہریلی ہیں، لہٰذا مچھلی پروری کے علاقوں اور آبی حیات کے قریب اس کا استعمال ممنوع ہے۔

سفارشات

فصل	نام عام کا بیماری	بیکٹر فی مقدار AI (گرام)	بیکٹر فی مقدار فارمولیشن (لیٹر ملی)	میں پانی ملاوٹ (لیٹر)	اسپرے آخری تک کٹائی سے (دن) وقفہ	مدت کی داخلے دوبارہ بعد کے چھڑکاؤ ہر (گھنٹے)
سیب	بھوری ،(ایکوالس اِن وینچوریا) اسکیب جھلسا پتہ اکرلی ،(لیوکوٹریچا پوڈوسفیرہ) (ریا کورونا مارسونینا)	0.11 + 0.183/لی	پانی لی/1.0	8–12 درخت/لی	10	–
انگور	بھوری ،میلڈیو ڈاؤنی	82.5 + 137.25	750	500	10	–
مرچ	بیک ڈائی ،بھوری ،سڑن پھل	72 + 120	600	500–750	5	–
پیاز	(پوری آلٹرنیریا) دھبہ جامنی	82.5 + 137.25	750	800	7	–
آلو	سے دیر ،(سولانی آلٹرنیریا) دھبہ ابتدائی (انفیسٹنس فائٹوفتھورا) جھلساؤ	82.5 + 137.25	750	500	–	–
دھان	(سولانی آلٹرنیریا) دھبہ ابتدائی	82.5 + 137.25	750	800	–	–
ٹماٹر	(سولانی رائیزوکٹونیا) بلائٹ شیتھ	82.5 + 137.25	750	500	7	–
گندم	(اسٹرائفورمس پکسینیا) زنگ پیلا	82.5 + 137.25	750	500	–	–

طریقۂ استعمال

فنگس کش دوا کی ناپی ہوئی مقدار تھوڑی مقدار پانی میں شامل کریں۔ لکڑی یا ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح ملائیں، پھر باقی پانی شامل کر کے اچھی طرح ہلائیں تاکہ حتمی اسپرے محلول تیار ہو جائے۔

وقتِ استعمال

احتیاطی طور پر استعمال کریں اور موجودہ موسمی حالات اور بیماری کے دباؤ کے مطابق 15 دن کے وقفے سے دہرائیں۔

احتیاطی تدابیر

1. اسپرے کے دوران مناسب تنفسی حفاظتی آلات استعمال کریں۔
2. مناسب حفاظتی لباس اور کیمیکل مزاحم جوتے پہنیں۔
3. مناسب دستانے پہنیں۔
4. کیمیکل گوگلز یا فیس شیلڈ استعمال کریں۔

زہریلے اثرات کی علامات

آنکھوں میں جلن پیدا کرتا ہے۔ جلد کے ساتھ رابطے سے حساسیت پیدا ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد

1. سانس کے ذریعے: متاثرہ شخص کو فوراً تازہ ہوا میں لے جائیں۔ گرم رکھیں اور آرام دیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو آکسیجن دیں اور طبی امداد حاصل کریں۔
2. نگلنے کی صورت میں: قے نہ کرائیں۔ منہ کو وافر پانی سے دھوئیں۔ پانی پلانے سے پہلے منہ کلی کروائیں۔ بے ہوش شخص کو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو آکسیجن دیں اور طبی امداد حاصل کریں۔
3. جلد سے رابطہ: آلودہ کپڑے اتار دیں اور متاثرہ جلد کو صابن اور پانی سے دھوئیں، بعد ازاں نیم گرم پانی سے صاف کریں۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
4. آنکھوں میں جانے کی صورت میں: وافر پانی سے دھوئیں۔ اگر درد برقرار رہے تو ماہرِ چشم سے رجوع کریں۔

فائٹوٹاکسیسٹی

سفارش کے مطابق استعمال کرنے پر فصل کے لیے نقصان دہ نہیں۔

تریاق

کوئی مخصوص تریاق موجود نہیں۔ علامات کے مطابق علاج اور معاون تھراپی دیں

استعمال شدہ کنٹینر کی تلفی

1. خالی کنٹینرز کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔
2. استعمال کے بعد خالی کنٹینرز کو تباہ کر کے آبادی سے دور زمین میں ½ میٹر گہرائی تک دفن کریں۔
3. اضافی اسپرے محلول یا مشینوں اور کنٹینرز کے دھوئے ہوئے پانی کو محفوظ طریقے سے تلف کریں تاکہ ماحول اور پانی کی آلودگی سے بچا جا سکے۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط

1. ان جگہوں پر خوراک، مشروبات یا تمباکو ذخیرہ یا استعمال نہ کریں جہاں یہ مواد آلودہ ہو سکتا ہو۔
2. فنگس کش دوا کو اس کی اصل پیکنگ میں مضبوطی سے بند کر کے، بچوں، غیر ذمہ دار افراد اور مویشیوں کی پہنچ سے دور، خوراکی اشیاء اور جانوروں کی خوراک ذخیرہ کرنے والے کمروں سے الگ، تالا بند کمرے میں رکھیں۔
3. ذخیرہ کرنے کے لیے مخصوص کمرے مضبوط، ٹھنڈے، خشک، اچھی روشنی اور مناسب ہواداری والے ہونے چاہئیں اور بخارات سے آلودگی سے بچنے کے لیے مناسب سائز کے ہوں۔
4. فنگس کش دوا کی ترسیل اس طرح کریں کہ وہ خوراکی اشیاء یا جانوروں کی خوراک کے ساتھ رابطے میں نہ آئے۔

کیمیائی ترکیب

شمار	جزو	وزن/وزن %
1	ایزوکسی اسٹرابن فعال جزو	11
2	ٹیبوکونازول تکنیکی فعال جزو	18.3
3	میگنیشیم ایلومینیم سلیکیٹ	0.92
4	پولی 'آکسی ایتھیلین& بیوٹانل ایتھر	1.83
5	میتھائل میتھاکریلیٹ گرافٹ کوپولیمر	2.75
6	سوڈیم الکائل نیفتھلین سلفونیٹ فارملڈیہائیڈ کنڈینسیٹ	0.92
7	ڈائی میتھائل پولی سیلوکسان	0.37
8	بینز آئیسوتھایازولین+1+ون 0* /	0.09
9	پروپیلین گلائکول	7.3
10	ٹرائی پولی فاسفیٹ 0٪ محلول	0.028
11	پانی	بنانے کے لیے مناسب مقدار
	کل	100

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 11% + ടെബ്യൂക്കോണാസോൾ 18.3% വ/വ എസ് സി

(കുമിൾനാശിനി)

എസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 11% + ടെബുക്കോണാഴോൾ 18.3% വ/വ എസ്.സി. ഒരു സസ്പെൻഡുചെയ്യാവുന്ന സാന്ദ്ര ഫംഗിസൈഡാണ്. ഇത് മുളക് വിളയിൽ ഫലം കുഴയൽ, ഡൈബാക്ക്, ഭസ്മി രോഗം; മുന്തിരിയിൽ ഭൂരി ഫംഗസ് രോഗവും മൃദുരോമിൽ ഫംഗസ് രോഗവും; ആപ്പിളിൽ സ്കാബ് (വെൻടൂരിയ ഇൻഇക്വാലിസ്), ഭൂരി ഫംഗസ് രോഗം (പൊഡോസ്പോറ ല്യൂകോട്രിച), സമയത്തിന് മുൻപുള്ള ഇലവീഴ്ച (മാർസോണിന കൊറോണാരിയ); ഉള്ളിയിൽ ജാംബളി കരപ്പ്; നെല്ലിൽ ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ്; ഗോതമ്പിൽ മഞ്ഞ തുരു; തക്കാളിയിൽ ആദ്യ കരപ്പ്; ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ആദ്യ കരപ്പയും പിന്നീടുള്ള കരപ്പയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഫോർമുലേഷൻ ഭാരം/ആയതനം അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 12% + ടെബുക്കോണാഴോൾ 20% എസ്.സി.-യ്ക്ക് തുല്യമാണ്. മുന്നറിയിപ്പ് :- ഈ സംയുക്ത ഉൽപ്പന്നം മീനുകൾക്കും ജലജീവികൾക്കും വിഷമാണ്. അതിനാൽ മത്സ്യകൃഷി പ്രദേശങ്ങളുടെയും ജലജീവവാസ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സമീപത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശുപാർശ

വിള	രോഗത്തിന്റെ പൊതുപേര്	ഹെക്ടറിന് അളവ് AI (ഗ്രാം)	ഹെക്ടറിന് അളവ് ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	വെള്ളത്തിൽ കലർത്തൽ (ലിറ്റർ)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് (ദിവസങ്ങൾ)	പുനഃപ്രവേശന കാലയളവ് ഓരോ സ്പ്രേയ്ക്കും ശേഷം (മണിക്കൂർ)
ആപ്പിൾ	സ്കാബ് (വെൻചൂരിയ ഇൻഎക്വാലിസ്), ഭൂരി (പോഡോസ്ഫേര ല്യൂക്കോട്രിച്ച), ആകർലി ഇല കരുകൽ (മാർസോണിന കൊറോണാരിയ)	0.11 + 0.183/ലി	1.0/ലി വെള്ളം	8–12 ലി/മരം	10	–
മുന്തിരി	ഡൗണി മിൽഡ്യൂ, ഭൂരി	82.5 + 137.25	750	500	10	–
മുളക്	ഫലം ചീഞ്ഞൽ, ഭൂരി, ഡൈബാക്ക്	72 + 120	600	500–750	5	–
ഉള്ളി	പർപ്പിൾ കരപ (ആൾട്ടർനേറിയ പോറി)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	പ്രാരംഭ കരുകൽ (ആൾട്ടർനേറിയ സോളാനി), വൈകിയ കരുകൽ (ഫൈറ്റോഫ്ത്തോറ ഇൻഫെസ്റ്റൻസ്)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
നെല്ല്	പ്രാരംഭ കരുകൽ (ആൾട്ടർനേറിയ സോളാനി)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
തക്കാളി	ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ് (റൈസോക്ടോണിയ സോളാനി)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
ഗോതമ്പ്	മഞ്ഞ കരപ (പക്സീനിയ സ്ട്രൈഫോർമിസ്)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അളന്നെടുത്ത ഫംഗിസൈഡിന്റെ അളവ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുക. ഒരു കൊമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കലക്കുക. തുടർന്ന് ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർത്ത്, അന്തിമ സ്പ്രേ ദ്രാവകം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നന്നായി കലക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം

രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി പ്രയോഗിക്കണം. കാലാവസ്ഥയും രോഗസമ്മർദ്ദവും അനുസരിച്ച് 15 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ ആവർത്തിക്കണം.

സാവധാനങ്ങൾ

1. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായ ശ്വസന സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കുക.
2. അനുയോജ്യമായ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങളും രാസപ്രതിരോധ ബൂട്ടുകളും ധരിക്കുക.
3. അനുയോജ്യമായ കൈയുറകൾ ധരിക്കുക.
4. രാസ ഗോഗിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ് ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കണ്ണുകൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ത്വക്കുമായി സമ്പർക്കം വന്നാൽ അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ

1. ശ്വസനം വഴി: ബാധിതനെ ഉടൻ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റുക. ചൂടോടെ വിശ്രമിപ്പിക്കുക. ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നൽകുക. വൈദ്യസഹായം തേടുക.
2. വിഴുങ്ങിയാൽ: ഛർദ്ദി ഉണ്ടാക്കരുത്. ധാരാളം വെള്ളംകൊണ്ട് വായ കഴുകുക. വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായ കഴുകണം. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് വായിലൂടെ ഒന്നും നൽകരുത്. ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നൽകി വൈദ്യസഹായം തേടുക.
3. ത്വക്കുമായി സമ്പർക്കം: മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത്, തുറന്ന ഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. തുടർന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
4. കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ: ധാരാളം വെള്ളംകൊണ്ട് കഴുകുക. വേദന തുടരുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണ് വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുക.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി

ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമല്ല.

പ്രത്യൗഷധം

പ്രത്യേക പ്രത്യൗഷധം ഇല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുകയും പിന്തുണച്ചുള്ള ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്യണം.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറിന്റെ നശീകരണം

1. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
2. ഉപയോഗത്തിനുശേഷം ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിച്ച്, താമസ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ മണ്ണിൽ ½ മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടണം.
3. ശേഷിക്കുന്ന സ്പ്രേ ദ്രാവകവും യന്ത്രങ്ങൾ, കണ്ടെയ്നറുകൾ എന്നിവ കഴുകിയ വെള്ളവും പരിസ്ഥിതിക്കും ജല മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകാത്ത വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ

1. ഈ വസ്തുവുമായി മലിനമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം, പാനീയം അല്ലെങ്കിൽ പുകയില സൂക്ഷിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
2. ഫംഗിസൈഡ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പാക്കറ്റിൽ മുറുകെ അടച്ച നിലയിൽ, കുട്ടികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും കൈവശം എത്താത്തവിധം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മൃഗാഹാരവും സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽ നിന്ന് അകലെ, പൂട്ടും താക്കോലുമുള്ള പ്രത്യേക മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം.
3. സംഭരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ ശക്തമായ ഘടനയുള്ളതും തണുത്തതും വരണ്ടതും നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. വാതക മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ വിസ്തീർണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
4. ഗതാഗത സമയത്ത് ഫംഗിസൈഡ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോടോ മൃഗാഹാരത്തോടോ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാത്തവിധം കൈമാറണം.

രാസ ഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	% ഭാരം/ഭാരം
1	അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ സജീവ ഘടകം	11
2	ടെബുക്കോണാസോൾ സാങ്കേതിക സജീവ ഘടകം	18.3
3	മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്	0.92
4	പോളി(ഓക്സിഇതിലീൻ) ബ്യൂട്ടൈൽ ഈഥർ	1.83
5	മെത്തിൽ മെഥാക്രിലേറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റ് കോപോളിമർ	2.75
6	സോഡിയം ആൽക്കൈൽ നാഫ്ഥലീൻ സൾഫോണേറ്റ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് കണ്ടൻസേറ്റ്	0.92
7	ഡൈമെത്തിൽ പോളിസിലോക്സേൻ	0.37
8	1,2 ബെൻസൈസോതിയാസോളിൻ-3-വൺ	0.09
9	പ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ	7.3
10	ട്രൈപോളിഫോസ്ഫേറ്റ് 2% ദ്രാവകം	0.028
11	വെള്ളം	തയ്യാറാക്കാൻ മതിയായ അളവ്
	ആകെ	100

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 11% + ಟೆಬುಕೋನಾಜೋಲ್ 18.3% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸ್ ಸಿ

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 11% + ಟೆಬುಕೋನಾಜೋಲ್ 18.3% ವ/ವ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಬಲ್ ಸಾಂದ್ರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತ, ಡೈಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಭಸ್ಮಿ ರೋಗ; ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ; ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ (ವೆಂಟೂರಿಯಾ ಇನೀಕ್ವಾಲಿಸ್), ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ (ಪೊಡೋಸ್ಪೋರಾ ಲ್ಯೂಕೋಟ್ರಿಚಾ), ಮುಂಗಡ ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ (ಮಾರ್ಸೋನಿನಾ ಕೊರೋನಾರಿಯಾ); ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಊದಾ ಮಚ್ಚು; ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೀಥ್ ಬ್ಲೈಟ್; ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ತುಪ್ಪು; ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕರಪ; ಹಾಗೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕರಪ ಮತ್ತು ತಡ ಕರಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ತೂಕ/ಆಯತನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 12% + ಟೆಬುಕೋನಾಜೋಲ್ 20% ಎಸ್.ಸಿ.ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ :- ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಜೀವ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ AI (ಗ್ರಾಂ)	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಯುವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಮರು ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ಪ್ರತಿ ರೇಖಟನೆಯ ನಂತರ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಸೇಬು	ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ (ವೆಂಚೂರಿಯಾ ಇನಏಕ್ವಾಲಿಸ್), ಭೂರಿ (ಪೊಡೋಸ್ಫೆರಾ ಲ್ಯೂಕೋಟ್ರಿಚಾ), ಆಕರ್ಲಿ ಎಲೆ ಕರಗುವಿಕೆ (ಮಾರ್ಸೋನಿನಾ ಕೊರೊನಾರಿಯಾ)	0.11 + 0.183/ಲಿ	1.0/ಲಿ ನೀರು	8–12 ಲೀ/ಮರ	10	–
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ, ಭೂರಿ	72 + 120	600	500–750	5	–
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಹಣ್ಣು ಕುಜ್ಜು, ಭೂರಿ, ಡೈಬ್ಯಾಕ್	82.5 + 137.25	750	500	10	–
ಈರುಳ್ಳಿ	ನೇರಳೆ ಕರಪ (ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಪೋರಿ)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಆರಂಭಿಕ ಕರಪ (ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಸೋಲಾನಿ), ತಡ ಕರಪ (ಫೈಟೋಫ್ಥೋರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟಾನ್ಸ್)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
ಭತ್ತ	ಆರಂಭಿಕ ಕರಪ (ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಸೋಲಾನಿ)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಶೀತ್ ಬ್ಲೈಟ್ (ರೈಜೋಕ್ಟೋನಿಯಾ ಸೋಲಾನಿ)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
ಗೋಧಿ	ಹಳದಿ ಕರಪ (ಪಕ್ಸಿನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಫಾರ್ಮಿಸ್)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ

ಅಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ದಂಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಯಬೇಕು.

ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯ

ತಡೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

1. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಉಸಿರಾಟ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
2. ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
3. ಸೂಕ್ತ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
4. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಖ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು

ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

1. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೊಂಡಲ್ಲಿ: ಪೀಡಿತನನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ. ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.
2. ನುಂಗಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ: ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿಸಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.
3. ಚರ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ: ಪ್ರಭಾವಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಬಿಚ್ಚಿರುವ ಚರ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಸೌಕರ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. ಕಣ್ಣು ಸಂಪರ್ಕ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತ್ವ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷನಾಶಕ (ಪ್ರತಿವಿಷ)

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ

1. ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.
2. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1/2 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.
3. ಉಳಿದ ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಶರತ್ತುಗಳು

1. ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.
2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಮಕ್ಕಳ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಪತ್ತಿನ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
3. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಒಣವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಚಲನವಲನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಾಷ್ಪದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
4. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	% ತೂಕ/ತೂಕ
1	ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	11
2	ಟೆಬುಕೋನಾಜೋಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	18.3
3	ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್	0.92
4	ಪೊಲಿಆಕ್ಸಿಅಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಈಥರ್	1.83
5	ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೋಪೊಲಿಮರ್	2.75
6	ಸೋಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್–ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಟ್	0.92
7	ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪೊಲಿಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.37
8	1,2 ಬೆನ್ಜಿಸೊಥಿಯಾಜೋಲಿನ್–3–ಒನ್	0.09
9	ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	7.3
10	ಟ್ರೈಪೊಲಿಫಾಸ್ಫೇಟ್ 2% ದ್ರಾವಣ	0.028
11	ನೀರು	ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ %
	ಒಟ್ಟು	100

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೀಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 11% + டெபுகோனசோல் 18.3% எடை/எடை எஸ்.சி

(பூஞ்சாணநாசினி)

அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 11% + டெபுகோனாசோல் 18.3% வ/வ எஸ்.சி. என்பது ஒரு நிலையூட்டக்கூடிய அடர்த்தியான பூஞ்சைக் கொல்லியாகும். இது மிளகாய் பயிரில் கனியழுகல், டைபேக் மற்றும் சாம்பல் நோய்; திராட்சையில் பவுடரி மில்டியூ மற்றும் டவுனி மில்டியூ; ஆப்பிளில் ஸ்கேப் (வென்டூரியா இனீக்வாலிஸ்), பவுடரி மில்டியூ (போடோஸ்போரா லியூகோட்ரிச்சா), முன்கூட்டிய இலை உதிர்வு (மார்சோனினா கொரோனேரியா); வெங்காயத்தில் ஊதா புள்ளி நோய்; நெல்லில் ஷீத் பிளைட்; கோதுமையில் மஞ்சள் துரு; தக்காளியில் ஆரம்ப கருகல்; உருளைக்கிழங்கில் ஆரம்ப கருகல் மற்றும் பின்னடைவு கருகல் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த பயனுள்ளதாகும். இந்த தயாரிப்பு எடை/அளவு அடிப்படையில் அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 12% + டெபுகோனாசோல் 20% எஸ்.சி.க்கு சமமானது. எச்சரிக்கை :- இந்த கலப்பு தயாரிப்பு மீன்கள் மற்றும் நீரியல் உயிரினங்களுக்கு விஷமாகும். எனவே மீன்வளப் பகுதிகள் மற்றும் நீரியல் சூழலுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பரிந்துரை

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	ஹெக்டருக்கு அளவு AI (கிராம்)	ஹெக்டருக்கு அளவு கலவை (மி.லி.)	தண்ணீரில் கலப்பு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை இடைவெளி (நாட்கள்)	மீண்டும் நுழைவுத் காலம் ஒவ்வொரு தெளிப்புப் பின் (மணி)
ஆப்பிள்	ஸ்காப் (வெஞ்சூரியா இனெக்வாலிஸ்), பூரி (போடோஸ்பேரா லியூகோட்ரிகா), ஆகர்லி இலை கருகல் (மார்சோனினா கொரோனாரியா)	0.11 + 0.183/லி	1.0/லி தண்ணீர்	8–12 லி/மரம்	10	–
திராட்சை	டவுனி மில்டியூ, பூரி	82.5 + 137.25	750	500	10	–
மிளகாய்	பழ அழுகல், பூரி, டைபேக்	72 + 120	600	500–750	5	–
வெங்காயம்	ஊதா கருமை (ஆல்டர்நேரியா போரீ)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
உருளைக்கிழங்கு	ஆரம்ப கருகல் (ஆல்டர்நேரியா சோலானி), தாமத கருகல் (பைடோப்தோரா இன்ஃபெஸ்டன்ஸ்)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
நெல்	ஆரம்ப கருகல் (ஆல்டர்நேரியா சோலானி)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
தக்காளி	ஷீத் பிளைட் (ரைசோக்டோனியா சோலானி)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
கோதுமை	மஞ்சள் துரு (புக்சினியா ஸ்ட்ரைஃபார்மிஸ்)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

அளவிடப்பட்ட பூஞ்சாணநாசினி அளவை சிறிதளவு தண்ணீரில் சேர்க்கவும். குச்சி அல்லது கம்பியின் உதவியுடன் நன்றாக கலக்கவும். பின்னர் மீதமுள்ள தண்ணீரை சேர்த்து, இறுதி தெளிப்பு கரைசல் உருவாகும் வரை நன்றாக கலக்கவும்.

தெளிக்கும் நேரம்

முன்கூட்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக பயன்படுத்த வேண்டும். நிலவும் வானிலை மற்றும் நோய் அழுத்தத்தைப் பொறுத்து 15 நாட்கள் இடைவெளியில் மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. தெளிக்கும் போது பொருத்தமான சுவாச பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியவும்.
2. பொருத்தமான பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் இரசாயன எதிர்ப்பு பூட்களை அணியவும்.
3. பொருத்தமான கையுறைகள் அணியவும்.
4. இரசாயன பாதுகாப்புக் கண்ணாடி அல்லது முகக்கவசம் பயன்படுத்தவும்.

விஷபாதையின் அறிகுறிகள்

கண்களில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். தோல் தொடர்பினால் ஒவ்வாமை ஏற்படலாம்.

முதற்கட்ட சிகிச்சை

1. சுவாசம் மூலம்: பாதிக்கப்பட்டவரை உடனடியாக தூய காற்றுள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும். வெப்பமாக வைத்துக் கொண்டு ஓய்வு அளிக்கவும். சுவாசிக்க சிரமம் இருந்தால் ஆக்சிஜன் அளித்து மருத்துவ உதவி பெறவும்.
2. விழுங்கியால்: வாந்தி ஏற்படுத்த வேண்டாம். வாயை நிறைய தண்ணீரால் கழுவவும். தண்ணீர் குடிக்க அளிக்கும் முன் வாயை கழுவ வேண்டும். மயக்க நிலையில் உள்ளவருக்கு வாய்மூலம் எதையும் கொடுக்கக்கூடாது. சுவாசிக்க சிரமம் இருந்தால் ஆக்சிஜன் அளித்து மருத்துவ உதவி பெறவும்.
3. தோல் தொடர்பு: பாதிக்கப்பட்ட உடைகளை அகற்றி, வெளிப்பட்ட தோல் பகுதிகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவும். பின்னர் வெந்நீரால் கழுவவும். ஏதேனும் புகார் இருந்தால் மருத்துவரை அணுகவும்.
4. கண்களில் பட்டால்: அதிகமான தண்ணீரால் கழுவவும். வலி தொடர்ந்தால் கண் மருத்துவரை அணுகவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி

பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தினால் பயிர்களுக்கு தீங்கில்லை.

எதிர்விஷம்

குறிப்பிட்ட எதிர்விஷம் இல்லை. அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளித்து ஆதரவு சிகிச்சை வழங்க வேண்டும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்களை அகற்றுதல்

1. காலியான கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது.
2. பயன்படுத்திய பின் காலியான கொள்கலன்களை அழித்து, குடியிருப்புகளிலிருந்து விலகி மண்ணில் ½ மீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்க வேண்டும்.
3. மீதமுள்ள தெளிப்பு கரைசல் அல்லது இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களை கழுவிய நீரை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாடு ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள்

1. இந்த பொருளால் மாசுபடக்கூடிய இடங்களில் உணவு, பானங்கள் அல்லது புகையிலை சேமிக்கவோ பயன்படுத்தவோ கூடாது.
2. பூஞ்சாணநாசினியை அதன் அசல் பொதியில் நன்கு மூடி, குழந்தைகள், பொறுப்பற்ற நபர்கள் மற்றும் கால்நடைகளின் அடைவிற்கு எட்டாதவாறு, உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மிருக தீவனங்கள் சேமிக்கும் அறைகளிலிருந்து தனியாக, பூட்டு மற்றும் சாவியுடன் உள்ள அறையில் சேமிக்க வேண்டும்.
3. சேமிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் உறுதியான கட்டமைப்புடன், குளிர்ச்சியான, உலர்ந்த, நல்ல ஒளி மற்றும் காற்றோட்டம் கொண்டதாகவும், வாயு மாசுபாட்டைத் தவிர்க்க போதிய அளவிலான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
4. பூஞ்சாணநாசினியை போக்குவரத்து செய்யும் போது, அது உணவுப் பொருட்கள் அல்லது மிருக தீவனங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	% எடை/எடை
1	அசோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் செயற்கூறு	11
2	டெபுகோனாசோல் தொழில்நுட்ப செயற்கூறு	18.3
3	மக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கேட்	0.92
4	பாலி(ஆக்சிஎதிலீன்) பியூட்டில் ஈதர்	1.83
5	மெத்தில் மெதாக்ரிலேட் கிராஃப்ட் கோபாலிமர்	2.75
6	சோடியம் ஆல்கைல் நாப்தலீன் சல்போனேட் ஃபார்மால்டிஹைடு கன்டென்சேட்	0.92
7	டைமெத்தில் பாலிசிலோக்சேன்	0.37
8	1,2 பென்சிசோதையசோலின்-3-ஒன்	0.09
9	புரோபிலீன் கிளைகால்	7.3
10	ட்ரைப்பாலிபாஸ்பேட் 2% கரைசல்	0.028
11	தண்ணீர்	தயாரிக்க தேவையான அளவு
	மொத்தம்	100

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 11% + టెబుకోనాజోల్ 18.3% w/w ఎస్.సి.

(శిలీంధ్రనాశిని)

అజాక్సిస్ట్రోబిన్ 11% + టెబుకోనాజోల్ 18.3% వ/వ ఎస్.సి. ఒక సస్పెన్షన్ కాన్సెంట్రేట్ శిలీంధ్రనాశకం. ఇది మిరప పంటలో ఫల కుళ్లు, డైబ్యాక్ మరియు భస్మ వ్యాధి; ద్రాక్షలో పౌడరీ మిల్డ్యూ మరియు డౌనీ మిల్డ్యూ; ఆపిల్‌లో స్కాబ్ (వెంటూరియా ఇనీక్వాలిస్), పౌడరీ మిల్డ్యూ (పోడోస్పోరా ల్యూకోట్రిచా), ముందస్తు ఆకు రాలడం (మార్సోనినా కొరోనారియా); ఉల్లిపాయలో ఊదా మచ్చ; వరిలో షీత్ బ్లైట్; గోధుమలో పసుపు తుప్పు; టమాటాలో తొలిదశ మచ్చ; అలాగే ఆలుగడ్డలో తొలిదశ మచ్చ మరియు ఆలస్య మచ్చ నియంత్రణకు ప్రభావవంతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ ఫార్ములేషన్ బరువు/పరిమాణం ఆధారంగా అజాక్సిస్ట్రోబిన్ 12% + టెబుకోనాజోల్ 20% ఎస్.సి.కు సమానమైనది. హెచ్చరిక :- ఈ సంయుక్త ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జలజీవులకు విషపూరితమైనది. కావున మత్స్య సంరక్షణ ప్రాంతాలు మరియు జలజీవావాసాల సమీపంలో వినియోగించడం నిషేధం.

సిఫారసు

పంట	రోగం యొక్క సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టారు AI (గ్రా.)	మోతాదు/హెక్టారు ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	నీటిలో కలపడం (లీటర్లు)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత వరకు వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)	మళ్ళీ ప్రవేశించే వ్యవధి ప్రతి స్ప్రే తర్వాత (గంటలు)
ఆపిల్	స్కాబ్ (వెంచూరియా ఇనెక్వాలిస్), భూరి (పోడోస్ఫెరా ల్యూకోట్రిచా), ఆకర్లీ ఆకు ఎండుదల (మార్సోనినా కొరోనారియా)	0.11 + 0.183/లి	1.0/లి నీరు	8–12 లీ/చెట్టు	10	–
మిరప	డౌనీ మిల్డ్యూ, భూరి	72 + 120	600	500–750	5	–
ద్రాక్ష	ఫల కుళ్లు, భూరి, డైబ్యాక్	82.5 + 137.25	750	500	10	–
ఉల్లి	ఊదా మచ్చ (ఆల్టర్నేరియా పోరి)	82.5 + 137.25	750	800	7	–
బంగాళదుంప	ప్రారంభ మచ్చ (ఆల్టర్నేరియా సోలాని), ఆలస్య మచ్చ (ఫైటోఫ్థోరా ఇన్ఫెస్టాన్స్)	82.5 + 137.25	750	500	–	–
వరి	ప్రారంభ మచ్చ (ఆల్టర్నేరియా సోలాని)	82.5 + 137.25	750	800	–	–
టమాటా	షీత్ బ్లైట్ (రైజోక్టోనియా సోలాని)	82.5 + 137.25	750	500	7	–
గోధుమ	పసుపు తుప్పు (పక్సినియా స్ట్రైఫార్మిస్)	82.5 + 137.25	750	500	–	–

వాడే విధానం

కొలిచిన శిలీంధ్రనాశిని పరిమాణాన్ని తీసుకుని అందులో కొద్దిగా నీరు కలపాలి. కర్ర లేదా రాడ్‌తో బాగా కలిపి, తర్వాత మిగిలిన నీరు జోడించి చివరి స్ప్రే ద్రావణాన్ని తయారు చేయాలి.

వాడే సమయం

నివారకంగా ఉపయోగించాలి మరియు ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు రోగ తీవ్రతను బట్టి 15 రోజుల వ్యవధిలో మళ్లీ పిచికారీ చేయాలి.

జాగ్రత్తలు

1. పిచికారీ సమయంలో తగిన శ్వాస రక్షణ పరికరాలు ధరించాలి.
2. రక్షణ దుస్తులు మరియు రసాయన నిరోధక బూట్లు ధరించాలి.
3. చేతి తొడుగులు ధరించాలి.
4. రసాయన కళ్లద్దాలు లేదా ముఖ కవచం ధరించాలి.

విష లక్షణాలు

కళ్లకు చికాకు కలిగించవచ్చు. చర్మ సంపర్కంతో సున్నితత్వం ఏర్పడవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స

1. శ్వాస: బాధితుడిని తాజా గాలిలోకి తీసుకెళ్లాలి. వెచ్చగా ఉంచి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. శ్వాసలో ఇబ్బంది ఉంటే ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి మరియు వైద్య సహాయం పొందాలి.
2. మింగినపుడు: వాంతులు చేయించకూడదు. ఎక్కువ నీటితో నోరు కడగాలి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నవారికి నోటిమెంట ఏమీ ఇవ్వకూడదు.
3. చర్మ సంపర్కం: కలుషితమైన దుస్తులు తొలగించి చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. సమస్య ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
4. కళ్లలో పడితే: ఎక్కువ నీటితో కడగాలి. నొప్పి కొనసాగితే కంటి వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ

సిఫార్సు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు పంటలకు హానికరం కాదు.

ప్రతివిషం

ప్రత్యేక ప్రతివిషం లేదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్స మరియు సహాయక చికిత్స ఇవ్వాలి.

ఉపయోగించిన డబ్బాల నిర్వాహణ

1. ఖాళీ డబ్బాలను మళ్లీ ఉపయోగించరాదు.
2. ఉపయోగం తర్వాత ఖాళీ డబ్బాలను నాశనం చేసి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా మట్టిలో 1/2 మీటరు లోతులో పాతిపెట్టాలి.
3. మిగిలిన స్ప్రే ద్రావణం లేదా యంత్రాలు మరియు డబ్బాల కడుగుడు నీటిని సురక్షితంగా నిర్వాహించాలి.

నిల్వ నిబంధనలు

1. ఈ పదార్థంతో కలుషితమయ్యే ఆహారం, పానీయాలు లేదా పొగాకు నిల్వ చేయరాదు.
2. శిలీంధ్రనాశినిని మూల ప్యాకింగ్‌లో బాగా మూసి పిల్లలు, బాధ్యతలేని వ్యక్తులు మరియు పశువుల నుంచి దూరంగా వేరు గదిలో నిల్వ చేయాలి.
3. నిల్వ గది చల్లగా, పొడిగా, వెలుతురు మరియు గాలి ప్రవాహం కలిగి ఉండాలి.
4. రవాణా సమయంలో ఆహారం మరియు పశు మేతతో సంపర్కం లేకుండా చూడాలి.

రసాయనిక సంయోజనం

క్రమ సంఖ్య	ఘటకం	బరువు
1	అజోక్స్ట్రోబిన్ ఎ.ఐ.	11.00 % బ/బ
2	టెబుకోనాజోల్ ఎ.ఐ.	18.30 % బ/బ
3	మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికేట్	0.92 % బ/బ
4	పాలీఆల్కోక్సిలేటెడ్ బ్యూటైల్ ఈథర్	1.83 % బ/బ
5	మెథైల్ మెథాక్రిలేట్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్	2.75 % బ/బ
6	సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ కండెన్సేట్	0.92 % బ/బ
7	డైమెథైల్ పాలిసిలోక్సేన్	0.37 % బ/బ
8	1,2-బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్	0.09 % బ/బ
9	ప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్	7.3 % బ/బ
10	హెటెరోపాలిసాకరైడ్ 2% ద్రావణం	0.028 % బ/బ
11	నీరు	అవసరమైనంత
	మొత్తం	100 % బ/బ

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu