THIFLUZAMIDE 15% + DIFENOCONAZOLE 20% SC
(Fungicide)
(For Indigenous Manufacture)

Thifluzamide 15% + Difenoconazole 20% SC is a combination product of Fungicides for the control of Sheath blight, Brown spot, False smut and Grain discoloration in paddy.

Recommendations:

Crop	Diseases	Dosage per Ha			Waiting period (Days)
		a.i. (gm)	Formul-ation (ml)	Dilution in water (lit/ha)	
Paddy	Sheath blight, Brown spot, False smut and Grain discoloration	37.5+50	250	500	27

Method of application: Foliar spray

Direction for use: Apply measured quantity of Thifluzamide 15% + Difenoconazole 20% SC after diluting with water as stated above. For making spray solution dilute with small quantity of water and stir well using a stick. Then add remaining quantity of water as per spray volume required and mixed well again by stirring.

Weather condition: Should be apply preferably in the morning or evening hours. Avoid applications during high wind and rainy condition. Apply during clear weather conditions.

Soil and Water: All types.

Crop Stage for Application: Vegetative/early reproductive.

Application techniques: As per requirement spray on crop on initiation of fungus infestation. Ensure uniform spray on the crop.

Equipment type: Knapsack sprayer.

Nozzle Type: Hollow cone nozzle.

Dosage: As per given in above table.

Instruction for mixing: For making spray solution dilute measure quantity of Thifluzamide 15% + Difenoconazole 20% SC with small quantity of water and stir well using a stick. Then add remaining quantity of water as per spray volume required and mixed well again by stirring.

Manner and time of application: Foliar spray on fungus infestation.

Re-entry period: 48 Hours.

Purpose: For Agriculture use.

Pre-harvest interval: 27 days.

Frequency including maximum number of sprays: 2 sprays at 15 days interval.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Do not spray during active bee-foraging period of the day.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Safety Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. Do not use as an ultra-low volume spray.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Poisoning Symptoms: Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, irritation, sedation, dyspnea & hunched posture if swallowed.

First Aid: 1. If inhaled, remove patient from exposure, keep warm and rest. Call a physician. **2. In case of contact with skin,** immediately wash contaminated skin with soap and plenty of water. **3. If swallowed,** give large quantity of medical charcoal with plenty of water. Seek medical advice. **4. If eyes are contaminated,** immediately wash eyes with clean water for at least 15 min. Call a physician.

Storage: 1) The package containing fungicide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2) The rooms or premises meant for storing fungicide shall be well built, cool, dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Disposal of used package, surplus material and washing of Insecticide: 1) It shall be the duty of the manufacturers, formulators and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. **3)** The packages shall be broken and buried away from habitation.

CAUTION :1) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2) Destroy the container after use as directed on leaflet. 3) Do not use this product near aquaculture and in presence of Honeybees. Its use around the water bodies may be avoided.

Chemical Composition	% w/w
Thifluzamide a.i.	15.00
Difenoconazole a.i.	20.00
Fulvic acid	01.00
Ethylene oxide/propylene oxide block copolymer	02.50
Sodium salt of naphthalene sulfonate condensate	02.00
Glycol	05.00
Silicon emulsion	00.20
Aluminium magnesium silicate	01.25
Benzisothiazoline	00.20
Xanthan gum	00.15
Water	Q.S.
TOTAL	100.00

Size : 375mm X 275mm

थायफ्लूज़ामाईड १५% + डायफेनोकोनाज़ोल २०% एससी
(फफूंदीनाशक)
(स्वदेशी उत्पाद के लिए)

थायफ्लूज़ामाईड १५% + डायफेनोकोनाज़ोल २०% एससी फफूंदीनाशक का मिश्रण पदार्थ है जिसका उपयोग प्रतिरोपित धान फसल मे पर्णच्छेद अंगमारी, भूरी चित्ती रोग, आभासी कंड, ग्रेन डिसकलरेशन के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

उपयोग:

फसल	बिमारियों के नाम	मात्रा / हेक्टर			फसल काटने व अंतिम छिड़काव के बीच अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली./हेक्टर)	
धान	पर्णच्छेद अंगमारी, भूरी चित्ती रोग, आभासी कंड, ग्रेन डिसकलरेशन	३७.५+ ५०	२५०	५००	२७

उपयोग की विधि: पौधो पर छिड़काव।

उपयोग के लिए निर्देश: थायफ्लूज़ामाईड १५% + डायफेनोकोनाज़ोल २०% एससी की मापी हुई मात्रा उपर निर्देश किये अनुसार पानी में मिलाकर पौधो पर छिड़काव करे, छिड़काव का घोल बनाने के लिये कीटनाशक की मात्रा थोड़े से पानीमे मिलाकर लकडी की छड़ी से हिलाये उसके बाद आवश्यकता के अनुसार शेष पानी को मिलाये और दोबारा छड़ी से अच्छी तरह मिश्रित करे।

मौसम की स्थिति: मुख्यतः सुबह और शाम के समय उपयोग करे, तेज़ हवा और बारिश के समय उपयोग न करे। आसमान खुला हो तब इसका उपयोग करे।

मिट्टी और पानी: सभी प्रकार।

उपयोग के लिये फसल की प्रास्थिति: वनस्पतिक पौधविक अग्रिम प्रजनन अवस्था।

आवेदन तकनीक: फंगल इन्फ़ेक्शन होने पर जरुरत के हिसाब से पौधो पर छिड़काव करे। फसल पर एक समान छिड़काव सुनिश्चित करें।

उपकरण तकनीक: नेपसेक स्प्रेयर।

नोजल प्रकार: होलोकोन नोजल।

खुराक: ऊपर दी गई तालिका के अनुसार।

मिश्रण के लिए निर्देश: थायफ्लूज़ामाईड १५% + डायफेनोकोनाज़ोल २०% एससी की की मात्रा थोड़े से पानी में मिलाकर लकडी की छड़ी से हिलाये उसके बाद आवश्यकता के अनुसार शेष पानी को मिलाये और दोबारा छड़ी से अच्छी तरह मिश्रित करे।

पुन: प्रवेश अवधि: ४८ घंटे।

प्रयोजन: कृषि उपयोग के लिए।

फसल की बुवाई व कटाई के बीच का अंतराल: २७ दिन।

आवृत्ति स्प्रे की अधिकतम संख्या सहित: १५ दिन के अंतराल पर २ बार छिड़काव करे।

मधु मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: दिन में सक्रिय मधुमक्खी पालन अवधि के दौरान छिड़काव न करें।

पौध विषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करे। पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानियां:

१. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनो और पशुओ के चारे से दूर रखे। २. मुँह, त्वचा और आखो के संपर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस में जाने से बचाये। हवा की दीशा में छिड़काव करे। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या धोल मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने। ७. इस कीटनाशक को अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे की तरह नहीं छिड़कना चाहिए।

प्रतिकारक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

विषक्तिकरण के लक्षण: निगलने पर मतली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, जलन, बेहोशी, सांस की तकलीफ और कूबड़ मुद्रा।

प्राथमिक उपचार: १. अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो रोगी को प्रभावित स्थान से दूर लें जाएं, उसे गरम रखें तथा आराम करनें दें। चिकित्सक को बुलाएं। २. त्वचा से सम्पर्क होने पर, तुरंत दूषित त्वचा को साबुन और खूब पानी से अच्छी तरह धो लें। ३. यदि निगल लिया गया हो तो भरपूर मात्रा में पानी के साथ बड़ी मात्रा में मेडिकल चारकोल दें। डॉक्टर की सलाह लें। ४. यदि आंखें दूषित हो जाएं तो तुरंत स्वच्छ पानी से आंखों को कम से कम १५ मिनट तक धोयें। चिकित्सक को दिखाएं।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

संग्रहण की शर्तें: १) फफूंदीनाशक के डिब्बे को अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थोके संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए या फफूंदीनाशक की मात्रा और स्वाभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। २) भण्डारण करने की जगह अच्छी तरह से बंधी हुई, मजबूत, रोशनीदार, ठंडा, शुष्क हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई–चौड़ाई का होना चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. यह निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्त्तव्य है की वह डिब्बों / पैकेजेस या बची हुई तथा साधनो के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. उपयोग किये गए डिब्बों/पैकेजेस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजेस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

सावधानियॉं कथन: १) लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नही। २) पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात डिब्बों को नष्ट करें। ३) पानी के स्रोत के पास एवं मछली और मधुमक्खियों के होने पर इसका प्रयोग न करें।

रासायनिक रचना	% भा/भा
थायफ्लूज़ामाईड स.त.	१५.००
डायफेनोकोनाज़ोल स.त.	२०.००
फल्विक एसिड	०१.००
ईथीलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलिन ऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलिमर	०२.५०
सोडियम साल्ट ऑफ़ नेफ़थलीन सल्फोनेट कन्डेंसेट	०२.००
ग्लाइकोल	०५.००
सिलिकॉन इमल्शन	००.२०
एल्युमीनियम मैग्नीशियम सिलिकेट	०१.२५
बेनजिसोथियाज़ोलिन	००.२०
झांथन गम	००.१५
पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००.००

थिफ्लुझामाइड १५%+ डियफेनोकोनाझोल २०% एस्सी
(बुरशीनाशक)
(स्वदेशी उत्पादनासाठी)

थिफ्लुझामाइड १५%+ डियफेनोकोनाझोल २०% एस्सी हे बुरशीनाशकांचे एकत्रित उत्पादन आहे ज्यामध्ये लोंबी करपा, तपकिरी ठिपके, फाल्स स्मट आणि भाताच्या दाण्याचा रंग मंदावणे यांच्या नियंत्रणासाठी आहे.

शिफारस:

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रमाण / हेक्टर			शेवटची फवारणी ते कापणी पर्यंत वाट पाहण्याचा कालावधि (दिवसात)
		स.त. (ग्रॅम)	द्रावण (मिली)	पाण्याचे प्रमाण (लि./हे.)	
भात	लोंबी करपा, तपकिरी ठिपके, फाल्स स्मट, आणि दाण्यांचा रंग मंदावणे.	३७.५+५०	२५०	५००	२७

फवारणीची पध्दत: पर्णिय फवारणी.

वापरासाठी निर्देश: थिफ्लुझामाइड १५%+ डियफेनोकोनाझोल २०% एस्सी चे पाण्याने पातळ केल्यानंतर मोजलेले प्रमाण वापरा. फवारणीचे द्रावण त्यार करण्यासाठी थोड्या प्रमाणात पाण्यात पातळ करा आणि लाकडी स्टिक वापरून चांकाले ढवळून घ्या. नंतर फवारणीच्या आवश्यकतेनुसार उालेले पाणी घाला आणि पुन्हा ढवळून चांगले मिसळा.

हवामानाची स्थिती: ह्याला सकाळ वा संध्याकाळच्या वेळी फवारले पाहिजे. सोसाटयाचा वारा आणि पावसाळी स्थितीच्या वेळी फवारणी करू नये. स्वच्छ हवामानाच्या स्थितीच्या वेळी फवारणी करा.

माती आणि पाण्याचा : सर्व प्रकार.

प्रयोग करण्यासाठी पीकाची अवस्था: वनस्पतिजन्य/ लवकर पुनरुत्पादक.

फवारणीचे टेकनिक: कीटकांचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यावर आवश्यकतेनुसार पिकावर फवारणी करावी. पिकावर एकसमान फवारणी करावी.

उपकरणांचा प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेयर.

नोझल प्रकार: हॉलोकोन नोझल.
प्रमाण : वरील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे.

मिसळण्याच्या सुचना : फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी थिफ्लुझामाइड १५%+ डिफेनोकोनाझोल २०% एस्सी कमी प्रमाणात पाण्याने पातळ करा आणि काठीने चांगले ढवळून घ्या. नंतर फवारणीच्या आवश्यकतेनुसार उरलेले पाणी घाला आणि पुन्हा ढवळून चांगले मिसळा.

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ : बुरशीच्या प्रादुर्भावावर पर्णिय फवारणी.

पुन: प्रवेश कालावधी: ४८ तास.
हेतू: कृषि वापरा साठी.

कापणी पूर्व अंतराल: रोपणी केलेल्या भातात २७ दिवस.

जास्तीत जास्त फवारण्यांसह वारंवारता : १५ दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या.

मधमाश्यासारख्या फायदेशीर कीटकांना आणि कीटकांच्या नैसर्गिक शत्रुंना हानी पोहोचू नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी: दिवसा मधमाशांच्या सक्रिय कालावधी दरम्यान फवारणी करू नका.
रोपविषकारकता : जर शेतीच्या शिफारशीनुसार वापरल्यास हे उत्पादन रोपविषकारक नाही.

सुरक्षा खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू–पीवू वा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे वापरावेत.७) अल्ट्रा– लो व्हॉल्यूम स्प्रे म्हणून वापरु नका.

विषरोधकता: कोणताही खास उपचार माहीत नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

विषबाधेची लक्षणे: मळमळ उलटया, ओटीपोटरत दुखणे, आतिसार चिडचिड, उपशामक औषध, श्वास लागणे आणि गिळल्यास, कुबडलेली मुद्रा.

प्रथमोपचा : १) श्वासाद्वारे घेतल्यास: रूग्णास संपर्कातून काढून टाका उबदार ठेवा आणि विश्रांती घ्या, डॉक्टरला बोलंवा. **२) त्वचेच्या संपर्कांत आल्यास:** दुषित त्वचा त्वरित साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. **३) जर गिळले असेल तर:** भरपूर पाण्यात भरपूर प्रमाणात मेडीकल चारकोल घ्या. वैद्यकीय सल्ला द्या. **४) डोळे दुषित झाल्यास:** त्वरित स्वच्छ पाण्याने जवळजवळ १५ मिनिटे डोळे धुवा. डॉक्टरला बोलवा.

साठवण :१) कीटकनाशकची पॅकेजिस वेगळ्या खोलीत वा जागेत इतर समान साठवणीच्या जागेपासून दूर तणनाशकाचे प्रमाण आणि प्रकारानुसार वेगळ्या कपाटात कडीकुलपात ठेवावे. २) कीटकनाशक साठवण करण्याची खोली वा जागा मजबूत बांधणीची, कोरडी, भरपूर उजेडाची व हवेशीर आणि पूरेशी लांबरूंद असावी जेणे करून पर्यावरणाशी वाफेने होणारे प्रदुषण टळेल.

वापरलेली पॅकेजिस इतर साहीत्य आणि कीटकनाशक पाण्याची विल्हेवाट :१) निर्मांता, तणनाशक फॉम्यूलेटर्स आणि ऑपरेटर्सनी रिकामी पॅकेजिस वा इतर साहित्य आणि धुण्याचे पाणी ह्यांची विल्हेवाट अशा पद्धतीने लावावी जेणेकरून पर्यावरण वा पाणी दूषित होणार नाही.२) वापरलेली पॅकेजिसचा पूर्नवापर होवू नये म्हणून उघड्यावर टाकू नयेत ३)रिकामी पॅकेजिस मोडून–तोडून मनुष्यवस्तीपासून दूर पुरावित.

खबरदारीचे निवेदन: १. लेबल व लिफलेट वर सांगितलेल्या शिवाय अन्य कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जावू नये. २. वापरा नंतर डब्याला लिफलेट मधिल निर्देशानुसार नष्ट करा. ३. हे उत्पादन जलचर आणि मधमाशांचा वापर असेल अशा ठिकाणी वापरू नये. पाणवठयां भोवती त्याचा वापर टाळला जाऊ शकतो.

रासायनिक संरचना:	%व/व
थिफ्लुझामाइड स.त.	१५.००
डायफेनोकोनाझोल स.त.	२०.००
फ्लुविक ऑसिड	०१.००
इथलीन ॲक्साइड/प्रॉपिलीन ऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलिमर	०२.५०
नेप्थालीन सल्फोनेट कंडेन्सेटचे सोडियम सॉल्ट	०२.००
ग्लायकोल	०५.००
सिलिकॉन इमल्शन	००.२०
ॲल्युमिनियम मॅग्नेशियम सिलिकेट	०१.२५
बेंन्झिसोथिया झोलिन	००.२०
झेन्थन गम	००.१५
पाणी	क्यू.एस.
एकूण	१००.००

થિફ્લુઝામાઈડ ૧૫%+ ડિફેનોકોનેઝોલ ૨૦% એસસી
(ફૂગનાશક)
(ઘરેલ ઉત્પાદકો માટે)

થિફ્લુઝામાઈડ ૧૫%+ ડિફેનોકોનેઝોલ ૨૦% એસસી ડાંગરમાં આચ્છદ અંગમારી, કથ્થઈ ડાઘ, ફોલ્સ સ્મટ અને અનાજ બેરંગી થવાનું કાબૂમાં લેવા માટેનું ફૂગનાશકોનું સંયોજિત ઉત્પાદન છે.

ભલામણો :

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા			લાણણીથી છેલ્લા છંટકાવ સુધીની પ્રતિક્ષા અવધિ (દિવસોમાં)
		સ. ત. (ગ્રામ)	ફૉર્મ્યુલેશન (મિલી)	પાણીનું પ્રમાણ (લીટર/હેક્ટર)	
ડાંગર	આચ્છદ અંગમારી, કથ્થઈ ડાઘ, ફોલ્સ સ્મટ અને અનાજ બેરંગી થવું.	૩૭.૫+૫૦	૨૫૦	૫૦૦	૨૭

છંટકાવની પદ્ધતિઃ પર્ણીય છંટકાવ.

ઉપયોગ માટે નિર્દેશઃ થિફ્લુઝામાઈડ ૧૫%+ ડિફેનોકોનેઝોલ ૨૦% એસસી ના માપેલા જથ્થાને પાણીમાં ભેળવીને ઉપર જણાવ્યા મુજબ લાગુ કરો. સ્પ્રે સોલ્યુશન બનાવવા માટે થોડી માત્રામાં પાણી સાથે પાતળું કરો અને લાકડીનો ઉપયોગ કરીને સારી રીતે હલાવો. પછી સ્પ્રેની માત્રા મુજબ બાકીનું પાણી ઉમેરો અને ફરીથી હલાવીને સારી રીતે મિક્સ કરો.

હવામાનની સ્થિતિઃ ખાસ કરીને સવારે અથવા સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો જોઈએ. ભારે પવન અને વરસાદની સ્થિતિમાં છંટકાવ ટાળવો જોઈએ. સાફ હવામાનની સ્થિતિઓમાં છંટકાવ કરો.

માટી અને પાણીનો : બધા પ્રકાર

પાક અને ઉપયોગઃ વનસ્પતિ /વહેલી પુનરુત્પતિ

છંટકાવની પદ્ધતિઃ આવશ્યકતા અનુસાર જંતુનો ચેપ શરૂ થવા પર પાક પર છંટકાવ કરો. પાક પર એકસમાન છંટકાવની ખાતરી રાખો.

ઉપકરણનો પ્રકારઃ નેપસેક સ્પ્રેયર

નોઝલનો પ્રકારઃ હોલો કોન નોઝલ

માત્રાઃ ઉક્ત કોષ્ટકમાં આપ્યા મુજબ.

મિશ્રણ માટે સૂચમાંઃ છંટકાવનું મિશ્રણ બનાવવા માટે થોડી માત્રામાં પાણી સાથે થિફ્લુઝામાઈડ ૧૫%+ ડિફેનોકોનેઝોલ ૨૦% એસસીની માપની માત્રા ઉમેરો અને લાકડીથી સારી રીતે હલાવો. આ પછી છંટકાવની આવશ્યક માત્રા અનુસાર પાણીની બાકી માત્રા ઉમેરો અને હલાવતાં રહીને સારી રીતે મિશ્રણ કરો.

છંટકાવની રીત અને સમયઃ ફૂગી ચેપ પર પર્ણીય છંટકાવ.

પુનઃ પ્રવેશ અવધિઃ ૪૮ કલાક.

હેતુઃ કૃષિ હેતુ માટે.

લણણી-પૂર્વ અંતરઃ ૨૭ દિવસ.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતાઃ ૧૫ દિવસના અંતરે ૨ છંટકાવ.

મધમાખીઓ અને જંતુનાં નૈસર્ગિક દુશ્મનો જેવવા લાભદાયી જંતુઓને હાનિ ટાળવા માટે લેવાની સાવચેતીઃ મધમાખીઓ સક્રિય હોય તે સમયગાળામાં છંટકાવ નહીં કરો.

વનસ્પતિ માટે ઝેરતત્વઃ ઉત્પાદન જ્યારે ક્ષેત્રીય ભલામણ મુજબ વાપરવામાં આવે ત્યારે વનસ્પતિ માટે ઝેરી નથી.

સુરક્ષા સાવચેતીઓઃ ૧) આદ્યપદાર્થો, આદ્ય પદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. ૨) મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. ૩) છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪) છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ૫) છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કંઈપણ પીઓ, ખાઓ અને ચાવો નહીં. ૬) મિશ્રણ કરતી અને છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. ૭. અત્યંત નીચા વોલ્યુમનું છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ.

ઝેરનું મારણઃ કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

ઝેરનાં લક્ષણોઃ પેટમાં જવા પર ઊબકા, ઊલટી, પેટમાં દર્દ, અતિસાર, ખંજવાળ, ઘેન, ડાયસ્પનિયા અને ખંઢવાળી અંગસ્થિતિ ઉદ્ભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ ૧. શ્વાસમાં જવા પર દર્દીને સન્મુખતાથી દૂર કરો, તેને ગરમ રાખો અને આરામ આપો. તબીબને બોલાવો. ૨. ત્વચા સાથે સંપર્કઃ તુરંત દૂષિત ત્વચાને ભરપૂર પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. ૩. પેટમાં જવા પરઃ ભરપૂર પાણી સાથે મોટી માત્રામાં મેડિકલ ચારકોલ પો. તબીબી સલાહ લો. ૪. આંખો દૂષિત થવા પરઃ કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથ આંખોને ધુઓ. તબીબને બોલાવો.

સંગ્રહઃ ૧. જંતુનાશકો ધરાવતું પૅકેજ બીજી ચીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવું અથવા નીંદણનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધારિત અલગ કબાટોમાં તાળાં-ચાવીમાં બંધ કરીને રાખવું. ૨. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેનાં ઓરડા અથવા જગ્યા સારી બાંધણીનાં. સૂકાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં અને હવાદાર તથા પૂરતી મોકળાશવાળાં હોવાં જોઈએ જેથી નીંદણનાશકની વરાળથી પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ થતું અટકાવી શકાય.

જંતુનાશકનાં વપરાયેલાં પૅકેજીસ, વધારાની સામગ્રી તથા ધોવાણોનો નિકાલઃ ૧) ઉત્પાદનના ઉત્પાદકો, તૈયાર કરનારાઓ અને સંચાલકોની એ જવાબદારી રહેશે કે પૅકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશીનમાંથી ધોવાણ તથા પાત્રોનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવામાં આવે જેથી પર્યાવરણનું તથા જળ પ્રદુષણ થતું અટકે. ૨) વપરાયેલાં પૅકેજીસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો અટકે તે માટે બહાર છોડવાં નહીં. ૩) પૅકેજીસ ભાંગી નાંખવાં અને વસતીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવાં.

સાવચેતી કથનઃ ૧. લેબલ અને પરિપત્ર ઉપર વર્ણિત હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈ પ્રકારે ન વાપરવું. ૨. આ પરિપત્ર પર દર્શાવ્યા મુજબ કન્ટેનરોને તોડી નાખવાં જોઈએ. ૩) મત્સ્યપાલન કરાતું હોય અથવા મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યાં આ ઉત્પાદન ઉપયોગ નહીં કરશો. પાણીના તળાવો આસપાસ ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ	% ભાર / ભાર
થિફ્લુઝામાઈડ એ.આઈ.	૧૫.૦૦
ડિફેનોકોનેઝોલ એ.આઈ.	૨૦.૦૦
ફલ્વિક એસિડ	૦૧.૦૦
ઈથયલીન ઓક્સાઈડ / પ્રોપાયલીન ઓક્સાઈડ બ્લોક કોપોલીમર	૦૨.૫૦
નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ કન્ડેન્સેટનું સોડિયમ સોલ્ટ	૦૨.૦૦
ગ્લાયકોલ	૦૫.૦૦
સિલિકોન ઈમલ્ઝન	૦૦.૨૦
એલ્યુમિનિયમ મેગ્નેશિયમ સિલિકેટ	૦૧.૨૫
બેન્ઝિસોથિયાઝોલાઈન	૦૦.૨૦
ઝેન્થન ગમ	૦૦.૧૫
પાણી	પૂરતી માત્રા
કુલ	૧૦૦.૦૦

ਥਾਈਫ਼ਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੧੫%+ਡਾਈਫ਼ੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੨੦% ਐਸਸੀ
(ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ)
(ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ)

ਥਾਈਫ਼ਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੧੫%+ਡਾਈਫ਼ੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੨੦% ਐਸਸੀ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਮੇਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਖੋਲ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਭੂਰੇ ਦਾਗ, ਫ਼ਾਲਸ ਸਮੱਟ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬਦਰੰਗੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:

ਫਸਲ	ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਲਾਂ	ਖੁਰਾਕ/ ਹੇਕਟਰ			ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲਿ./ਹੇਕਟਰ)	
ਝੋਨਾ	ਖੋਲ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਭੂਰੇ ਦਾਗ, ਫ਼ਾਲਸ ਸਮੱਟ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬਦਰੰਗੀ।	੩੭.੫+੫੦	੨੫੦	੫੦੦	੨੭

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਪੱਤੀ ਛਿੜਕਾਅ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ: ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਈਫ਼ਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੧੫%+ਡਾਈਫ਼ੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੨੦% ਐਸਸੀ ਦੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪ੍ਰੇ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ: ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ : ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ: ਵਨਸਪਤਿਕ/ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਜਣਨਾਤਮਕ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਦਿਸਣ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪੈਣ।

ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਨੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ: ਹਾਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ।

ਮਾਤਰਾ: ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਈਫ਼ਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ੧੫%+ਡਾਈਫ਼ੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੨੦% ਐਸਸੀ ਦੀ ਨਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਓ। ਫੇਰ ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ **ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਓ।**

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ: ਫਫੂੰਦੀ ਰੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।

ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: ੪੮ ਘੰਟੇ।

ਮਕਸਦ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ।

ਪੂਰਬ ਕਟਾਈ ਵਕਫ਼ਾ: ਰੋਪਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ੨੭ ਦਿਨ।

ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ੧੫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ੨ ਛਿੜਕਾਅ।

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਕਿਰਿਆ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੌਦ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ: ਦਸੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧) ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ੨) ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ੩) ਸਪ੍ਰੇ ਫੁਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਸਪ੍ਰੇ ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋ। ੪) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗ ਧੋ ਲਓ। ੫) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ੬) ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ। ੭)ਅਲਟਰਾ-ਲੋ ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਵਿਸ਼ ਨਿਵਾਰਕ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਛਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਸੁਸਤੀ, ਡਿਸਪਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਬਾਪਣ, ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ: ੧. **ਸੁੰਘ ਲੈਣ 'ਤੇ**: ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੋਣੋ ਬਚਾਓ,ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ੨. **ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ**: ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਬੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ੩. **ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ**: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਇਲਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਓ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ੪. **ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ**: ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਟੋਰੇਜ: ੧) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ/ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨)ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ/ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫ਼ੈਲੇ।

ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:੧)ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ੨)ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ: ੧. ਲੇਬਲ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੩) ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:	%ਵ/ਵ
ਥਾਈਫ਼ਲੂਜ਼ਾਮਾਈਡ ਏ. ਆਈ.:	੧੫੦੦
ਡਾਈਫ਼ੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਏ. ਆਈ.:	੨੦
ਫੁਲਵਿਕ ਏਸਿਡ:	੦੧.੦੦
ਏਥਾਈਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ/ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਲਾਕ ਕੋਪੋਲਾਈਮਰ:	੦੨.੫੦
ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ਼ ਨਾਫ਼ਥਾਲੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ ਕੰਡੇਂਸੇਟ:	੦੨.੦੦
ਗਲਾਈਕੋਲ:	੦੫.੦੦
ਸਿਲੀਕੋਨ ਇਮਲਸ਼ਨ:	੦੦.੦੨
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੈਗਨੇਸੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ:	੦੧.੨੫
ਬੇਂਜ਼ੀਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲੀਨ:	੦੦.੨੦
ਸਾਨਥਮ ਗੰਮ:	੦੦.੧੫
ਪਾਣੀ:	ਕਿਊ. ਐਸ.
ਕੁੱਲ:	੧੦੦.੦੦

ಥೈಫ್ಲುಝೂಮೈಡ್ 15% + ಡೈಫೆನಾಕೊರ್ಝೋಲ್ 20% ಎಸ್‌ಸಿ
(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)
(ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ)

ಥೈಫ್ಲುಝೂಮೈಡ್ 15% + ಡೈಫೆನಾಕೊರ್ಝೋಲ್ 20% ಎಸ್‌ಸಿ, ಇದು ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸುಡುರೋಗ, ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ, ಕೃತಕ ಮಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ನಿರ್ವರ್ಣದಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಉತ್ಪಾದನವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ರೋಗಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರ್ಣೆ ಇಕ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವ-(ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	
ಬತ್ತ	ಹೊಟ್ಟಿನ ಸುಡುರೋಗ, ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ, ಕೃತಕ ಮಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ನಿರ್ವರ್ಣ	37.5+50	250	500	27

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಥೈಫ್ಲುಝೂಮೈಡ್ 15% + ಡೈಫೆನಾಕೊರ್ಝೋಲ್ 20% ಎಸ್‌ಸಿ,ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ : ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಶುಭ್ರ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ / ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಜನನ ಹಂತ

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಂಡುಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅನುಸಾರ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗುವ ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಉಪಕರಣದ ಮಾದರಿ: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

ನಾಝಲ್‌ನ ಮಾದರಿ: ಹೊಲ್ಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್

ಡೋಸೇಜ್ : ಮೇಲಿನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುಸಾರ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಥೈಫ್ಲುಝೂಮೈಡ್ 15% + ಡೈಫೆನಾಕೊರ್ಝೋಲ್ 20% ಎಸ್‌ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಒಂದು ಕೋಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸಿರಿ. ಆನಂತರ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಾಕಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ : ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸೋಂಕು ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ.

ಮರು ಪ್ರವೇಶ: 48 ಗಂಟೆಗಳು.

ಉದ್ದೇಶ: ಕೃಷಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ.

ಕೊಯ್ಲಿನ ಮೊದಲು ಕಾಯುವ ಅವಧಿ: 27 ದಿನಗಳು

ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ : 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಿಂಪರಣೆ

ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3.ಸಿಂಪರಣೆಯಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇದಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ.7. ಅಲ್ಟ್ರಾ–ಲೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಪಿತ್ತೋದ್ರೇಕ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಭೇದಿ, ಉರಿ, ಅವಮಲು, ಡಿಸ್ಪೇನಿಯಾ, ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ದೂಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೊಯ್ಯಿರಿ, ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್‌ರನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ. 2. ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೂಷಿತ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನೀಡಿರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 4. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣುತೊಳೆಯಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ.

ಶೇಖರಣೆ: ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಇರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದಂತಾಗಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕದ ತೊಳೆತಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ತೊಳೆತಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಪ್ರದೂಷಣವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಉತ್ಪಾದಕರ, ಕೀಟನಾಶಕದ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮರು ಉಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹುಗಿಯಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. 2. ಉತ್ಪನ್ನದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 3.ಈ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:	**% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ**
ಥೈಫ್ಲುಝೂಮೈಡ್ ಸ. ಘ.	: 15.00
ಡೈಫೆನಾಕೊರ್ಝೋಲ್ ಸ. ಘ.	: 20.00
ಫುಲ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್	: 01.00
ಇಥೈಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್/ಪ್ರೊಪುಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಪೋಲಿಮರ್	: 02.50
ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್	: 02.00
ಗ್ಲೈಕಾಲ್	: 05.00
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಮಲ್ಶನ್	: 00.20
ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಮ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್	: 01.25
ಬೆಂಝಿಸೋಥಾಯಾಝೋಲಿನ್	: 00.20
ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	: 00.15
ನೀರು	: ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು	: 100.00

ಥೈಫ್ಲುజామైడ్ 15% +డైఫెనోకొనాజోల్ 20% ఎస్‌సి
(శిలీంధ్రనాశని)
(స్వదేశంలోనే తయారీ కోసం)

థైఫ్లుజామైడ్ 15%+డైఫెనోకొనాజోల్ 20% ఎస్‌సి కొన్ని రకాల శిలీంధ్రనాశనులయొక్క కలయికతో తయారుచేయబడినది, ఇది వరిపంటలను సర్వనాశనం చేసే బూడిదరంగు మచ్చ తెగులు, గోధుమరంగు మచ్చతెగులు, తప్పకంకి, మరియు గింజరంగు మారడం లాంటి తెగుళ్ళను అరికట్టుకై వాడబడుతుంది.

సిఫారసులు :

పంట	వ్యాధులు	హెక్టారుకు మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి కోతకాలం వరకూ వేచి వుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
		స.ప. (గ్రాముల్లో)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	నీటి పరిమాణం (లీటర్లు/ హెక్టారుకు)	
వరి	బూడిదరంగు మచ్చతెగులు, గోధుమరంగు మచ్చతెగులు, తప్పకంకి, మరియు గింజరంగు మారడం	37.5+50	250	500	27

వాడే విధానము : ఆకులపై జల్లుకోడం

వాడుటకు సూచనలు: థైఫ్లుజామైడ్ 15% + డైఫెనోకొనాజోల్ 20% ఎస్‌సి కొలిచిన పరిమాణంలో పైన పేర్కొన్న విధంగా నీటితో కరిగించిన తర్వాత వర్తించండి. స్ప్రే ద్రావణాన్ని తయారు చేయడం కోసం కొద్ది మొత్తంలో నీటితో కరిగించి, కర్రను ఉపయోగించి బాగా కదిలించండి. తరువాత అవసరమైన స్ప్రే వాల్యూమ్ ప్రకారం మిగిలిన పరిమాణంలో నీటిని జోడించండి మరియు కదిలించడం ద్వారా మళ్లీ బాగా కలపాలి.

వాతావరణ పరిస్థితులు: దీన్ని ఉదయం పూట లేదా సాయంకాల సమయాలలోనే పిచికారి చేసుకోవడం ఎంతైనా ఉత్తమం. బాగా గాలి వీచే లేదా వర్షం పడే అవకాశాలున్న వేళల్లో దీన్ని పిచికారి చేసుకోరాదు. వాతావరణం బాగా క్లియర్‌గానున్నప్పుడే పిచికారి చేసుకోవాలి.

నేల మరియు నీటి రకం : అన్ని రకాలు

దీని వాడకానికై పంటకుండాల్సిన దశ : మొక్కలు బాగా ఎదిగి గుబురుగానున్నప్పుడు/చిరు పొట్ట వేసినపుడు

వాడుకలో మెళుకువలు: కీటకాల ఉనికి పంటపై కనీ కనబడగానే, కావలిసినంత పరిమాణంలో పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి. అంతేగాక పంటంతా ఏకరీతిలో అలుముకుపోయేలా పిచికారి చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత కలదు.

పిచికారీకి వాడాల్సిన పరికరాలు : న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్

నాజిల్ రకం : హోల్‌కోన్ నాజిల్

మోతాదు : పైనివ్వబడిన పట్టీ ప్రకారంగా

కలుపుకోడానికి సూచనలు : స్ప్రేద్రావకాన్ని తయారుచేసుకోడానికి ముందు థైఫ్లుజామైడ్15%+డైఫెనోకొనాజోల్ 20% ఎస్‌సి లను కావల్సినంత పరిమాణంలో కొలతవేసి తీసుకొని అందు కొద్దిగా నీరుపోసి కర్ర లేదా కడ్డీ ఒకటి తీసుకొని బాగా కలపాలి.ఆతర్వాత మిగతా నీటిని అందు పోసి బాగా కలియబెట్టాలి.

వాడాల్సిన విధానము మరియు సమయము: ఫంగస్ అంటువ్యాధులను అరికట్టుట కోసం ఆకులపైనే పిచికారి చేయాలి.

తిరిగి జల్లుకోవలసిన సమయం : 48 గంటలు

ఉద్దేశ్యం : వ్యవసాయ రంగంలో వాడకం కోసమే

కోతకాలానికి ముందు అవధి: 27 రోజుల తర్వాత

ఎంత తరచుగా వాడాలి మరియు గరిష్టంగా ఎన్ని తడవలు వాడాలి : 15 రోజులు ఎడమిస్తూ 2 సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.

పంటలకు స్నేహపూర్వక కీటకాలు అంటే; తేనెటీగలు మరియు ప్రకృతి సహజంగా తెగుళ్ళకు హానిచేకూర్చే కీటకాలకు ఏవిధమైన హానికల్గకుండా తీసికోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు : తేనెటీగలు బాగా తిరిగే చోట మరియు ఆ సమయాలలో దీన్ని పిచికారి చేయరాదు.

మొక్కలపై విషప్రభావం: ఈ ఉత్పాదనను సిఫారసు చేయబడిన రీతిలో పిచికారి చేసినట్లయితే మొక్కలపై విషప్రభావం వుండదు.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ వంట సామగ్రి మరియు పశువుల దాణాలకు, మేతకు దూరంగా దీన్ని వుంచండి. 2. దీన్ని నోటికి, చర్మానికి అంటకుండా, కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. 3. స్ప్రే ద్రావకపు పొగమంచును పీల్చరాదు. పిచికారిని గాలివాటం చూసుకొనే పిచికారి చేసుకోవాలి. 4. కలుషితమైన బట్టల్ని, శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5. దీన్ని పిచికారి చేసుకొనేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, పొగ పీల్చడం, పొగాకు నమలడం లాంటి పనులేమీ చేయరాదు. 6. మిశ్రమాన్ని కలుపుకునేటప్పుడు మరియు పిచికారి చేసుకునేటప్పుడు పూర్తిగా రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి. ఏ ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషలక్షణాలనుబట్టి చికిత్స జరిపించాలి.7. స్ప్రే చేసుకోడానికి అల్ట్రా లో వాల్యూం వాడకూడదు.

ఔషధ చికిత్స: ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీలేదు. విషలక్షణాలనుబట్టి చికిత్స నివ్వాలి.

విషలక్షణాలు: వికారము, వాంతులవడం, కడుపులో నొప్పి, అతిసారము, చిరాకుగా వుండటం, మత్తుకల్గివుండటం, ఆయాసం, ఒకవేళ దీన్ని మ్రింగినట్లయితే గూని వచ్చినట్లు వుండటం.

ప్రథమచికిత్స : 1. ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్లయితే, వెంటనే రోగిని ఆరుబయటకు తరలించాలి, మరియు తనకు వెచ్చదనం కల్గించి విశ్రాంతి కల్గేలా చేయాలి. వెంటనే డాక్టర్‌గార్ని పిలవాలి. 2. ఒకవేళ చర్మానికి అంటినట్లయితే, వెంటనే కలుషితమైన శరీర భాగాలను సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. 3. ఒకవేళ దీన్ని మ్రింగినట్లయితే, నీళ్ళు కలిపిన మెడికల్ ఛార్‌కోల్ పట్టించాలి, అలాగే ఎక్కువ నీటిని త్రాగించాలి, వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. 4. కళ్ళు కలుషితమైతే, వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో 15 నిమిషాలపాటు కళ్ళు కడుక్కోవాలి. ఆ పిదప డాక్టర్‌గార్ని పిలవాలి.

నిల్వ : 1. శిలీంధ్రనాశినిగల ప్యాకేజీలను వాటి యొక్క ఒరిజినల్ ప్యాకెట్లలోనే వుంచి యితర పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలలో గాకుండా వాటి యొక్క నైజము మరియు పరిమాణాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించి మాత్రమే నిల్వ చేయాల్సి వుంది. 2. శిలీంధ్రనాశినిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడముల్లై, మంచి గాలీ, వెలుతురు ప్రసరించేలా విశాలంగా వుండి తీరాలి. తద్వారా దీని ఆవిరివలన పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

ఖాళీ ప్యాకెట్లను మిగిలిపోయిన మందు మరియు స్ప్రే పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని పారవేయు విధానము:1. ఖాళీ ప్యాకెట్లను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరికరాలను కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త వహిస్తూ పారవేసుకోవాలి. అందుకుగానూ దీన్ని నిర్వహించేవారు, తయారు చేయువారు మరియు ఫార్ములేటర్లు భాద్యత వహించాలి. మరిముఖ్యంగా పరిసరాలు, నీరు, నీటి వొనరులు కలుషితం కాకుండా వీరందరూ భాద్యత వహించాలి. 2. ఖాళీ ప్యాకెట్లను తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడరాదు గనుక వాటినలా బయట వదిలేయరాదు. 3. ఖాళీ ప్యాకెట్లను పగులకొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

హెచ్చరిక :1) ఈ ఉత్పాదనను కరపత్రం మరియు లేబుల్‌లో సూచించబడిన పంటలకు మాత్రమే తప్ప, ఇతర పంటలకు మరే ఉద్దేశ్యంతో నైనా వాడరాదు. 2) ఈ కరపత్రంలో ఇవ్వబడిన సూచనలననుసరించి ఖాళీ డబ్బాలను నాశనం చేయాలి. 3)ఈ ఉత్పాదనను చేపలపెంపకపు కేంద్రాల దగ్గర్లో గానీ మరియు తేనెటీగలు బాగా తిరిగే చోట వాడరాదని గుర్తుంచుకోండి. అంతేగాక, దీన్ని నీటి వొనరులు గల ప్రాంతాల చుట్టుపక్కల ఎక్కడా వాడరాదు.

రసాయనిక మిశ్రమము :	**% డబ్ల్యు/ డబ్ల్యు**
థైఫ్లుజామైడ్ స.ప.:	15.00
డైఫెనోకొనాజోల్ స.ప.:	20.00
ఫుల్విక్ ఆసిడ్:	01.00
ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్ /ప్రొపిలీన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమార్:	02.50
సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫొనేట్ కండెన్సేట్:	02.00
గ్లకోల్ :	05.00
సిలికాన్ ఎమల్షన్:	00.20
అల్యూమినియం మెగ్నీసియం సిలికేట్:	01.25
బెంజిసోథియాజోలైన్:	00.20
గ్జాంతమ్ గమ్:	00.15
నీరు	: తయారీకి చాలినంత
మొత్తం	: 100.00

திஃப்ளுஜாமைட் 15% + டிஃபினோகோனஜோல் 20% எஸ்சி
(பூஞ்சாணக்கொல்லி)
(உள்ளூர் தயாரிப்பிற்கானது)

திஃப்ளுஜாமைட் 15% + டிஃபினோகோனஜோல் 20% எஸ்சி கூட்டு தயாரிப்பான இந்த பூஞ்சாணக்கொல்லி நெற்பயிரைத் தாக்கும் இலையறைக் கருகல் நோய், பழுப்பு புள்ளி, நெற்பழம் மற்றும் வண்ண மாற்றம் ஆகியவற்றைத் தடுத்து கட்டுப்படுத்த உதவும்.

சிபாரிசு :

பயிர்கள்	நோயின் பொதுப் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு			அளவு கடைசி அறுவடை-வரை காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	தயாரிப்பு (மிலி)	தண்ணீர் அளவு (லிட்/ ஹெக்டேர்)	
நெற்பயிர்	இலையுறைக் கருகல், பழுப்பு புள்ளி, நெற்பழம் மற்றும் வண்ண மாற்றம்	37.5+50	250	500	27

பயன்படுத்தும் றை: இலை தெளிப்பு.

பயன்படுத்தும் விதம்: பயன்படுத்தத் தயாராகக் கிடைக்கும் திஃப்ளுஜாமைட் 15% + டிஃபினோகோனஜோல் 20% எஸ்சி மருந்தை போதிய அளவில் எடுத்து தண்ணீரில் கலந்து கரைசலைத் தயாரித்து கைகளால் செயல்படும் நாப்சாக் ஸ்பிரேயரைக் கொண்டு தெளிக்க வேண்டும்.

வானிலை நிலவரம்: பொதுவாகக் காலை அல்லது மாலை நேரத்தில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். பலமாகக் காற்று வீசும் போதும், மழை பெய்யும் வாய்ப்பு இருக்கும் போதும் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது, வானம் தெளிவாக இருக்கும் போது மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

நிலம் மற்றும் நீர் வகை: அனைத்து வகையானவை

மருந்து தெளிப்பும் பயிர் பருவம்: தழைப் பருவம் / ஆரம்ப இனப்பெருக்கப் பருவம்

மருந்து தெளிக்கும் றை: பயிர்களில் பூச்சிகள் மொய்ப்பு தெரிய வந்தவுடன் தேவைப்படுவது போல் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும் மருந்தை ஒரே சீராக பயிர்கள் மீது தெளிக்க வேண்டும்.

கருவி வகை: நாப்சாக் ஸ்பிரேயர்

கூம்பு வகை: வெற்று கூம்பு னை.

மருந்தளவு; மேலே அட்டவணையில் கொடுத்திருப்பதைப் போல்.

மருந்து தயாரிக்கும் குறிப்புகள்: தேவையான அளவு திஃப்ளுஜாமைட் 15% + டிஃபினோகோனஜோல் 20% எஸ்சி மருந்தை சிறிதளவு நீரில் கலந்து ஒரு குச்சியால் நன்றாகக் கலந்து கொடுக்க வேண்டும். அதனுடன், மீதமிருக்கும் நீரையும் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கி தெளிப்பு கரைசலைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

தெளிக்கும் முறையும் காலமும்: பூஞ்சாணம் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் இலைதெளிப்பு செய்ய வேண்டும்.

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: 48 மணி நேரம்

நோக்கம்: வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்.

அறுவடைக்கு ந்தைய இடைவெளி : 27 நாட்கள்.

தெளிப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் அதிக பட்ச தெளிக்கும் தடவைகள்: 2 தெளிப்புகள் 15 நாட்கள் இடைவெளியில்.

நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் தீம்பூச்சிகளை வேட்டையாடும் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாதிருக்க தேவைப்படும் முன்னெச்சரிக்கைகள்: தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

தாவரங்களுக்கு விஷத்தன்மை: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் இது பயிர்களுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாது.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவு பண்டங்கள், வெற்று உணவு பாத்திரங்கள் மற்றும் கால் நடைகளுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாயிலும், கண்களிலும் மற்றும் சருமத்திலும் படுவதை தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு சாறலை உட்சுவாசிக்கக் கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளிப்பு முடிந்த பின் மாசுபட்ட ஆடைகளையும், உடல் பாகங்களையும் நன்றாக கழுவவும். 5. மருந்தடிக்கும்போது, புகை பிடிக்கவோ, பருகவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது. 6. கலவை தயாரிக்கும் போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும்.7. இதை மிகக் குறைந்த அளவில் தெளிக்கக் கூடாது.

நச்சு முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும்.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: மருந்தைக் விழுங்கியிருந்தால், குமட்டல், வாந்தி, வயிற்று வலி, பயிற்றுப்போக்கு, உறுத்தல், மயக்கு உணர்வு, மூச்சுத் திணறல் மற்றும் முதுகு குனிந்திருக்கும் நிலைமை ஏற்படக்கூடும்.

முதலுதவி: 1. சுவாசித்திருந்தால், நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துக் சென்று உடன் வெப்பம் குறையாமல் ஓய்வு எடுக்கச் செய்ய வேண்டும். மருத்துவரை அழைக்கவும். 2. மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால், நிறைய சோப்பு போட்டு நன்றாக குளித்து சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். 3. விழுங்கியிருந்தால், நிறைய அளவு மருத்துவ கரியை நிறைய குடிநீரில் கலந்து குடிக்கச் செய்ய வேண்டும். தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும். 4. மருந்து கண்களில் தெளித்திருந்தால், நிறைய தண்ணீரை கண்களில் அறைந்து குறைந்தது 15 நிமிட நேரத்திற்கு சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும், மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும்.

சேமிப்பிற்கான :1.பூச்சிக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை பிறப் பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அறைகளில் அல்லது தனி அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். 2.பூச்சிக்கொல்லி யின் சேமிப்பு அறை நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்ததாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, களைக்கொல்லியின் ஆவியினால் மாசு ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். உபயோகித்த பேக்கேஜ்கள், எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் களைக்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன்கள், எஞ்சிய மருந்து மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி கழுவுநீரை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்களைக் கழுவிய நீர் போன்றவற்றை சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசு படுவதைத் தவிர்க்க பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப் படுத்துவது தயாரிப்பாளர்கள், பூசணக்கொல்லி கலப்பவர்கள் மற்றும் தெளிப்பவர்களின் கடமை. 2. பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அவை வெளியில் விட்டுவைக்கப்படக் கூடாது. 3. காலி கொள்கலன்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: 1. இந்த லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது தெளிக்கக் கூடாது. 2.கையேட்டிலுள்ள குறிப்புகளைப் பின்பற்றி கொள்கலன்களை அழித்துவிடவும். 3. மீன் வளர்ப்பு இடங்களிலும், தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் போதும், மருந்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் இத் தயாரிப்பு பயன்படுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்.

இரசாயனச் சேர்க்கை:	**(% எ/எ)**
திஃப்ளுஜமைட் ஏ.ஐ. :	15.00
டையஃபெனொகோனஜோல் ஏ.ஐ.:	20.00
ஃபுல்விக் ஆசிட் :	01.00
இதைலின் ஆக்ஸைட் - புரொபைலின் ஆக்ஸைட் பிளாக் கோபாலிமர் :	02.50
சோடியம் சால்ட் ஆஃப் நஃப்தலீன் சல்ஃபொனேட் கண்டென்சேட்:	02.00
கிளைகோல்:	05.00
சிலிகான் எமல்ஷன்	00.20
அலுமினியம் மேக்னிசியம் சிலிகேட்:	01.25
பென்ஜிசோதியாஜொலைன்:	00.20
க்ஸாந்தன் கம்	00.15
வாட்டர்:	கி.கு.
மொத்தம்:	100.00

থাইফ্লুজামাইড ১৫% + ডাইফেনোকোনাজল ২০% এসসি
(ছত্রাকনাশক)
(স্বদেশী নির্মাণের জন্য)

থাইফ্লুজামাইড ১৫% + ডাইফেনোকোনাজল ২০% এসসি খোলা ধ্বসা, বাদামি দাগ, ভুষো রোগ বা লক্ষ্মীর গু এবং দানার বিবর্ণতার রোগের নিয়ন্ত্রণের জন্য ছত্রাকনাশকের একটি সংমিশ্রণ পণ্য।

সুপাছরশ:

ফসল	রোগের চলতি নাম	হেক্টর প্রতি মাত্রা			শেষ প্রয়োগ থেকে ফসল কাটার সময় পর্যন্ত অপেক্ষার সময়
		এ.আই. (গ্রাম)	গঠন (মিঃলিঃ)	জলে (লিটার/হে)	
ধান	খোলা ধ্বসা, বাদামি দাগ, ভুষো রোগ বা লক্ষ্মীর গু এবং দানার বিবর্ণতা	৩৭.৫+৫০	২৫০	৫০০	২৭

প্রয়োগের পদ্ধতি: পাতার উপর স্প্রে

ব্যবহারের নির্দেশাবলী: থাইফ্লু জামাইড ১৫% + ডাইফেনোকোনাজল ২০% এসসি রাসায়নিকের প্রয়োজনীয় মাত্রা জলে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে এবং হস্ত চালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে স্প্রে করতে হবে যেমনটি সুপারিশের অন্তর্গত বলা হয়েছে।

আবহাওয়া পরিস্থিতি: বিশেষভাবে সকাল অথবা বিকালবেলায় প্রয়োগ করা উচিৎ। জোরালো হাওয়া এবং বর্ষায় প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। পরিষ্কার আবহাওয়া পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করুন।

মাটি এবং জলের প্রকার: সমস্ত প্রকার।

প্রয়োগের জন্য ফসলের দশা: অঙ্গজ দশা প্রাথমিক প্রজনন দশা।

প্রয়োগ পদ্ধতি: কীটের উপদ্রব আরম্ভ হওয়া মাত্রই প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের উপর স্প্রে করুন। ফসলের উপর সমান স্প্রে নিশ্চিত করুন।

সরঞ্জামের প্রকার: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার।

নজলের প্রকার: হলো কোন নজল।

মাত্রা: উপরে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

মিশ্রণের জন্য নির্দেশ: স্প্রে দ্রবণ তৈরি করার জন্য থাইফ্লুজামাইড ১৫% + ডাইফেনোকোনাজল ২০% এসসি মাপা পরিমাণ অল্প জলে মেশিয়ে তরল করুন এবং স্টিক দিয়ে ভালো করে গুলে নিন। তারপর অবিশিষ্ট জল প্রয়োজনীয় পরিমাণের স্প্রে দ্রবণে মেশান এবং ভালো করে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিন।

পদ্ধতি এবং প্রয়োগের সময় : ছত্রাকের উপদ্রবে (সংক্রমণ) পাতার উপর স্প্রে করুন।

পুনঃ প্রবেশ: ৪৮ ঘণ্টা

উদ্দেশ্য: কৃষিকাজের জন্য।

ফসল কাটার পূর্বে সময়কাল: ২৭ দিন।

প্রয়োগের সর্বোচ্চ সংখ্যা সহ প্রয়োগের ব্যবধান: ১৫ দিনের ব্যবধানে ২ বার স্প্রে।

লাভজনক কীট যেমন মৌমাছি এবং ক্ষতিকর কীটের প্রাকৃতিক শত্রুর ক্ষতি এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে : মৌমাছিদের খাদ্যসংগ্রহের জন্য সক্রিয় সময়কালে স্প্রে করবেন না।

বিষাক্ততা: ক্ষেতের সুপারিশ অনুযায়ি ব্যবহৃতের ক্ষেত্রে উৎপাদনটি বিষাক্ত নয়।

সুরক্ষামূলক সতর্কতা: ১) খাদ্যপদার্থ, খালি খাদ্যপাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২) মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়ান। ৩) স্প্রে-কণার শ্বাসে যাওয়া এড়ান। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করুন। ৪) স্প্রে করার পর দূষিত পোশাক ও দেহাংশ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ৫) স্প্রে করার সময় কোনকিছু ধূমপান, পানীয় পান, খাওয়া ও চেবানো নিষেধ। ৬) মেশানো এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন। ৭. আল্ট্রা - লো ভলিউম স্প্রে হিসাবে ব্যবহার করবেন না।

প্রতিষেধক: কোনও সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

বিষক্রিয়ার উপসর্গ: বমিভাব, বমি হওয়া, পেতে ব্যাথা, ডায়রিয়া, চুলকানি, গিলে ফেললে জ্বালা, অবসাদ, শ্বাসকষ্ট এবং কুঁকড়ে থাকা ভঙ্গি।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ১. যদি নিঃশ্বাসে চলে যায়, বিষের থেকে ব্যক্তিকে দূরত্বে নিয়ে যান, রোগীকে উষ্ণ এবং আরামে রাখুন। ২. যদি ত্বকের সংস্পর্শে এলে, অবিলম্বে ত্বক সাবান এবং জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া ফেলুন। ৩. যদি খেয়ে ফেলে, রোগীকে প্রচুর জলের সঙ্গে অনেকখানি মেডিকাল চারকোল দিন। অবিলম্বে একজন ডাক্তার দেখান। ৪. যদি চোখের সংস্পর্শে আসে, অবিলম্বে কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ডাক্তার ডাকুন।

মজুতকরণ : ১) কীটনাশকে সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে বা আগাছানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তালা বন্ধঅবস্থায় পৃথক আলমারিতে রাখতে হবে। ২) কীটনাশকে মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হতে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআচ্ছাদিত এবং বাতায়িত তথা আগাছানাশকের বাষ্পতার দ্বারা পরিবেশের সংক্রমণ হওয়া এড়াতে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

কীটনাশকের ব্যবহৃত প্যাকেজ, উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং তরলাদির বিনষ্টি করণ: ১) উৎপাদের নির্মাতা, ফর্মূলাকারী এবং অপারেটরের দায়িত্ব যে প্যাক বা উদ্বৃত্ত পদার্থ তথা মেশিন এবং পাত্রাদি ধোয়নি তরল এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতেই হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২) ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩) প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

সতর্কতামূলক বিবৃতি: ১. লেবেল লিফ্লেটে নির্দেশিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাবে না। ২. ব্যবহারের পর লিফলেটের নির্দেশ অনুযায়ী পাত্রগুলির নিস্পত্তি করুন। ৩) জলজ চাষের নিকট এবং মৌমাছিদের উপস্থিতিতে এই পণ্য ব্যবহার করবেন না। জলাশযের কাছে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

রাসায়নিক গঠন :	**% ওজন/ওজন**
থাইফ্লুজামাইড সক্রিয় উপাদান :	১৫.০০
ডাইফেনোকোনাজল সক্রিয় উপাদান:	২০.০০
ফুল্‌ভিক অ্যাসিড :	০১.০০
এথিলিন অক্সাইড প্রপিলিন অক্সাইড ব্লক কোপলিমার:	০২.৫০
ন্যাপথলিন সালফোনেট কনডেনসেটের সোডিয়াম সল্ট:	০২.০০
গ্লাইকল:	০৫.০০
সিলিকন ইমালশন:	০০.২০
অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট:	০১.২৫
বেঞ্জিসথিয়াজোলিন:	০০.২০
জ্যান্থাম গাম :	০০.১৫
জল :	কিউ.এস.
মোট :	১০০.০০

AgroStar®

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE
इस्तेमाल से पहले पूरा पर्चा पढ़ें ।
For Agriculture Use. कृषि उपयोग के लिए ।
SHAKE THE BOTTLE BEFORE USE.
इस्तेमाल के पहले बोतल को अच्छी तरह हिलायें ।

RULE

THIFLUZAMIDE 15% + DIFENOCONAZOLE 20% SC
(Fungicide)
(For Indigenous Manufacture)

रूल

थायफ्लूज़ामाईड १५% + डायफेनोकोनाज़ोल २०% एससी
(फफूंदीनाशक)
(स्वदेशी उत्पाद के लिए)

Marketed by:
Ulink Agritech Private Limited,
Regd. Office:
106 (B&C), 6th Floor,
E-Space IT Park,
A1 Building, 46/1 Nagar Road,
Pune (MH) – 411014.

विपणनकर्ता:
यूलिंक एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय:
106 (बी एंड सी), छठी मंजिल,
ई-स्पेस आईटी पार्क,
ए 1 बिल्डिंग, 46/1, नगर रोड,
पुणे (महाराष्ट्र) - 411014.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Manufactured by: GSP Crop Science Pvt.Ltd.,
Regd. Office : 404, Lalita Complex, 352/3 Rasala Road,Navrangpura, Ahmedabad- 380 009, Gujarat.
Factory : 551, phase-II, G.I.D.C. Estate, Kathwada, Opp. Odhav Octroi naka, Ahmedabad-382430. Gujarat.

निर्माता : जी.एस.पी. क्रॉप सायन्स प्रा. लि.,
रजि ऑफिस : ४०४, ललिता कॉम्पलेक्स, ३५२/३ रसाला रोड, नवरंगपूरा, अहमदाबाद – ३८० ००९, गुजरात।
फेक्टरी : ५५१, फेज–२, जी.आई.डी.सी. एस्टेट, कठवाडा, ओढव ओक्ट्रोय नाका, अहमदाबाद– ३८२४३०, गुजरात।

ઉત્પાદક : જીએસપી ક્રોપ સાયન્સ પ્રા. લિ.,
રજિ.ઓફિસ:૪૦૪,લલિતા કોમ્પલેક્સ, ૩૫૨/૩, રસાલા રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯, ગુજરાત.
ફેક્ટરી : ૫૫૧, ફેઝ-II, જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ, કઠવાડા, ઓઢવ ઓક્ટ્રોય નાકા સામે, અમદાવાદ-૩૮૨૪૩૦, ગુજરાત.



Size : 375mm X 275mm