AgroStar®

SHUTTER®

Thiamethoxam 75% w/w SG
(Insecticide)

शटर

थायामेथोक्साम 75% भा./भा. एस.जी.
(कीटनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Thiamethoxam 75% w/w SG
(Insecticide)

Thiamethoxam 75% w/w SG is a broad spectrum systemic insecticide, recommended for its use to control termites in Groundnut, Termite & Early shoot borer in sugarcane, Greenleaf hopper & brown plant hopper in rice and Jassids & thrips in cotton crop.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dose per hectare		Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest	Re-entry after each Application (In Hours)
		A.I	Formulation			
Cotton	Jassids & Thrips	94	125	50□100 ml / plant	109	□
Groundnut	Termite	94	125	500□1000	57	□
Rice	Green leaf hopper and Brown plant hopper	113	150	Dissolve in 500 ml water and mix with 20 kg sand/h	60	□
Sugarcane	Termite & Early shoot borer	120	160	500□1000	230	□

Direction Of Use
Direction for use in Groundnut, Sugarcane & cotton: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation and apply as soil drenching in crops. Direction for use in Rice: Measure out required quantity of the product and dissolve in 500ml of water to make solution for mixing and broadcasting with sand @20 kg/ha.

Time of Application
It contain 750 g Thiamethoxam as an active ingredient in one kg of the product.

Precautions
Do not use cooking utensils for preparing solutions. Use sticks for stirring the solution. Wear gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while preparing the solution. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not allow drifting onto rivers, lakes, ponds ditches or other waterways. Do not allow discharging left over applied material or empty containers to contaminated waterways. The product should not be applied during flowering of the crop. Do not use the product where bees are actively foraging. Do not allow drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. Do not apply if a high amount of aphids honeydew is present in the treatment area. Do not apply on flowering crops between 5 days before start of flowering and 5 days after flowering. In case of any sign of poisoning immediately consult the doctor.

Symptoms Of Poisoning
Poisoning may cause symptoms of decrease in spontaneous movement, toxic to convulsion and ptosis.

First Aid
Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated rooms or to fresh air and protect from undercooling. In case of suspected poisoning: Immediately call a physician. In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. In case of ingestion: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Phytotoxicity : Refer to CIB Guidelines

Antidote
No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal Of Used Container
1. Packages or surplus material and washings from the machines and container should be disposed off in a safer manner so as to prevent environment pollution.
2. The used packages shall be not left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions
1. The packages containing the insecticides should be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, particularly, food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapors."

Chemical Composition

S. No.	Ingredient	Description	Weight
1	Thiamethoxam a.i.	□	75.0 % w/w
2	Wetting and dispersing agents :		
3	Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate	□	1.5 % w/w
4	Sodium alkyl naphthalene sulfonate	□	1.0 % w/w
5	Antifoam :		
6	Silicone oil (polydimethylsiloxane)	□	0.5 % w/w
7	Carriers :		
8	Urea, polymer with formaldehyde	□	0.5 % w/w
9	Starch	□	4.0 % w/w
10	Lactose anhydrous	□	Q.S. %
	Total		100.00 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

थायामेथोक्साम 75% भा./भा. एस.जी.
(कीटनाशक)

थायामेथोक्साम 75% भार/भार एस.जी. एक बहुआयामी अंतरप्रवाही कीटनाशक है। इसकी सिफारिश मूंगफली की फसल पर लगने वाली दीमक, गन्ने में दीमक तथा अगेती एवं भेदक, धान में हरा पत्ती टिड्डा तथा भूरा टिड्डा और कपास में तेला तथा चुरदा की रोकथाम के लिए की जाती है।"

उपयोग

फसल	कीट का नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (घंटे)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येकछिड़काव के बाद (घंटे)
		सक्रिय तत्व	संरचना			
कपास	तेला तथा चुर्दा	94	125	50□100 मि.ली.प्रति पौधा	109	□
मूंगफली	दीमक	94	125	500□1000 लीटर	57	□
धान	हरा पत्ती टिड्डा, भूरा पत्ती टिड्डा	113	150	500 मि.ली. पानी में घोलकर और 20 किलोग्राम रेत में मिलाएँ	60	□
गन्ना	दीमक तथा अगेती तना भेदक	120	160	500□1000 लीटर	230	□

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
मूंगफली, गन्ने तथा कपास में प्रयोग के लिए निर्देश: उत्पाद की आवश्यक मात्रा को नाप लीजिए और उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिला लीजिए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह हिलाकर मिला लीजिए और फिर फसलों की मिट्टी को भिगोएँ। धान में प्रयोग के लिए निर्देश: उत्पाद की आवश्यक मात्रा को नाप लें और 500 मि.ली. पानी के साथ घोल बना लें तथा घोल को 20 किग्रा. प्रति हेक्टेयर रेत में मिलाकर छिड़काव करें। कीटनाशकों वाले पैकेटों को उनके मूल कंटेनर में ही संग्रहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अन्य वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों के भंडारण हेतु उपयोग किए जाने वाले कमरों या परिसरों से अलग कमरों या परिसरों में रखा जाना चाहिए। अथवा इन्हें ताले-चाबी से बंद अलग अलमारियों में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कीटनाशकों के भंडारण हेतु निर्धारित कमरे या परिसर स्वच्छ, शुष्क, पर्याप्त रूप से प्रकाशित तथा हवादार होने चाहिए और उनका आकार इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वाष्पों से किसी प्रकार का संदूषण न हो।

प्रयोग का समय
इसमें उत्पाद के प्रति किलो भार/भार में 750 ग्राम थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ
घोल तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। त्वचा से स्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अंदर लेने और आँखों से संपर्क से भी बचें। घोल बनाते समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, चश्मा, बूट्स आदि पहनें। नोज़ल्स में मुँह से फूंक न मारें। उठाते, रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बाकी घोल का भंडारण न करें। प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियाँ तथा बर्तनों को पानी से धोएँ। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर सारे पानी से धोइए। हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष को नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल संग्रहण क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होने दें। शेष बचे पदार्थ का निस्तारण एवं खाली कास्तरों द्वारा जलाशयों को प्रदूषित होने से बचाएँ। फसल पर फूल आने की अवस्था पर इस्तेमाल न करें। मधुमक्खियों के सक्रिय समय पर इस्तेमाल न करें। उपचारित क्षेत्र के नजदीकी फूलवाली फसलें, खरपतवार (फूल की अवस्था) एवं झाड़ियों को हवा द्वारा फैलने वाले छिड़काव के अवशेष से प्रभावित न होने दें। माहू द्वारा विकसित अत्यधिक शहद वाले फसल क्षेत्र उपचारित न करें। फूल वाली फसलों में फूल आने के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक इस्तेमाल न करें।
यदि विष चढ़ने का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

विष के लक्षण
विष के लक्षणों से शरीर में ढीलापन, मिर्गी जैसे झटके और टोसिस हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा
प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरों या खुली हवा में ले जाएँ और तापमान से बचाएँ। विषबाधा के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक को बुलाइए। त्वचा पर लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। आँखों में चले जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह धोएँ। निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार-बार दें।
सूचना: कभी भी मूर्छित मरीज को मुँह से कुछ भी न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविषाक्तता
सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

विषनाशक
कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल/पदार्थ, मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेटों को वैसे ही बाहर न छोड़ दें। इस प्रकार उनका दोबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
3. पैकेटों/डिब्बों को तोड़-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें
1. कीटनाशक के डिब्बे अन्य सामग्री, विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला-बंद अलमारियों में रखना चाहिए।
2. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी, प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सके।"

रासायनिक संरचना

क्रम संख्या	घटक	विवरण	भार
1	थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	□	75.0 % भार/भार
2	गीले और छितरानेवाले तत्व :		
3	सोडियम एन-मिथाइल-एन □ औलयो टाओरेट	□	1.5 % भार/भार
4	सोडियम अलकायल नेप्थालिन सलफोनेट	□	1.0 % भार/भार
5	एनटीफाम :		
6	सिलिकॉन आयल (पौलीडाईमिथाइलसिलोक्सेन)	□	0.5 % भार/भार
7	संवाहक:		
8	यूरिया, पॉलीमर, एवं फौरमेलडीहाइड	□	0.5 % भार/भार
9	स्टार्च	□	4.0 % भार/भार
10	लैकटोज इनहाईड्रोस	□	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
	कुल		100.00 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

थायामेथोक्सॅम 75% भा./भा. एस.जी.
(कीटकनाशक)

थायामेथोक्सॅम 75% भार/भार एस.जी. हा एक बहुआयामी अंत:प्रवाही कीटकनाशक आहे. याची शिफारस मूगफलीच्या पिकावर लागणाऱ्या सुक्या, गव्हावर सुक्या आणि अगेती तसेच भेदक, तांदुळात हिरा पान तिड्डा आणि भुर्या तिड्ड्यासाठी तसेच कपाशीमध्ये तेला आणि चुरदा यांना प्रतिबंध करण्यासाठी केली जाते.

शिफारस

पीक	किडीचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण	शेवटची फवारणी व कापणीतील अंतर (तास)	पुन्हा प्रवेश कालावधी (तास)
		स. द्रव्य	संरचना			
कापूस	मावा व तुडतुडे	94	125	प्रति रोप 50□100 मि.ली.	109	□
भुईमूग	वाळवी	94	125	500□1000	57	□
भात	हिरवा तुडतुडा, तपकिरी तुडतुडा	113	150	500 मि.ली. पाण्यात मिसळून 20 कि.ग्रॅ. वाळूत मिसळावे	60	□
ऊस	वाळवी व सुरुवातीचा खोड पोखरणारा किड	120	160	500□1000	230	□

उपयोगासाठी दिशा-निर्देश
मूगफली, गहू आणि कपाशीमध्ये उपयोगासाठी निर्देश:
उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोड्या पाण्यात चांगले मिसळा. निर्धारित मात्रेचे बाकीचे पाणीही चांगले हलवत मिसळा आणि नंतर पिकाच्या मातीला भिजवा. तांदुळात वापरण्यासाठी निर्देश: उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि 500 मि.ली. पाण्यात घालून मिश्रण तयार करा, आणि मिश्रण 20 किग्रा. प्रती हेक्टर वाळूत मिसळून छिडकाव करा. कीटकनाशकांच्या पॅकेट्स त्यांच्या मूळ कंटेनरमध्ये संग्रहित करावेत आणि इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थांच्या संग्रहणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसरांपासून वेगळ्या खोल्या किंवा परिसरांमध्ये ठेवावेत. किंवा त्यांना ताळा-चाबीने बंद केलेल्या वेगळ्या अलमारीत सुरक्षित ठेवावे.
कीटकनाशकांच्या संग्रहासाठी निश्चित केलेले खोल्या किंवा परिसर स्वच्छ, कोरडे, पुरेशी प्रकाशीत आणि हवादार असावेत, आणि त्याचा आकार इतका पुरेसा असावा की वाफेद्वारे कोणताही प्रदूषण होऊ नये.

प्रयोगाचा वेळ
यामध्ये उत्पादन प्रति किलो भार/भार 750 ग्रॅम थायामेथोक्सॅम सक्रिय घटक म्हणून आहे.

प्रयोगकर्त्यांसाठी दक्षता
घोल तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाच्या भांड्यांचा वापर करु नका. घोल हलवण्यासाठी लाकडाचा वापर करा. त्वचेच्या संपर्कापासून बचावासाठी हातमोजे घाला. श्वासाद्वारे घोल आत जाण्यापासून आणि डोळ्यांच्या संपर्कापासूनही बचाव करा. घोल बनवताना संरक्षणात्मक कपडे जसे की मास्क, चष्मा, बूट्स इ. वापरा. नोजलमध्ये तोंड फुंकू नका. उचलताना, ठेवताना किंवा वापरताना खाणे, पिणे किंवा धूम्रपान करणे टाळा. बाकी घोल संग्रहित करु नका. दररोज वापरानंतर स्प्रेयर, बकेट आणि भांड्यांना पाण्याने स्वच्छ धुवा. कार्य पूर्ण झाल्यावर हात साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. हवेद्वारे पसरलेल्या छिडकावाचे अवशेष नद्या, जलसाठा, तळे आणि इतर जलसंग्रहण क्षेत्रावर परिणाम होऊ देऊ नका. बाकी राहिलेला पदार्थ सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करा आणि रिकाम्या कंटेनरद्वारे जलसंग्रहणाचे प्रदूषण टाळा. फुलांच्या अवस्थेत असलेल्या पिकावर वापरु नका. मधमाश्या सक्रिय असताना वापरु नका. उपचारित क्षेत्राजवळील फुलांनी भरलेली पिके, फुलांमध्ये असलेले गवत आणि झाडे हवेद्वारे पसरलेल्या छिडकावामुळे प्रभावित होऊ देऊ नका. अत्याधिक मध तयार होणाऱ्या पिकावर उपचार करु नका. फुलांनी भरलेल्या पिकांमध्ये फुल येण्याच्या 5 दिवस आधी आणि 5 दिवस नंतर फुलांची अवस्था पूर्ण होईपर्यंत वापरु नका.
जर विषाचा कोणताही लक्षण दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

विषाची लक्षणे
विषाच्या लक्षणांमुळे शारीरिक हालचाल कमी होणे, मिर्गीसारखे झटके आणि टोसिस होऊ शकतात.

प्राथमिक उपचार
प्रभावित व्यक्तीला प्रदूषित जागेतून हवादार खोली किंवा खुल्या हवेत घेऊन जा आणि तापमानापासून बचाव करा. विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेवर लागल्यास: प्रदूषित कपडे काढा आणि प्रभावित भाग साबण व पाण्याने चांगले धुवा. डोळ्यांत गेल्यास: डोळे काही वेळ स्वच्छ पाण्याने चांगले धुवा. गिळल्यास: पाण्यात औषधी चारकोल भरपूर प्रमाणात घालून वारंवार द्या.
सूचना: कधीही बेहोश झालेल्या रुग्णाला तोंडाने काहीही देऊ नका. उलटी करायचा प्रयत्न करु नका.

पिकावर विषारी प्रभाव
सी.आय.बी. मार्गदर्शनानुसार वापरा.

विषनाशक
कोणताही विशेष प्रतिविष नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांचे निपटारा
1. पर्यावरणीय प्रदूषण टाळण्यासाठी डब्बे, उरलेले घोल/साहित्य, मशीन धुवायचे पाणी आणि रिकाम्या डब्यांचा निपटारा सुरक्षित ठिकाणी करा.
2. वापरलेले डब्बे/पॅकेट बाहेर ठेवू नका. अशा प्रकारे त्यांचा पुन्हा वापर टाळता येतो.
3. पॅकेट्स/डब्बे तोडून-फोडून लोकवस्तीपासून दूर जमीन मध्ये गाडावे.

संग्रहणाच्या अटी
1. कीटकनाशकाचे डब्बे इतर साहित्य, विशेषत: अन्नसाहित्य संग्रहणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा इमारतीपासून दूर अलमारीत किंवा ताळेबंद केलेल्या वेगळ्या जागेत ठेवावेत.
2. कीटकनाशक संग्रहित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या/इमारती मजबूत, कोरड्या, प्रकाशमान, हवादार असाव्यात आणि पुरेशी जागा असावी, जेणेकरुन वाफेद्वारे कोणतेही प्रदूषण होऊ नये."

रासायनिक संघटन

अनुक्रमांक	घटक	वर्णन	वजन
1	थायमेथॉक्साम (सक्रिय घटक)	□	75.0 % वजन/वजन
2	वेटिंग व डिस्परसिंग एजंट्स		
3	सोडियम एन-मेथिल-एन-ओलिओयल टॉरेट	□	1.5 % वजन/वजन
4	सोडियम अल्किल नॅफ्थलीन सल्फोनेट	□	1.0 % वजन/वजन
5	अँटीफोम		
6	सिलिकॉन तेल (पॉलीडायमेथिलसिलोक्सेन)	□	0.5 % वजन/वजन
7	वाहक द्रव्ये		
8	युरिया, फॉर्मल्डिहाइडसह पॉलिमर	□	0.5 % वजन/वजन
9	स्टार्च	□	4.0 % वजन/वजन
10	लॅक्टोज (निर्जल)	□	आवश्यक प्रमाण
	एकूण		100.00 % वजन/वजन

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

થાયામેથોક્સામ 75% ભા./ભા. એસ.જી.
(કીટકનાશક)

"થાયામેથોક્સામ 75% ભાર/ભાર એસ.જી. એક બહુમુખી આંત:પ્રવાહી કીટકનાશક છે. તેની ભલામણ મુંગફળીની પાક પર લાગનારી દીમક, ગાંધમાં દીમક તથા આગેટી તેમજ ભેદક, ચોખામાં લીલો પાન તીડ્ડા અને ભૂરો તીડ્ડા અને કપાસમાં તેળા અને ચુરદા રોકવા માટે કરવામાં આવે છે.

ભલામણ

પાક	જીવાતનું નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા		પાણીની માત્રા	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી વચ્ચેનું અંતર (કલાક)	પુનઃ પ્રવેશ અવધિ (કલાક)
		સક્રિય દ્રવ્ય	ફોર્મ્યુલેશન			
કપાસ	મહૂં અને તુડતુડા	94	125	પ્રતિ છોડ 50□100 મિ.લી.	109	□
મગફળી	દીમક	94	125	500□1000	57	□
ધાન	લીલો તુડતુડો, ભૂરો તુડતુડો	113	150	500 મિ.લી. પાણીમાં ઘોળીને 20 કિ.ગ્રા. રેતીમાં ભેળવો	60	□
ઊંસ	દીમક તથા શરૂઆતનો તણા ભેદક	120	160	500□1000	230	□

ઉપયોગ માટે સૂચનો
મુંગફળી, ઘઉં અને કપાસમાં ઉપયોગ માટે સૂચનઃ
ઉત્પાદનની જરૂરી માત્રા માપો અને થોડી પાણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરો.
નિર્દિષ્ટ માત્રાનું બાકીની પાણી પણ સારી રીતે હલાવતા મિક્સ કરો અને પછી પાકની મિટ્ટી ભેજો. ચોખામાં ઉપયોગ માટે સૂચનઃ ઉત્પાદનની જરૂરી માત્રા માપો અને 500 મિલી. પાણી સાથે ઘોલ તૈયાર કરો, અને ઘોલ 20 કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર રેતમાં મિક્સ કરીને છાંટો.
કીટકનાશકના પેકેટો તેમની મૂળ કન્ટેનરમાં જ સંગ્રહિત હોવા જોઈએ અને તેમને અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થોના સંગ્રહ માટે વપરાતા રૂમ અથવા પ્રાંગણથી અલગ રૂમ/પ્રાંગણમાં રાખવું જોઈએ. અથવા તેમને તાળા-ચાવીવાળા અલગ અલમારીમાં સુરક્ષિત રીતે રાખવું જોઈએ.

કીટકનાશક સંગ્રહ માટે નિર્ધારિત રૂમ અથવા પ્રાંગણ સ્વચ્છ, સૂકો, પૂરતી રીતે પ્રકાશિત અને હવા પ્રવાહી હોવું જોઈએ, અને તેમનું કદ એટલું પૂરતું હોવું જોઈએ કે વાસ્પોથી કોઈ પ્રદૂષણ ન થાય.

ઉપયોગ સમય
તેમાં ઉત્પાદન પ્રતિ કિલો ભાર/ભાર 750 ગ્રામ થાયામેથોક્સામ સક્રિય તત્વ તરીકે છે.

ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવધાની
ઘોળ તૈયાર કરવા માટે રસોઈના ભાંડા ઉપયોગ ન કરો. ઘોળ હલાવવા માટે લાકડું વાપરો. ત્વચા સાથે સંપર્કથી બચવા માટે દસ્તાન પહેરો. શ્વાસ દ્વારા આંતર જવાન અને આંખો સાથે સંપર્કથી પણ બચાવો. ઘોળ બનાવતી વખતે સુરક્ષાત્મક કપડાં જેવા કે માસ્ક, ચશ્મા, બૂટ્સ પહેરો. નોઝલમાં મોઢાથી ફુંકો ન મારવો.
ઉઠાવતા, રાખતા અથવા ઉપયોગ કરતી વખતે ખાવું, પીવું કે ધુમ્રપાન ન કરવું. બાકી ઘોળનું સંગ્રહ ન કરો. દરરોજ ઉપયોગ પછી સ્પ્રેયર, બકેટ અને ભાંડા પાણીથી ધોઈને સાફ કરો.કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી હાથ અને પૂરતું પાણીથી ધોવો.
હવા દ્વારા ફેલાતા છાંટાવના અવશેષ નદીઓ, જળાશય, તળાવો અને અન્ય જળસંગ્રહ ક્ષેત્રોને પ્રભાવિત થવા દેતા નહીં. બાકી રહેલ ઘોળ સુરક્ષિત રીતે નષ્ટ કરો અને ખાલી કન્ટેનર દ્વારા જળાશયને પ્રદૂષિત થવાથી બચાવો.

પિકના ફૂલોની સ્થિતિમાં ઉપયોગ ન કરો.
મધમાખીઓ સક્રિય સમયે ઉપયોગ ન કરો. ઉપચારિત ક્ષેત્રની નજીકની ફૂલવાળી પાક, ફૂલોની સ્થિતિમાં ઘાસ અને ઝાડોને હવાના દ્વારા ફેલાતા છાંટાવના અવશેષથી અસર થવા દેતા નહીં. મધવાળું અત્યધિક મીઠું ઉત્પાદન થનાર પાકના વિસ્તારો પર ઉપયોગ ન કરો. ફૂલવાળી પાકોમાં ફૂલ આવતાં 5 દિવસ પહેલાં અને 5 દિવસ પછી ફૂલ બનવાની સ્થિતિ પૂરી થાય ત્યાં સુધી ઉપયોગ ન કરો.

જો કોઈ પણ ઝેરના લક્ષણ દેખાય તો તરત જ ડોક્ટરને સંપર્ક કરો.

ઝેરના લક્ષણો
ઝેરના લક્ષણોમાં શરીરમાં ધીલોપણા, દમાશી જેવી ઝટકા અને પ્ટોસિસ હોઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
પ્રભાવિત વ્યક્તિને પ્રદૂષિત જગ્યેથી હવામાં/ખુલ્લી જગ્યા પર લઈ જાવો અને તાપમાનથી બચાવો. ઝેરના લક્ષણો દેખાય ત્યારે તરત જ ડોક્ટરને બોલાવો.
ત્વચા પર લગ્યો હોય તોઃ પ્રદૂષિત કપડાં ઉતારવું અને અસરગ્રસ્ત ભાગને સابون અને પાણીથી સારી રીતે ધોવું. આંખોમાં ગયા હોય તોઃ થોડા સમય માટે આંખોને સ્વચ્છ પાણીથી સારી રીતે ધોવું. ગિલ્યું હોય તોઃ પાણીમાં મેદિસિનલ ચાર્કોલ પૂરતી માત્રામાં ઉકાળી વારંવાર આપવું.
સૂચના: ક્યારેય બેહોશ રોગીને મોઢાથી કંઈ આપશો નહીં. ઊલટી કરાવવાનો પ્રયત્ન ન કરો.

પાક ઝેરી પ્રભાવ
C.I.B. માર્ગદર્શિકા મુજબ

ઝેરનાશક
કોઈ ખાસ પ્રતિકારક ઝેર નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનું નિકાલ
1. પર્યાવરણના પ્રદૂષણને રોકવા માટે ડબ્બા, બાકી રહેલ ઘોળ/સામગ્રી, મશીનો ધોવા અને ખાલી ડબ્બાનું નિકાલ સલામત જગ્યાએ કરો.
2. ઉપયોગ કરેલા ડબ્બા/પેકેટ બહાર ન છોડવું. આ રીતે તેમનો પુનઃઉપયોગ ટાળવા મળે છે.
3..પેકેટ/ડબ્બા તોડીને-ફોડીને લોકવહેલી જગ્યેથી દૂર જમીનમાં દફન કરવો.

સંગ્રહની શરતો
1. કીટકનાશકના ડબ્બા અન્ય સામગ્રી, ખાસ કરીને ખોરાક માટે વપરાતા રૂમ અથવા ઈમારતો પાસેથી દૂર અલગ રૂમ/અલમારીમાં રાખવા જોઈએ.
2. કીટકનાશક સંગ્રહ માટેની રૂમ/ઇમારત મજબૂત, સૂકી, પ્રકાશિત અને હવાદ□ર હોવી જોઈએ અને પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ જેથી વાસ્પથી પ્રદૂષણ ન થાય."

રાસાયણિક રચના

ક્રમ સંખ્યા	ઘટક	વર્ણન	વજન
1	થાયમેથોક્સામ (સક્રિય તત્વ)	□	75.0 % વજન/વજન
2	વેટિંગ અને ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ્સ		
3	સોડિયમ એન-મેથાઇલ-એન-ઓલિઓયલ ટોરેટ	□	1.5 % વજન/વજન
4	સોડિયમ આલ્કિલ નેફ્થેલીન સલ્ફોનેટ	□	1.0 % વજન/વજન
5	એન્ટીફોમ		
6	સિલિકોન તેલ (પોલિડાયમેથાઇલસિલોક્સેન)	□	0.5 % વજન/વજન
7	કેરિયર્સ		
8	યુરિયા, ફોર્માલ્ડેહાઇડ સાથે પોલિમર	□	0.5 % વજન/વજન
9	સ્ટાર્ચ	□	4.0 % વજન/વજન
10	લેક્ટોઝ એનહાયડ્રસ	□	જરૂરી પ્રમાણ
	કુલ		100.00 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਥਾਇਅਮੇਥੋਕਸਾਮ 75% ਭਾ./ਭਾ. ਐੱਸ.ਜੀ.
(ਕੀਟਕ ਨਾਸ਼ਕ)

ਥਾਇਅਮੇਥੋਕਸਾਮ 75% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਐੱਸ.ਜੀ. ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਕ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੀੜੇ, ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਭੇਦਕ, ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਪੱਤਿਆ ਤਿੱਡਾ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਤਿੱਡਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਚੁਰਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਫਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ□ ਕਟਾਈ ਅੰਤਰ (ਘੰਟੇ)	ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ)
		ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ			
ਕਪਾਹ	ਐਫਿਡ ਅਤੇ ਜੈਸਿਡ	94	125	ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 50□100 ਮਿ.ਲੀ.	109	□
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਦੀਮਕ	94	125	500□1000	57	□
ਧਾਨ	ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਫੁਦਕੂ, ਭੂਰਾ ਪੌਦਾ ਫੁਦਕੂ	113	150	500 ਮਿ.ਲੀ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ 20 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ	60	□
ਗੰਨਾ	ਦੀਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਾ ਛੇਦਕ	120	160	500□1000	230	□

ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗਹੂੰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸੂਚਨਾ:
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਿੱਜੋ। ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸੂਚਨਾ: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ 500 ਮਿਲੀ. ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ 20 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਓ।
ਕੀਟਕ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ-ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਕੀਟਕ ਨਾਸ਼ਕ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਸੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਵਾ□ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਫ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭਾਰ/ਭਾਰ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਥਾਇਅਮੇਥੋਕਸਾਮ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਘੋਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਵਰਤੋਂ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ। ਸਾਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮੇ, ਬੂਟ ਪਹਿਨੋ। ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹੋਂ ਫੂੰਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਠਾਉਂਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਬਕੇਟ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਛਿੜਕਾਓ ਨਦੀਆਂ, ਜਲਾਸ਼ਯ, ਤਲ◌ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮਧਮੱਖੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਉਪਚਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲੇ ਛਿੜਕਾਓ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਤਿ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਢੀਲਾਪਣ, ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਪਟੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ: ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
ਨਿਗਲਣ 'ਤੇ: ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਘੋਲ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਓ।
ਸੂਚਨਾ: ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫਸਲ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
C.I.B. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦ◌ੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬੇ, ਬਾਕੀ ਘੋਲ/ਸਾਮੱਗਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ।
2. ਵਰਤੇ ਡੱਬੇ/ਪੈਕੇਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਕੇਟ/ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਕੇ-ਫੋੜ ਕੇ ਲੋਕਵਾਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੋ।

ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਕੀਟਕ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਸਾਮੱਗਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਕੀਟਕ ਨਾਸ਼ਕ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕਮਰੇ/ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਵੇਰਵਾ	ਭਾਰ
1	ਥਾਇਮੇਥੋਕਸਾਮ (ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ)	□	75.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਵੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ		
3	ਸੋਡੀਅਮ ਐਨ-ਮੈਥਾਈਲ-ਐਨ-ਓਲੀਓਇਲ ਟੌਰੇਟ	□	1.5 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕੀਲ ਨੇਫਥਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ	□	1.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
5	ਐਂਟੀਫੋਮ		
6	ਸਿਲਿਕੋਨ ਤੇਲ (ਪੌਲੀਡਾਈਮੇਥਾਈਲਸਿਲੋਕਸੇਨ)	□	0.5 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
7	ਕੈਰੀਅਰ		
8	ਯੂਰੀਆ, ਫਾਰਮਾਲਡੇਹਾਈਡ ਨਾਲ ਪਾਲੀਮਰ	□	0.5 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
9	ਸਟਾਰਚ	□	4.0 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
10	ਲੈਕਟੋਜ਼ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ	□	ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
	ਕੁੱਲ		100.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

থায়ামেথোক্সাম 75% ভা./ভা. এস.জি.
(পোকামাকড়নাশক)

থায়ামেথোক্সাম 75% ভর/ভর এস.জি. একটি বহু-মুখী অন্তঃপ্রবাহী পোকামাকড়নাশক। এর ব্যবহার সুপারিশ করা হয় মুগফলি ফসলের পোকা, আখে পোকা এবং আগ্রহী ও ক্ষয়কারী, ধান-পাতার টিড্ডা ও বাদামী টিড্ডা এবং তুলোতে তেল ও চুর্দা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

সুপারিশ

ফসল	পোকামের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা				
		সক্রিয় উপাদান	ফর্মুলেশন	পানির পরিমাণ	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময় (ঘণ্টা)	পুনঃপ্রবেশ সময় (ঘণ্টা)
তুলা	এফিড ও জ্যাসিড	94	125	প্রতি গাছে 50□100 মি.লি.	109	□
চিনাবাদাম	উইপোকা	94	125	500□1000	57	□
ধান	সবুজ পাতাফড়িং, বাদামী পাতাফড়িং	113	150	500 মি.লি. পানিতে গুলে 20 কেজি বালিতে মেশাতে হবে	60	□
আখ	উইপোকা ও প্রাথমিক কাণ্ড ছিদ্রকারী	120	160	500□1000	230	□

ব্যবহারের নির্দেশিকা
মুগফলি, গম এবং তুলোতে ব্যবহার:
প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাপুন এবং অল্প পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশান।
নির্ধারিত পরিমাণের বাকি পানি ভালোভাবে মিশিয়ে ফসলের মাটিতে ঢালুন।

ধানে ব্যবহার: প্রয়োজনীয় পরিমাণ মাপুন এবং 500 মি.লি পানিতে মিশ্রণ তৈরি করুন, এবং ঘোল 20 কেজি প্রতি হেক্টর বালিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

পোকামাকড়নাশকের প্যাকেটগুলি তাদের মূল কনটেইনারে সংরক্ষণ করা উচিত এবং এগুলি অন্যান্য জিনিস, বিশেষ করে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা ভবন থেকে আলাদা কক্ষে রাখা উচিত। অথবা এগুলি লকযুক্ত আলমারিতে সুরক্ষিতভাবে রাখুন।

সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত কক্ষ পরিষ্কার, শুষ্ক, পর্যাপ্তভাবে আলোযুক্ত এবং বায়ুচলাচল সম্পন্ন হওয়া উচিত। এবং এর আকার যথেষ্ট বড় হওয়া উচিত যাতে বাষ্প থেকে কোনো দূষণ না ঘটে।

ব্যবহারের সময়
উৎপাদনের প্রতি কেজি ভা./ভা. 750 গ্রাম থায়ামেথোক্সাম সক্রিয় উপাদান হিসেবে থাকে

ব্যবহারকারীদের সতর্কতা
ঘোল তৈরি করার জন্য রান্নার পাত্র ব্যবহার করবেন না। ঘোল নাড়াতে কাঠ ব্যবহার করুন। চামড়ার সংস্পর্শ এড়াতে দস্তানা পরুন। শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে যাওয়া এবং চোখের সংস্পর্শ এড়ান। ঘোল তৈরি করার সময় সুরক্ষা পোশাক যেমন মাস্ক, চশমা, বুট পরুন। নোজল দিয়ে মুখে ফুঁকবেন না। উঠানো, রাখা বা ব্যবহার করার সময় খাওয়া, পান করা বা ধূমপান করবেন না। অবশিষ্ট ঘোল সংরক্ষণ করবেন না।প্রতিদিন ব্যবহারের পরে স্প্রেয়ার, বালতি এবং পাত্রগুলি পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করুন। কাজ শেষে হাত সাবান ও প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

বায়ু দ্বারা ছড়ানো স্প্রে নদী, জলাশয়, পুকুর ও অন্যান্য জলের সংরক্ষণ স্থানের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। বাকি ঘোল নিরাপদভাবে নষ্ট করুন এবং খালি কনটেইনারের মাধ্যমে জলাশয়কে দূষণ থেকে রক্ষা করুন।

ফুল আসা অবস্থায় ফসলের উপর ব্যবহার করবেন না।
মৌমাছি সক্রিয় সময়ে ব্যবহার করবেন না। প্রসেসকৃত এলাকার নিকটবর্তী ফুলযুক্ত ফসল, ঘাস এবং গাছবিরোধী স্প্রে থেকে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। মধুময় উচ্চ মধু উৎপাদনকারী ফসলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন না। ফুল আসার ৫ দিন আগে এবং ৫ দিন পরে ফুল আসা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করবেন না।
যদি কোনো বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বিষের লক্ষণ
বিষের কারণে শরীরে অবসাদ, মৃগী সদৃশ আঘাত এবং পটোসিস দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
প্রভাবিত ব্যক্তিকে দূষিত স্থান থেকে বায়ুচলাচল সম্পন্ন কক্ষে বা খোলা হাওয়ায় নিয়ে যান এবং তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করুন। বিষের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডাকুন। ত্বকে লাগলে: দূষিত কাপড় সরান এবং প্রভাবিত অংশ সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। চোখে গেলে: চোখকে কিছু সময় পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিন। গিলে গেলে: পানিতে মেডিসিনাল চারকোল পর্যাপ্ত পরিমাণে মিশিয়ে বারবার দিন। নোট: কখনো অচেতন রোগীর মুখে কিছু দেবেন না। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না।

ফসলের বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা
C.I.B. নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

বিষনাশক
কোনও বিশেষ প্রতিবিষ নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডব্বার নিষ্পত্তি
1..পরিবেশ দূষণ রোধ করতে ডব্বা, বাকি ঘোল/উপাদান, যন্ত্র ধোয়া এবং খালি ডব্বা নিরাপদ স্থানে নষ্ট করুন।
2. ব্যবহৃত ডব্বা/প্যাকেট বাইরে ফেলে দেবেন না।
3. প্যাকেট/ডব্বা ভেঙে নিরাপদভাবে মাটিতে পুঁতুন।

সংরক্ষণের শর্ত
1. কিটকনাশকের ডব্বা অন্যান্য উপকরণ, বিশেষ করে খাদ্যপদার্থ সংরক্ষণের কক্ষ বা ভবন থেকে আলাদা রাখুন।
2. সংরক্ষণের কক্ষ/ভবন শক্ত, শুষ্ক, আলোযুক্ত এবং বায়ুচলাচল সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং যথেষ্ট স্থান থাকা উচিত যাতে বাষ্প থেকে দূষণ না ঘটে।"

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	বিবরণ	ওজন
1	থায়ামেথক্সাম (সক্রিয় উপাদান)	□	75.0 % ওজন/ওজন
2	ওয়েটিং ও ডিসপার্সিং এজেন্ট		
3	সোডিয়াম এন-মিথাইল-এন-ওলিওয়াইল টরেট	□	1.5 % ওজন/ওজন
4	সোডিয়াম আলকিল ন্যাফথ্যালিন সালফোনেট	□	1.0 % ওজন/ওজন
5	অ্যান্টিফোম		
6	সিলিকন তেল (পলিডাইমেথাইলসিলোক্সেন)	□	0.5 % ওজন/ওজন
7	ক্যারিয়ার		
8	ইউরিয়া, ফর্মালডিহাইড সহ পলিমার	□	0.5 % ওজন/ওজন
9	স্টার্চ	□	4.0 % ওজন/ওজন
10	ল্যাকটোজ অ্যানহাইড্রাস	□	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
	মোট		100.00 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

تھیامی تھاکسام 75% بھا./بھا. ایس۔ جی۔
(کیڑوناشک)

تھیامی تھاکسام 75% بھا./بھا. ایس۔ جی۔ ایک کثیر الجہتی اندرونی اثر رکھنے والا کیڑوناشک ہے۔"
اس کی سفارش مونگ پھلی کی فصل پر دیمک، گنے میں دیمک اور دیگر نقصان دہ کیڑوں، دھان میں سبز پتہ ٹڈی اور بھورا ٹڈی، اور کپاس
"میں تیلہ اور چُردہ کی روک تھام کے لیے کی جاتی ہے۔

سفارشات

فصل	کیڑے کا نام	فی ہیکٹر مقدار				استعمال
		فعال اجزاء	فارمولیشن	پانی کی مقدار	آخری اسپرے اور کٹائی کے درمیان وقفہ (گھنٹے)	دوبارہ داخلے کی مدت (گھنٹے)
کپاس	ایفڈ اور جیسڈ	94	125	فی پودا 50□100 ملی لیٹر	109	□
مونگ پھلی	دیمک	94	125	500□1000	57	□
دھان	سبز پتی ٹڈا، بھورا پودا ٹڈا	113	150	500 ملی لیٹر پانی میں گھول کر 20 کلو ریت میں ملائیں	60	□
گنا	دیمک اور ابتدائی تنا چھیدنے والا کیڑا	120	160	500□1000	230	□

"استعمال کی ہدایات
:مونگ پھلی، گنا اور کپاس میں استعمال
ضروری مقدار ماپیں اور تھوڑے پانی میں اچھی طرح مکس کریں۔
بقیہ مقررہ پانی کو بھی اچھی طرح ملا کر فصل کی مٹی میں ڈالیں۔

:دھان میں استعمال کے لیے
،ضروری مقدار ماپیں اور 500 ملی لیٹر پانی میں حل تیار کریں
پھر مکسچر کو 20 کلوگرام فی ہیکٹر ریت میں ملا کر چھڑکیں۔

کیڑوناشک کے پیکیٹس کو ان کے اصل کنٹینرز میں ہی محفوظ کریں اور انہیں دیگر اشیاء، خاص طور پر خوراک کی ذخیرہ گاہوں سے الگ رکھیں۔
یا انہیں تالہ لگائی گئی علیحدہ الماریوں میں محفوظ کریں۔

ذخیرہ کرنے کے لیے مخصوص کمرے صاف، خشک، مناسب روشنی اور ہوا دار ہونے چاہئیں۔
انہیں اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ بخارات سے کوئی آلودگی نہ ہو۔

استعمال کا وقت
مصنوع میں فی کلو بھا./بھا. 750 گرام تھیامی تھاکسام فعال جزو کے طور پر موجود ہے۔

استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی ہدایات
حل تیار کرنے کے لیے باورچی خانے کے برتن استعمال نہ کریں۔
حل کو ہلانے کے لیے لکڑی کا استعمال کریں۔
جلد سے رابطہ سے بچنے کے لیے دستانے پہنیں۔
سانس کے ذریعے اندر جانے اور آنکھوں سے رابطے سے بچیں۔
حل بناتے وقت حفاظتی لباس، ماسک، چشمہ اور جوتے پہنیں۔
ناک کے ذریعے نہ پھونکیں۔
اٹھاتے، رکھتے یا استعمال کرتے وقت کھانا، پینا یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔
باقی حل محفوظ نہ کریں۔
ہر دن کے بعد اسپریئر، بالٹی اور برتنوں کو پانی سے دھوئیں۔

کام مکمل ہونے کے بعد ہاتھوں کو صابن اور کافی پانی سے دھوئیں۔
ہوا کے ذریعے پھیلنے والے اسپرے کے بقایا مواد کو دریا، جھیل، تالاب یا دیگر پانی ذخیرہ کرنے والے مقامات تک نہ جانے دیں۔
بقیہ مواد کو محفوظ طریقے سے تلف کریں اور خالی کنٹینرز کے ذریعے پانی کی آلودگی سے بچائیں۔

پھول آنے کے دوران فصل پر استعمال نہ کریں۔
مکھیوں کے فعال وقت میں استعمال نہ کریں۔
علاج شدہ علاقے کے قریب موجود پھول والی فصلیں، گھاس اور درخت ہوا کے ذریعے پھیلنے والے اسپرے کے بقایا مواد سے متاثر نہ ہوں۔
مکھیوں کی جانب سے زیادہ شہد والی فصل والے علاقوں میں استعمال نہ کریں۔
پھول آنے کے 5 دن پہلے اور 5 دن بعد، پھول بننے کی پوری مدت تک استعمال نہ کریں۔

اگر کسی بھی زہر کے علامات ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

زہر کی علامات
زہر کی وجہ سے جسم میں سستی، مرگی جیسے جھٹکے، اور پٹوسس ظاہر ہو سکتے ہیں۔

ابتدائی طبی امداد
متاثرہ شخص کو آلودگی سے پاک ہوا دار کمرے یا کھلے علاقے میں لے جائیں اور درجہ حرارت سے محفوظ رکھیں۔
زہر کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر کو بلائیں۔
جلد پر لگ جائے: آلودہ کپڑے اتاریں اور متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
آنکھ میں جائے: آنکھوں کو صاف پانی سے کچھ دیر دھوئیں۔
نگل جائے: پانی میں میڈیسنل چارکول ملا کر بار بار دیں اور ڈاکٹر کو اطلاع دیں۔
نوٹ: بے ہوش مریض کو کبھی بھی منہ سے کچھ نہ دیں۔ الٹی کروانے کی کوشش نہ کریں۔

فصل پر زہریلا اثر
کے ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ .C.I.B

زہریلا علاج
کوئی خاص زہر مخالف موجود نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کا تصرف
ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے ڈبے، بچا ہوا محلول/مواد، مشینوں کی دھلائی اور خالی ڈبوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ .1
استعمال شدہ ڈبے/پیکٹ باہر نہ پھینکیں۔ .2
پیکٹ/ڈبے توڑ کر زمین میں محفوظ طور پر دفن کریں۔ .3

ذخیرہ کرنے کی شرائط
کیڑوناشک کے ڈبے دیگر اشیاء، خاص طور پر خوراک کے ذخیرہ کرنے والے کمروں سے علیحدہ رکھیں۔ .1
"ذخیرہ کرنے والا کمرہ مضبوط، خشک، روشنی دار، ہوا دار اور کافی جگہ والا ہونا چاہیے تاکہ بخارات سے آلودگی نہ ہو۔ .2

کیمیائی ترکیب

فہرست نمبر	جزو	وضاحت	وزن
1	a.i. (Thiamethoxam a.i.) تھیامی تھوکسام	□	75.0 % وزن/وزن
2	گیلا کرنے اور پھیلانے والے ایجنٹس		
3	سوڈیم این-می تھائل-این-اولیوائل ٹورائٹ	□	1.5 % وزن/وزن
4	سوڈیم ایلکیل نیفتھالین سلفونیٹ	□	1.0 % وزن/وزن
5	اینٹی فوم		
6	سلیکون آئل	□	0.5 % وزن/وزن
7	کیریئرز		
8	یوریا، فارم آلڈیہائیڈ کے ساتھ پالیمر	□	0.5 % وزن/وزن
9	اسٹارچ	□	4.0 % وزن/وزن
10	لیکٹوز انہائیڈرس	□	Q.S. %
	کل		100.00 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

ഥിയാമെതോക്സാം 75% ഭാ./ഭാ. എസ്.ജി.
(കീടനാശകം)

ഥിയാമെതോക്സാം 75% ഭാ./ഭാ. എസ്.ജി. ഒരു ബഹുമുഖ അന്തർപ്രവാഹി കീടനാശകമാണ്. ഇത് മുങ്ങഫലി വിളയിൽ ദിംക്, കരിപ്പള്ളി വിളയിൽ ദിംക്, അന്നകി, അരിപ്പ്, അകുമരി, അച്ചുകണ്ടൻ, അരിപ്പ് എന്നിവയുടെ തടയൽ, അരി വിളയിൽ പച്ച ഇലചിത്സൻ ചിത്സൻ, ചായയിൽ ചുർദ, അരിപ്പ്, ചായയ്ക്കുള്ള കൊമ്പു കീടം, തക്കാളി വിളയിൽ ചുർദ, ഫലം തകരുന്ന മഷി, വെളുത്ത തേനീച്ച എന്നിവ തടയുന്നതിനാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്."

ശുപാർശ

വിള	കീടത്തിന്റെ പേര്	ഹെക്ടറിന് അളവ്				
		സജീവ ഘടകം	ഫോർമുലേഷൻ	വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്	അവസാന തളിക്കൽ□ കൊയ്ത്ത് ഇടവേള (മണിക്കൂർ)	വീണ്ടും പ്രവേശന സമയം (മണിക്കൂർ)
പരുത്തി	ആഫിഡ്, ജാസിഡ്	94	125	ഒരു ചെടിക്ക് 50□100 മി.ലി.	109	□
നിലക്കടല	തീമാറ്റ	94	125	500□1000	57	□
നെല്ല്	ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ, ബ്രൗൺ പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ	113	150	500 മി.ലി. വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 20 കിലോ മണലിൽ ചേർക്കുക	60	□
കരിമ്പ്	തീമാറ്റയും പ്രാരംഭ തണ്ട് തുരക്കുന്ന കീടവും	120	160	500□1000	230	□

"ഉപയോഗത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ
മുങ്ങഫലി, ചെറു പായ, പത്ി വിളയിൽ ഉപയോഗത്തിന്:
ആവശ്യമായ അളവു എടുക്കുക, കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലക്കുക.
നിർദ്ദേശിച്ച അളവിന്റെ ശേഷിച്ച വെള്ളവും നന്നായി കലക്കി വിളയുടെ മണ്ണിലേക്ക് പാകം ചെയ്യുക.

അരി വിളയിൽ ഉപയോഗം:
ആവശ്യമായ അളവു എടുക്കുക, 500 മി.ലീ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക, 20 കിലോ മണ്ണിനൊപ്പം മിശ്രിതം കലക്കി പമ്പ് ചെയ്ത് ചോർക്കുക.

കീടനാശക പാക്കറ്റുകൾ അവയുടെ ആസൽ കണ്ടെയ്നറിലും സൂക്ഷിക്കണം, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ/ഭക്ഷണ സംഭരണ മുറികളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചിടണം.
അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത പ്രത്യേക ആൽമാരിയിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണം.

സംഭരണ മുറികൾ ശുചിത്വം, വരണ്ട സ്ഥലം, മതിയായ വെളിച്ചം, വായുസഞ്ചാരം ഉള്ളതായിരിക്കണം.
മറ്റുള്ളവയിൽ ആവിറ് മൂലം മലിനീകരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉപയോഗ സമയത്ത്
ഉത്പന്നത്തിൽ ഓരോ കിലോഗ്രാമിലും 750 ഗ്രാം തിയാമെതോക്സാം സജീവ ഘടകമുണ്ട്.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാൻ വാണിജ്യ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.
കലക്കാൻ മരം ഉപയോഗിക്കുക.
ചർമ്മ ബന്ധം തടയാൻ ഗ്ലൗസുകൾ ധരിക്കുക.
ശ്വസനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്കുള്ള സ്പർശം തടയുക.
മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ, മാസ്ക്, കണ്ണട, ബൂട്ട്സ് ധരിക്കുക.
മൂക്കിൽ വീശരുത്.
ഉയർത്തുമ്പോൾ, സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം, പാനം, പുകവലി ഒഴിവാക്കുക.
ശേഷിച്ച മിശ്രിതം സൂക്ഷിക്കരുത്.
ദിവസത്തിനുശേഷം സ്പ്രെയർ, ബക്കറ്റ്, പാത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് കൈകൾ സാബൂൺ കൊണ്ട് കഴുകുക.

ഗാളിയിലൂടെ പരത്തുന്ന സ്പ്രേയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കാതിരിക്കണം.
ശേഷിച്ച മിശ്രിതം സുരക്ഷിതമായി കളയുക, പാഴ് കണ്ടെയ്നറുകൾ വഴി ജലസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക.

പൂവ് വന്ന സമയത്ത് വിളയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.
തേനുംചെടികൾ സജീവ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്.
ചികിത്സിച്ച പ്രദേശത്തെ അടുത്തുള്ള പൂവുള്ള വിളകൾ, പുൽ, മരം എന്നിവ ഗാളിയിലൂടെ പരത്തുന്ന സ്പ്രേ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നു ബാധിക്കപ്പെടരുത്.
തേൻ അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിള പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്.
പൂവ് വരുന്ന 5 ദിവസം മുൻപ്, 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പൂവ് fully പൂത്തുവരുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കരുത്.

വിഷ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ, ഉടൻ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

വിഷ ലക്ഷണങ്ങൾ
വിഷം കാരണം ശരീരത്തിൽ മന്ദഗതിയുണ്ടാകാം, മൃഗി പോലുള്ള ഇടയ്ക്കിടക്ക് ശീർഷചലനങ്ങൾ, പ്റ്റോസിസ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
പ്രഭാവിത വ്യക്തിയെ മലിനമില്ലാത്ത വായുസഞ്ചാരമാർഗ്ഗം ഉള്ള മുറിയിലേക്കോ തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ കൊണ്ടുപോകുക, താപനിലയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക.
വിഷ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.
ചർമ്മത്തിൽ വന്നാൽ: മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മഭാഗങ്ങൾ സാബൂൺ വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകുക.
കണ്ണിൽ പോയാൽ: കണകൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കഴുകുക.
നീണ്ടാൽ: വെള്ളത്തിൽ മെഡിസിനൽ ചാർക്കോൾ കലക്കി ആവർത്തിച്ച് നൽകി ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.
സൂചന: എപ്പോഴും മഞ്ഞരീതിയിൽ പെട്ട വ്യക്തിക്ക് വായിലൂടെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. വാന്തി വരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്.

പെട്രോപോഴിക്കൽ പാട്ടി
C.I.B. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

വിഷനാശകം
പ്രത്യേക പ്രതിവിഷമില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യുക.

ഖാലി കുപ്പികൾ നശീകരണം
1. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ കുപ്പികൾ, ശേഷിച്ച മിശ്രിതം/വസ്തു, യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി കളയുക.
2. ഉപയോഗിച്ച കുപ്പികൾ/പാക്കറ്റുകൾ പുറത്താക്കരുത്.
പാക്കറ്റുകൾ/കുപ്പികൾ തകർത്ത് മണ്ണിൽ മറുക.

സംഭരണം
1. കീടനാശക കുപ്പികൾ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണ സംഭരണ മുറികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിടണം.
2. സംഭരണ മുറി/ഭവനം ബലമുള്ള, വരണ്ട, വെളിച്ചമുള്ള, വായുസഞ്ചാരം ഉള്ളതായിരിക്കണം.
അവിടം മതിയായ വലിപ്പമുള്ളതാകണം, ആവിറ് മൂലം മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം."

രാസഘടന

ക്ര.സം	ഘടകം	വിവരണം	ഭാരവും
1	തിയാമെതോക്സാം a.i.	□	75.0 % ഭാരം/ഭാരം
2	ഈരപ്പം വിതരണ സഹായകങ്ങൾ		
3	സോഡിയം എൻ-മെഥിൽ-എൻ-ഒലെയോയ് ടോറേറ്റ്	□	1.5 % ഭാരം/ഭാരം
4	സോഡിയം ആൽക്കൈൽ നാഫ്തലീൻ സൾഫൊണേറ്റ്	□	1.0 % ഭാരം/ഭാരം
5	ആന്റിഫോം		
6	സിലിക്കോൺ ഓയിൽ	□	0.5 % ഭാരം/ഭാരം
7	കേരിയേഴ്സ്		
8	യൂറിയ, ഫോർമാൽഡിഹൈഡിനൊപ്പം പോളിമർ	□	0.5 % ഭാരം/ഭാരം
9	സ്റ്റാർച്ച്	□	4.0 % ഭാരം/ഭാരം
10	ലാക്ടോസ് അന്ഹൈഡ്രസ്	□	Q.S. %
	മൊത്തം		100.00 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಥಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಂ 75% ಭಾ./ಭಾ. ಎಸ್.ಜಿ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಥಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಂ 75% ಭಾರ/ಭಾರ ಎಸ್.ಜಿ. ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಆಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಗಫಳಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ದಿಮಕ್, ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿಮಕ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕರ ಕೀಟಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ಎಲೆಸಿಪ್ಪೆ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲಾ ಮತ್ತು ಚುರ್ಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ				
		ಸಕ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ	ಸಂಯೋಜನೆ	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ□ ಕಟಾವು ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ಗಂಟೆ)	ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆ)
ಹತ್ತಿ	ಆಫಿಡ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಸಿಡ್	94	125	ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 50□100 ಮಿ.ಲಿ.	109	□
ಶೇಂಗಾ	ತಕ್ಕೆ	94	125	500□1000	57	□
ಭತ್ತ	ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹಾಪರ್, ಕಂದು ಎಲೆ ಹಾಪರ್	113	150	500 ಮಿ.ಲಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ 20 ಕೆ.ಜಿ. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು	60	□
ಕಬ್ಬು	ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾಂಡ ತೊಡೆಯುವ ಕೀಟ	120	160	500□1000	230	□

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು
ಮುಂಗಫಳಿ, ಗದ್ದೆ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ:
ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಶಿಸಿ.
ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಳಿದ ನೀರಿನನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಬೆಳೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ.

ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ:
ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 500 ಮಿ.ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಶಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿಹೆಕ್ಟರ್ ಮರಳು ಜೊತೆ ಕಲಸಿ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಿ.
ಕೀಟನಾಶಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾಂಟ್ಬೆನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಆಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಕೋಣೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ, ಒಣ, ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವುಳ್ಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಿರಬೇಕು, ಆದರಿಂದ ಆವಿರಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ.

ಬಳಕೆ ಸಮಯ
ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಿಲೋ ಭಾ./ಭಾ.ಗೆ 750 ಗ್ರಾಂ ಥಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಂ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಭಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲಶಿಸಲು ಮರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಸ್ತಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಶ್ವಾಸಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮಾಸ್ಕ್, ಕಣ್ಣೀರು, ಬುಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಬ್ಬೀಡಿ. ಏರುವಿಕೆ, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಳಿಕೆ ನದಿ, ಕೆರೆ, ಹೂವಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಕಾಂಟೈನರ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಹೂವು ಬರುವಾಗ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತುಪ್ಪತುಪ್ಪ ಜಾನುವಾರು ಸಕ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಹೂವಿರುವ ಬೆಳೆ, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದು. ತೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೂವು ಬರುವ 5 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೂವು ಬೆಳೆಯುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಷದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ, ಮೃಗೀ ತರಹದ ಎದ್ದು ಬೀಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪ್ರಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದೂರದ ಹವಾಯುಕ್ತ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ವಿಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ: ಮಾಲಿನ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪ್ರಭಾವಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದರೆ: ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಗುಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ: ನೀರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸೂಚನೆ: ಮರುಳುಗೊಳ್ಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.

ಬೆಳೆ ವಿಷಪಾತಿ
C.I.B. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ವಿಷನಾಶಕ
ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ
1. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣ/ಪದಾರ್ಥ, ಯಂತ್ರಗಳ ತೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೂರವಿಡಿ.
2. ಬಳಕೆಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳು/ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
3. ಪ್ಯಾಕೆಟ್/ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣದ ನಿಯಮಗಳು
1. ಕೀಟನಾಶಕ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು.
2. ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯ ಕೋಣೆ/ಕಟ್ಟಡವು ಬಲವಾದ, ಒಣ, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿರಬೇಕು, ಆವಿರಿನಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ."

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮಾಂಕ	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ	ತೂಕ
1	ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಂ a.i.	□	75.0 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ತೇವೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಸಹಾಯಕಗಳು		
3	ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್-ಮಿಥೈಲ್-ಎನ್-ಒಲೆಯ್ ಟಾರೇಟ್	□	1.5 %ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	□	1.0 %ತೂಕ/ತೂಕ
5	ಅಂಟಿಫೋಮ್		
6	ಸಿಲಿಕೋನ್ ಎಣ್ಣೆ	□	0.5 %ತೂಕ/ತೂಕ
7	ಕೇರಿಯರ್ಸ್		
8	ಯುರಿಯಾ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್	□	0.5 %ತೂಕ/ತೂಕ
9	ಸ್ಟಾರ್ಚ್	□	4.0 %ತೂಕ/ತೂಕ
10	ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್‌ಹೈಡ್ರಸ್	□	Q.S. %
	ಒಟ್ಟು		100.00 %ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ഥിയാമെതോക്ലാം 75% ഭാ./ഭാ. എസ്.ജി.
(കീടനാശകം)

"தையாமெதோக்சாம் 75% எடை/எடை எஸ்.ஜி. ஒரு பல்நுட்பமான உள்ளோடிரவாய்ப்பான பூச்சிக்கொல்லி ஆகும்.
இது முங் பளி பயிரில் உள்ள பொம்மை, கரும்பில் பொம்மை மற்றும் முன்னாள் மற்றும் அழிக்கும், அரிசியில் பச்சை இலைச்சீட்டி மற்றும் பழுப்பு இலைச்சீட்டி மற்றும் பருத்தி பயிரில் எண்ணெய் மற்றும் சுருதாவை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது."

பரிந்துரை

பரிந்துரை						
		ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு				
பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	செயற்பாட்டு கூறு அளவு	மருந்து அளவு	நீரில் கரைப்பு	கடைசி தெளிப்பு மற்றும் அறுவடை இடையிலான காத்திருப்பு காலம்	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு மீண்டும் நுழைவு நேரம் (மணிநேரம்)
பருத்தி	ஜாசிட்கள் மற்றும் த்ரிப்ஸ்	94	125	ஒரு செடிக்கு 50□100 மி.லி	109	□
நிலக்கடலை	கரையான்கள்	94	125	500□1000	57	□
நெல்	பச்சை இலைத் துள்ளி மற்றும் பழுப்பு தாவரத் துள்ளி	113	150	500 மி.லி நீரில் கரைத்து 20 கிலோ மணலுடன் கலக்கவும்	60	□
கரும்பு	கரையான்கள் மற்றும் ஆரம்ப தண்டு துளைப்பூச்சி	120	160	500□1000	230	□

பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்
முங் பளி, கோதுமை மற்றும் பருத்தியில் பயன்பாடு:
தேவையான அளவை அளக்கவும் மற்றும் கொஞ்சம் தண்ணீரில் நன்கு கலந்து கொள்ளவும். குறிப்பிடப்பட்ட அளவின் மீதிய தண்ணீரையும் நன்கு கிளறி சேர்த்து பயிரின் மண்ணை ஊற்றவும்.

அரிசியில் பயன்பாடு: தேவையான அளவை அளக்கவும் மற்றும் 500 மி.லி. தண்ணீரில் கலவையை உருவாக்கவும், மற்றும் கலவை 20 கிலோ/ஹெக்டேர் மணலுடன் கலந்து பிணைப்பு செய்யவும்.

பூச்சிக்கொல்லி பாக்கெட்டுகள் தங்களுடைய அசல் கன்டெய்னரில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அவற்றை மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவு பொருட்கள் சேமிக்கும் அறைகளிலிருந்து தனி அறைகளில் வைக்க வேண்டும். அல்லது பூட்டு கொண்ட தனி அலமாரியில் பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.

சேமிப்புக்கு நியமிக்கப்பட்ட அறைகள் சுத்தம் செய்யப்பட்ட, உலர், போதுமான வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் அதன் அளவு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும், புகையிருப்பால் மாசுபாடு ஏற்படாமல் இருக்க.

பயன்பாட்டு நேரம்
இதில் தயாரிப்பு கிலோ எடை/எடைக்கு 750 கிராம் தையாமெதோக்சாம் செயல்திறன் கொண்டது.

பயன்பாட்டாளர்களுக்கான எச்சரிக்கை
கலவை தயாரிக்க சமையல் பாத்திரங்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
கலவை கிளறுவதற்கு மரம் பயன்படுத்தவும். தோல் தொடர்பு தவிர்க்க கையுறை அணியவும். உள் சுவாச மற்றும் கண் தொடர்பு தவிர்க்கவும்.
கலவை தயாரிக்கும் போது பாதுகாப்பு உடைகள் போன்று முகமூடி, கண்ணாடி, பூட்ஸ் அணியவும்.
முகத்தில் நாசல் மூலம் காற்று வீச வேண்டாம்.
எடுத்தெடுத்த போது, உணவு, பானம் அல்லது புகையிலை தவிர்க்கவும்.
மீதமான கலவை சேமிக்க வேண்டாம்.
ஒவ்வொரு நாளும் பயன்படுத்திய பிறகு ஸ்பிரேயர், பக்கெட் மற்றும் பாத்திரங்களை நீரில் கழுவவும்.
வேலை முடிந்த பின்பு கைகளை சோப்பும் நீருடன் கழுவவும்.

காற்றின் மூலம் பரவிய ஸ்ப்ரே மீதி நதிகள், குளங்கள் மற்றும் பிற நீர் சேமிப்பு பகுதிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த அனுமதிக்காதே.
மீதமான கலவை பாதுகாப்பாக அகற்றவும் மற்றும் வெற்று கன்டெய்னர் மூலம் நீர் உட்பட எந்த இடமும் மாசுபடாது.

பூக்கும் நிலை பயிரில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
தேன் தேனீகள் செயலில் இருக்கும் போது பயன்படுத்த வேண்டாம்.
சிகிச்சை செய்யப்பட்ட பகுதியில் அருகிலுள்ள பூக்கள், புல் மற்றும் மரங்கள் காற்றின் மூலம் பரவும் ஸ்ப்ரே மீதி மூலம் பாதிக்கப்படாதிருக்க வேண்டும்.
மிகவும் அதிக தேன் உற்பத்தி செய்யும் பயிரின் பகுதிகளில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.
பூக்கள் வரும் 5 நாட்களுக்கு முன்பு மற்றும் 5 நாட்களுக்கு பின் பூக்கும் நிலை முடிந்தவரை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

பயன்பாட்டு போது எந்தவொரு விஷக் குறி தோன்றினால் உடனே டாக்டரை அணுகவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்
விஷத்தின் அறிகுறிகள் உடலில் சோர்வு, மிருகீ போன்ற மின் அதிர்வு மற்றும் ப்டோசிஸ் ஏற்படலாம்.

துவக்க சிகிச்சை
பாதிக்கப்பட்ட நபரை மாசுபட்ட இடத்திலிருந்து காற்றோட்டமுள்ள அறைக்கு அல்லது வெளிப்படையான காற்றில் கொண்டு செல்லவும் மற்றும் வெப்பநிலையிலிருந்து பாதுகாக்கவும்.
விஷத்தின் அறிகுறிகள் தோன்றின் உடனே டாக்டரை அழைக்கவும்.
தோலில் பொட்டு வந்தால்: மாசுபட்ட உடைகளை அகற்றி பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் நீரில் நன்கு கழுவவும்.
கண்களில் சென்றால்: கண்களை சில நிமிடங்கள் சுத்தமான நீரில் நன்கு கழுவவும்.
நுகர்ந்தால்: நீரில் மருத்துவ காற்கல் போதுமான அளவு கலக்கி மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கவும்.
குறிப்பு: எப்போதும் மயக்கமடைந்த நோயாளிக்கு வாயில் எதுவும் கொடுக்காதீர்கள். குமட்டுவதை முயற்சிக்க வேண்டாம்.

பயிருக்கு விஷம்
C.I.B. வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றவும்.

விஷநாசகம்
குறைந்தபட்சம் எதிர்விஷம் இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை செய்யவும்.

வெற்று டப்பாக்களின் அகற்றம்
1. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு தடுக்கும் வகையில் டப்பா, மீதி கலவை/பொருள், இயந்திரங்களை கழுவல் மற்றும் வெற்று டப்பாக்கள் பாதுகாப்பான இடத்தில் அகற்றவும்.
2. பயன்படுத்தப்பட்ட டப்பா/பேக்கெட்டுகளை வெளியே விட வேண்டாம்.
3. பேக்கெட்/டப்பாக்களை உடைத்து பாதுகாப்பாக மண்ணில் புதைக்கவும்.

சேமிப்பின் நிபந்தனைகள்
1. பூச்சிக்கொல்லி டப்பாக்கள் பிற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருள் சேமிப்பகத்திலிருந்து வித்தியாசமான இடங்களில் வைக்கவும்.
2. சேமிப்புக்கான அறைகள்/அமைப்புகள் வலிமையான, உலர், வெளிச்சம் முழுமையான மற்றும் காற்றோட்டமுள்ளவை, போதுமான இடம் கொண்டவை இருக்க வேண்டும், புகையிருப்பால் மாசு ஏற்படாத வகையில்."

வேதியியல் கலவை

அ.கா	கூறு	விளக்கம்	எடை
1	தியாக்மெதாக்சாம் a.i.	□	75.0 % எடை/எடை
2	ஈரப்பதம் மற்றும் விநியோக உதவிக் கூறுகள்		
3	சோடியம் என்-மிதைல்-ன்-ஓலியோய் டாரேட்	□	1.5 % எடை/எடை
4	சோடியம் ஆல்கைல் நாப்தலின் சல்போனேட்	□	1.0 % எடை/எடை
5	பைர்க்காப்பு		
6	சிலிகான் எண்ணெய்	□	0.5 % எடை/எடை
7	கேரியர்கள்		
8	யூரியா, பால் மெருகான பவுடர்	□	0.5 % எடை/எடை
9	ஸ்டார்ச்	□	4.0 % எடை/எடை
10	லாக்டோஸ் அன்பிட்ரஸ்	□	Q.S. %
	மொத்தம்		100.00% எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

థయామెథాక్సాం 75% భా./భా. ఎస్.జి.
(కీటకనాశకం)

థయామెథాక్సాం 75% బర./బర. ఎస్.జి. ఒక బహుముఖ అంతర్గత క్రియాశీల కీటకనాశకం. దీనిని మంగల్ ఫలీ పంటలపై దింక, చక్కెర ఆకు దింక, పస్సీర్, పత్తి పంటలో నూనె మరియు చుర్దా నివారణ కోసం సూచించబడుతుంది.

సిఫారసు

పంట	పురుగు పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు				
		సక్రియ ద్రవ్యం	ఫార్ములేషన్	నీటి పరిమాణం	చివరి పిచికారీ-కోత మధ్య వ్యవధి (గంటలు)	తిరిగి ప్రవేశ కాలం (గంటలు)
పత్తి	ఆఫిడ్స్, జాసిడ్స్	94	125	మొక్కకు 50□100 మి.లీ.	109	□
వేరుశనగ	తెల్ల చీమలు	94	125	500□1000	57	□
వరి	గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్, బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్	113	150	500 మి.లీ. నీటిలో కలిపి 20 కిలోల ఇసుకతో కలపాలి	60	□
చెరకు	తెల్ల చీమలు మరియు ప్రారంభ దశ కాండం తొలిచే పురుగు	120	160	500□1000	230	□

వాడుకకు సూచనలు
మంగల్ ఫలీ, గన్ను మరియు పత్తిలో వాడుక:
అవసరమైన మోతాదును కొలిచి, కొంచెం నీటిలో బాగా కలపండి.
నిర్ధేశించిన మోతాదుకు మిగిలిన నీటిని కూడా బాగా కలిపి పంట భూమిలో ఉంచండి.

ధానిలో వాడుక:
అవసరమైన మోతాదును కొలిచి, 500 మి.లీ నీటిలో కలపండి,
తరువాత మిశ్రమాన్ని 20 కిలోల ప్రతి హెక్టారులో మట్టితో కలిపి స్ప్రే చేయండి.

కీటకనాశక ప్యాకెట్లు తమ అసలు కంటెయినర్‌లోనే నిల్వ చేయాలి మరియు వాటిని ఇతర వస్తువులు, ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేసుకునే గదుల నుంచి వేరుగా ఉంచాలి.
లేదా వాటిని తాళా పెట్టిన ప్రత్యేక అలమారీలలో భద్రంగా ఉంచాలి.

నిల్వ కోసం ఉన్న గదులు శుభ్రంగా, ఎండగా, సరిపడే వెలుతురు మరియు గాలి ప్రవాహం కలిగినవి కావాలి.
అవయవాలు కాబట్టి ఆవిరి వల్ల ఎలాంటి మురికితనం రాకూడదు.

వాడుక సమయం
ఉత్పత్తిలో ప్రతి కిలో భా./భా.కి 750 గ్రాములు థయామెథాక్సాం క్రియాశీల పదార్థంగా ఉంటుంది.

వాడుకరులకు జాగ్రత్తలు
కలయిక కోసం వంట పాత్రలు ఉపయోగించవద్దు.
కలయికను కలపడానికి కట్టును ఉపయోగించండి.
చర్మాన్ని తాకకుండా గ్లోవ్స్ ధరించండి.
శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లడం మరియు కళ్ళను సపర్శ చేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
కలయిక చేసినప్పుడు రక్షణ దుస్తులు, మాస్క్, కళ్ల కప్పు, బూట్లు ధరించాలి.
నోస్ల్ ద్వారా ఊదకూడదు.
ఎత్తడం, ఉంచడం లేదా వాడేటప్పుడు తినడం, త్రాగడం లేదా పొగ త్రాగకూడదు.
మిగిలిన మిశ్రమాన్ని నిల్వ చేయవద్దు.
ప్రతి రోజూ వాడిన తర్వాత స్ప్రేయర్, బాకెట్, పాత్రలను నీటితో శుభ్రం చేయండి.
పని పూర్తైన తర్వాత చేతులను సబ్బు మరియు చాలా నీటితో కడగండి.

గాలి ద్వారా వ్యాపించే స్ప్రే యొక్క మిగిలిన పదార్థాలు నది, జలాశయం, తోటలలోకి చేరకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మిగిలిన పదార్థాలను సురక్షితంగా తొలగించండి, మరియు ఖాళీ కంటెయినర్ల ద్వారా నీటిని కాలుష్యం నుంచి రక్షించండి.

పువ్వు రాలే సమయంలో పంటపై వాడకండి.
తేనెతల్లులు క్రియాశీల సమయంలో వాడకండి.
చికిత్స చేసిన ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న పువ్వులు ఉన్న పంటలు, గడ్డి మరియు చెట్లను గాలి ద్వారా వ్యాపించే స్ప్రే మిగులు ప్రభావితం కాకుండా చూసుకోండి.
తేనె అధికంగా ఉత్పత్తి చేసే పంటల ప్రాంతంలో వాడకండి.
పువ్వు రాలే 5 రోజుల ముందే మరియు 5 రోజుల తర్వాత పువ్వు వచ్చే దశ పూర్తయ్యేవరకు వాడకండి.
విష లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.
విష లక్షణాలు
విష కారణంగా శరీరంలో అలసట, మిరగి వంటి షాక్, ప్తోసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రాథమిక చికిత్స
ప్రమాదిత వ్యక్తిని కాలుష్య రహిత గది లేదా తేలికపాటి గాలి ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళి, ఉష్ణోగ్రత నుంచి రక్షించండి. విష లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్‌ని అహ్వానించండి.
చర్మంలో పరిచి అయితే: కాలుష్య దుస్తులను తీయండి, శరీరాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రం చేయండి. కళ్ళలోకి వెళ్తే: కళ్ళను కొద్దిసేపు శుభ్రమైన నీటిలో కడగండి.
నిగలితే: నీటిలో మెడిసినల్ చార్కోల్ మిశ్రమం కలిపి పునరావృతం చేయండి.
గమనిక: ఎల్లప్పుడూ అవహేళన స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నో మౌత్ ఇవ్వకండి. వాంతులు చేయకూడదు.
పంట విషం
C.I.B. సూచనలను అనుసరించండి.
విషనాశకం
ప్రత్యేక ప్రతివిషం లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.
ఖాళీ డబ్బాలు తొలగించడం
పరిసరాల కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి డబ్బాలు, మిగిలిన మిశ్రమం/పదార్థం, యంత్రాల శుభ్రత మరియు ఖాళీ డబ్బాలను భద్రంగా తొలగించండి.
ఉపయోగించిన డబ్బాలు/ప్యాకెట్లు బయటకు వదలకండి.
ప్యాకెట్లు/డబ్బాలను బద్దలు చేసి భూలోతుగా పుచ్చండి.
నిల్వ నిబంధనలు కీటకనాశక డబ్బాలను ఇతర వస్తువులు, ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల నిల్వ గదుల నుండి వేరుగా ఉంచాలి. నిల్వ గది/భవనం బలమైన, ఎండగా, వెలుతురు సరిపడగా, గాలి ప్రవాహం ఉన్నది మరియు అందులో సరిపడే స్థలం ఉండాలి, అటువంటి పరిస్థితిలో ఆవిరి కారణంగా కాలుష్యం రాకూడదు."

రసాయన సంయోజనము

స.న	పదార్థం	వివరణ	బరువు
1	థియామెక్సాం a.i.	□	75.0 % బరువు/బరువు
2	తేమ మరియు పంపిణీ సహాయ పదార్థాలు		
3	సోడియం ఎన్-మెథిల్-ఎన్-ఒలియోయ్ టారేట్	□	1.5 % బరువు/బరువు
4	సోడియం ఆల్కిల్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్	□	1.0 % బరువు/బరువు
5	యాంటీఫోమ్		
6	సిలికోన్ ఆయిల్	□	0.5 % బరువు/బరువు
7	కెరియర్స్		
8	యూరియా, ఫార్మాల్డిహైడ్ తో పాలిమర్	□	0.5 % బరువు/బరువు
9	స్టార్చ్	□	4.0 % బరువు/బరువు
10	లాక్టోస్ అన్హైడ్రస్	□	Q.S. %
	మొత్తం		100.00% బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu