AgroStar®

SULPHUR FAST FW

Sulphur 80% WDG
(Contact Fungicide)

सल्फर फास्ट एफडब्ल्यूडी
सल्फर 80 प्रतिशत पानी में घुलनशील दानेदार
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

For Agricultural Use Only
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS
READ THE LEAFLET BEFORE USE

सुचना
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

Manufactured & Marketed by
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Office Nos. 001 And 002, Ground Floor Wing "A" And Nos. 003 And 004, Ground Floor Wing "B", Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri, Pune - 411014, Maharashtra

Manufactured At

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No. 238/1/A, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No. 713/4, Gram Dahmi Khurd, The. Sanganer, Bagru, Jaipur - 303007.	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.

Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan | Scan to download the AgroStar app | For customer feedback contact us: info@agrostar.in 9503095030 or customer service team at the above address

Sulphur 80% WDG
(Contact Fungicide)

It is a water dispersible granules containing 80% sulphur as active ingredient and balance adjuvants 20% w/w.

Recommendation

		Dosage/HA				
Crop(s)	Common Name of Disease	AI (Kg)	Formulation (Kg)	Dilution in Water (Lt)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Apple	Scab	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
Cowpea, Guar, Pea	Powdery mildew	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
Cumin	Powdery mildew	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
Grapes	Powdery mildew	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
Mango	Powdery mildew	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
Wheat	Powdery mildew	2	2.5	500	24	□

Direction Of Use
Sulphur is not recommended for application on sulphur shy vegetables e.g. cucurbits etc. and certain variety apples, pears and other fruits where high temp (85 deg F or 30 deg. C) prevail sulphur will be phytotoxic. Plant Protection equipment : Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression Knapsack sprayer with hollow cone nozzle.

Time of Application
Refer to CIB Guidelines

Precautions
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning
Nausea, vomiting, headache and irritation to the bronchii, eyes and lungs may occur.

First Aid
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote
No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal Of Used Container
1. Empty containers shall be broken & burried away from habitation
2. The used containers or packages shall not be left outside to prevent their re-use
3. Packages or surplus material & washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution

Storage Conditions
1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms of premises used for storing other articles particulars articles of food or shall be kept in separate almirahs under key and lock depending upon the quantity and nature of the material.
2. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built. Dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contaminated with vapour"

Chemical Composition

S no	Ingredient	Description	Weight
1	Sulphur a.i.	□	80.00 % w/w
2	Wetting agent	Sodium salt of alkyl naphthylene sulfonic and aromatic sulfonic acid condensate	2.00 % w/w
3	Dispersing agent	Sodium salt of phenol sulfonic acid condensate	8.00 % w/w
4	China clay / Kaolin	□	Q.S. % w/w
	Total		100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

English

सल्फर 80 प्रतिशत पानी में घुलनशील दानेदार
(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

यह एक सल्फर टेक्निकल से बनाया गया कणक है जिसमें भार के हिसाब से 80 प्रतिशत सक्रिय तत्व हैं। इसका उपयोग फसलों पर फफूंदी की रोकथाम के लिए किया जाता है।

उपयोग

		प्रति हेक्टेयर मात्रा				
फसल	कीट/रोग का सामान्य नाम	सक्रिय घटक (किलोग्राम)	संरचना (किग्रा)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल(दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटों में)
सेब	पामा	1.50□2.00	1.875□ 2.50	750□1000	□	□
लोबिया, ग्वार, मटर	चूर्णी फफूदी	1.50□2.00	1.875□ 2.50	750□1000	□	□
जीरा	चूर्णी फफूदी	1.50□2.00	1.875□ 2.50	750□1000	□	□
अंगूर	चूर्णी फफूदी	1.50□2.00	1.875□ 2.50	750□1000	□	□
आम	चूर्णी फफूदी	1.50□2.00	1.875□ 2.50	750□1000	□	□
गेहूँ	चूर्ण असिता रोग	2	2.5	500	24	□

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश
इसका उपयोग सल्फर से नुकसान होने वाली सब्जियों जैसे कुष्मांड कुल की सब्जियों आदि और सेब, नाशपाती व अन्य फलों की कुछ किस्में जहाँ पर तापमान 85 डिग्री फारेनहाइट या 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है, हानिकारक होता है।

उपयोग की मात्राएँ – सल्फर 80 प्रतिशत सूखा बहने वाला पानी में घुलनशील कणक है जिसमें सल्फर 80 प्रतिशत भार है तथा बाकी सक्रिय तत्व हैं। कणक का आकार 2 से 4 माइक्रोन होता है। इस कारण फसलों की सतह पर सक्रिय तत्व का स्तर दिखता है जिसके परिणाम अधिक असरदार होते हैं।

उपयोग में आने वाले यंत्र: खाली कोण वाले नोज़ल लगे सीधी नली वाले पीठ पर लादकर चलने वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें। पावर द्वारा चालित यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है।

प्रयोग का समय : सी.आई.बी. दिशानिर्देशों का पालन करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ
1.खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएँ।
3.छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचाएँ।
4.हवा की दिशा में छिड़काव करें। छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ।
5.छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6.छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण
उबकाई आना, उल्टी आना, सिरदर्द और साँस की नली में, आँखों में तथा फेफड़ों में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा
1. यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएँ। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएँ।
2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ।
3. यदि आँखें दूषित हो जाएँ तो उन्हें काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएँ।
4. यदि साँस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएँ।

पौधविषाक्तता
सुझाई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदीनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विष नाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
1. फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़-फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
2. प्रयोग किए गए डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें।
3. डिब्बों या बची हुई फफूंदीनाशक या धावन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी दूषित न हों।

संग्रहण की शर्ते
1. फफूंदीनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या अलमारी में रखें जो अन्य कमरों तथा अलमारियों से, जिनमें अन्य वस्तुएँ विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते हैं, उनसे दूर तथा ताला-चाबी में फफूंदीनाशक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से अलग-अलग अलमारियों में रखने चाहिए।
2. जिस जगह या अलमारी में फफूंदीनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार और आयतन में पर्याप्त रूप से लंबा-चौड़ा होना चाहिए, ताकि फफूंदीनाशक की भाप से वातावरण दूषित न हो।

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक	विवरण	मात्रा
1	सल्फर स.त.	□	80.00 % भार/भार
2	वेटिंग एजेंट	:सोडियम साल्ट ऑफ एल्केल नपैथेलिन सल्फोनिक एवं एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड कंडेन्सेट	2.00 % भार/भार
3	डिस्परसिग एजेन्ट	सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल सल्फोनिक एसिड कंडेन्सेट	8.00 % भार/भार
4	चाइना क्ले / काओलिन	□	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
	कुल		100 % भार/भार

सावधान: इस पर्चे में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

Hindi

सल्फर 80 टक्के पाण्यात विरघळणारे दाणेदार
(स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

हे सल्फर टेक्निकलपासून तयार केलेले दाणेदार स्वरूपाचे उत्पादन आहे, ज्यामध्ये वजनानुसार 80 टक्के सक्रिय घटक आहेत. याचा उपयोग पिकांवरील बुरशीजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी केला जातो.

शिफारस

		प्रति हेक्टर मात्रा				
पीक	रोग / किडीचे सामान्य नाव	सक्रिय घटक (कि.ग्रॅ.)	फॉर्म्युलेशन (कि.ग्रॅ.)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीनंतर काढणीपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक वापरानंतर पुन्हा प्रवेश (तास)
सफरचंद	स्कॅब	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
लोबिया, ग्वार, वाटाणा	पावडरी मिल्ड्यू	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
जिरे	पावडरी मिल्ड्यू	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
द्राक्ष	पावडरी मिल्ड्यू	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
आंबा	पावडरी मिल्ड्यू	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
गहू	पावडरी मिल्ड्यू	2	2.5	500	24	□

वापरासाठी दिशा-निर्देश
सल्फरमुळे नुकसान होणाऱ्या भाजीपाला पिकांमध्ये जसे की कुकुर्बिट कुलातील भाजीपाला तसेच सफरचंद, नाशपाती व इतर फळांच्या काही जातींमध्ये, जिथे तापमान 85 डिग्री फॅरेनहाइट किंवा 30 डिग्री सेल्सियस किंवा त्यापेक्षा जास्त असते, तेथे याचा वापर हानिकारक ठरू शकतो.

वापराची मात्रा – सल्फर 80 टक्के हे कोरडे वहनशील, पाण्यात विरघळणारे दाणेदार स्वरूपाचे उत्पादन आहे, ज्यामध्ये सल्फर 80 टक्के वजन असते आणि उर्वरित निष्क्रिय घटक असतात.
दाण्यांचा आकार 2 ते 4 मायक्रॉन असतो. यामुळे पिकांच्या पृष्ठभागावर सक्रिय घटकांचा थर तयार होतो आणि त्यामुळे परिणाम अधिक प्रभावी मिळतात.

वापरात येणारी उपकरणे :
रिकाम्या कोनाचा नोझल बसवलेली, सरळ नळीची, पाठीवर घेऊन चालविणारी फवारणी यंत्रे वापरावीत. पॉवरद्वारे चालणारी फवारणी यंत्रे देखील वापरता येतात.

फवारणीची वेळ : सी.आय.बी. मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.

वापरकर्त्यांसाठी खबरदारी
1. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामे भांडे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा.
2. तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा.
3. फवारणीतील वाफ श्वासाद्वारे शरीरात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी.
4. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे अवयव साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवावेत.
5. फवारणी करताना धूम्रपान, खाणे, पिणे किंवा काहीही चघळू नये.
6. फवारणी करताना किंवा द्रावण तयार करताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घालावेत.

विषबाधेची लक्षणे
मळमळ, उलटी, डोकेदुखी तसेच श्वसननलिका, डोळे आणि फुफ्फुसांमध्ये जळजळ होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार
1. चुकून गिळल्यास घशाच्या मागील भागाला गुदगुल्या करून उलटी करवावी.
उलटीतून बाहेर पडणारा पदार्थ स्वच्छ होईपर्यंत ही क्रिया करावी. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी करवू नये.
2. श्वासाद्वारे आत गेल्यास रुग्णाला तात्काळ स्वच्छ हवेत न्यावे.
3. कपडे किंवा त्वचा दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढून टाकावेत आणि त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवावी.
4. डोळे दूषित झाल्यास त्यांना सलाईन किंवा स्वच्छ पाण्याने सुमारे 10–15 मिनिटे धुवावे.

वनस्पतीविषाक्तता
शिफारस केलेल्या मात्रेनुसार वापर केल्यास हे बुरशीनाशक वनस्पतीविषारी ठरत नाही.

विषनाशक
कोणतेही विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नाही.
लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट
1. बुरशीनाशक उत्पादक किंवा वापरकर्त्याचे कर्तव्य आहे की डबे किंवा पात्रे फोडून, वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावीत.
2. वापरलेले डबे पुन्हा वापरासाठी उघडे ठेवू नयेत.
3. डबे किंवा उरलेले बुरशीनाशक किंवा धुण्याचे पाणी अशा प्रकारे टाकावे की आसपासच्या वस्तू व पिण्याचे पाणी दूषित होणार नाही.

साठवणुकीच्या अटी
1. बुरशीनाशकाचे डबे स्वतंत्र खोलीत किंवा कपाटात ठेवावेत, जिथे इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ किंवा पशुखाद्य साठवलेले नसावे,
2. तसेच प्रमाण व प्रकारानुसार कुलूपबंद स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावेत.
3. ज्या ठिकाणी किंवा कपाटात कीटकनाशक साठवले जाते ते ठिकाण मजबूत बांधकामाचे, कोरडे, प्रकाशयुक्त, हवेशीर आणि पुरेशी जागा असलेले असावे, जेणेकरून कीटकनाशकांच्या वाफेमुळे वातावरण दूषित होणार नाही."

रासायनिक संघटन

क्र.सं.	घटक	वर्णन	प्रमाण
1	सल्फर सक्रिय घटक	□	80.00 % भार/भार
2	ओलसर करणारा घटक	अल्किल नॅफ्थिलीन सल्फोनिक व अ◌ॅरोमॅटिक सल्फोनिक आम्लाच्या सोडियम क्षाराचे संघनन	2.00 % भार/भार
3	विसरणारा घटक	फिनॉल सल्फोनिक आम्लाच्या सोडियम क्षाराचे संघनन	8.00 % भार/भार
4	चायना क्ले / काओलिन	□	आवश्यक प्रमाण
	एकूण		100 % भार/भार

सूचना: या पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करु नये.

Marathi

સલ્ફર 80 ટકા પાણીમાં દ્રાવ્ય દાણાદાર
(સ્પર્શજન્ય ફૂગનાશક)

આ એક સલ્ફર ટેકનિકલથી બનાવાયેલ દાણાદાર ઉત્પાદન છે, જેમાં વજન અનુસાર 80 ટકા સક્રિય ઘટક હોય છે. આનો ઉપયોગ પાકોમાં ફૂગજન્ય રોગોના નિવારણ માટે કરવામાં આવે છે."

ભલામણ

		પ્રતિ હેક્ટર માત્રા				
પાક	રોગ / જીવાતનું સામાન્ય નામ	સક્રિય ઘટક (કિ.ગ્રા.)	ફોર્મ્યુલેશન (કિ.ગ્રા.)	પાણીનું પ્રમાણ (લિટર)	છેલ્લી છંટકાવથી કાપણી સુધી રાહ જોવાનો સમય (દિવસ)	દરેક ઉપયોગ પછી પુનઃપ્રવેશ (કલાક)
સફરજન	સ્કેબ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ચોળી, ગુવાર, વટાણા	પાવડરી મિલ્ડ્યૂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
જીરૂ	પાવડરી મિલ્ડ્યૂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
દ્રાક્ષ	પાવડરી મિલ્ડ્યૂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
કેરી	પાવડરી મિલ્ડ્યૂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ઘઉં	પાવડરી મિલ્ડ્યૂ	2	2.5	500	24	□

ઉપયોગ માટે માર્ગદર્શિકા
સલ્ફરથી નુકસાન થતું હોય તેવી શાકભાજી જેમ કે કુકર્બિટ કુળની શાકભાજી તથા સફરજન, નાશપતી અને અન્ય ફળોની કેટલીક જાતોમાં, જ્યાં તાપમાન 85 ડિગ્રી ફોરનહાઇટ અથવા 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે તેથી વધુ હોય, ત્યાં તેનો ઉપયોગ હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.

ઉપયોગની માત્રા – સલ્ફર 80 ટકા એક સુકું વહેતું, પાણીમાં દ્રાવ્ય દાણાદાર ઉત્પાદન છે, જેમાં સલ્ફર 80 ટકા વજન હોય છે અને બાકીના નિષ્ક્રિય ઘટકો હોય છે. દાણાનો કદ 2 થી 4 માઇક્રોન હોય છે. આ કારણે પાકની સપાટી પર સક્રિય ઘટકનું સ્તર બને છે અને પરિણામો વધુ અસરકારક મળે છે.

ઉપયોગમાં આવતાં સાધનો :
ખાલી કોણવાળા નોઝલ લગાવેલી, સીધી નળીવાળી, પીઠ પર લાદીને ચલાવાતી છંટકાવ યંત્રનો ઉપયોગ કરો. પાવરથી સંચાલિત છંટકાવ યંત્રનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

પ્રયોગનો સમય : સી.આઈ.બી. માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરો.

ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતી

ખાદ્ય સામગ્રી, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી વાસણો અને પશુઓના ચારા પરથી દૂર રાખો. મોઢું, ત્વચા અને આંખોનો સંપર્ક ટાળો.

છંટકાવની વરાળ શ્વાસ દ્વારા અંદર ન જાય તેની કાળજી લો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. છંટકાવ દરમિયાન ધુમ્રપાન, ખાવું, પીવું અથવા કંઈપણ ચાવવું નહીં.
છંટકાવ કરતા કે મિશ્રણ બનાવતા સમયે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો.

વિષના લક્ષણો
ઉબકા આવવું, ઊલટી થવી, માથાનો દુખાવો તથા શ્વાસનળી, આંખો અને ફેફસાંમાં બળતરા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર
1. જો ગળી લેવાય તો ગળાના પાછળના ભાગને ગદગદાવી ઊલટી કરાવો.
ઊલટીમાં બહાર આવતું દ્રવ્ય સાફ ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખો.
દર્દી બેહોશ હોય તો ઊલટી ન કરાવો.
2. જો કપડાં અથવા ત્વચા દૂષિત થઈ જાય તો દૂષિત કપડાં ઉતારી નાખો અને ત્વચાને પૂરતા પ્રમાણમાં સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો.
3. જો આંખો દૂષિત થઈ જાય તો તેને સેલાઇન અથવા સાફ પાણીથી આશરે 10–15 મિનિટ સુધી ધોઈ લો.
4. જો શ્વાસ દ્વારા અંદર ગયું હોય તો દર્દીને તરત શુદ્ધ હવામાં લઈ જાઓ.

વનસ્પતિવિષાક્તતા
ભલામણ કરેલી માત્રા મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ ફૂગનાશક પાક માટે વિષાળ નથી.

વિષનાશક
કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક ઉપલબ્ધ નથી.
લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ
1. ફૂગનાશકના ઉત્પાદક અથવા ઉપયોગકર્તાની ફરજ છે કે ડબ્બા અથવા પાત્રોને તોડી, વસતિથી દૂર જમીનમાં દફન કરી દેવા જોઈએ.
2. ઉપયોગમાં લીધેલા ડબ્બાઓને ફરી ઉપયોગ માટે ખુલ્લા રાખશો નહીં.
3. ડબ્બાઓ અથવા બચેલ ફૂગનાશક અથવા ધોવાણનું પાણી આ રીતે નિકાલ કરો કે આસપાસની વસ્તુઓ અને પીવાનું પાણી દૂષિત ન થાય.

સંગ્રહની શરતો
1. ફૂગનાશકના ડબ્બાઓ અલગ રૂમમાં અથવા અલમારીમાં રાખવા જોઈએ, જ્યાં અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો અથવા પશુઆહાર સંગ્રહિત ન હોય, તેમજ પ્રમાણ અને પ્રકાર મુજબ તાળા લગાવેલી અલગ-અલગ અલમારીઓમાં રાખવા જોઈએ.
2. જે સ્થળે અથવા અલમારીમાં કીટનાશકનો સંગ્રહ કરવો હોય તે સ્થળ મજબૂત બંધાણવાળું, સૂકું, પ્રકાશયુક્ત, હર
3. અને પૂરતું ખુલ્લું હોવું જોઈએ, જેથી કીટનાશકની વરાળથી વાતાવરણ દૂષિત ન થાય.

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વર્ણન	પ્રમાણ
1	સલ્ફર સક્રિય ઘટક	□	80.00 % વજન/વજન
2	ભીનું બનાવનાર ઘટક	અલ્કાઇલ નેફ્થિલીન સલ્ફોનિક અને એરોમેટિક સલ્ફોનિક એસિડના સોડિયમ લવણનું સંઘનન	2.00 % વજન/વજન
3	વિખેરનાર ઘટક	ફિનોલ સલ્ફોનિક એસિડના સોડિયમ લવણનું સંઘનન	8.00 % વજન/વજન
4	ચાઇના ક્લે / કેઓલિન	□	જરૂરી માત્રા
	કુલ		100 % વજન/વજન

ચેતવણી: આ પત્રકમાં દર્શાવેલી ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પાકમાં ઉપયોગ ન કરવો.

Gujarati

ਸਲਫਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਦਾਣੇਦਾਰ
(ਸਪਰਸ਼ੀ ਫਫ਼ੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ)

ਇਹ ਸਲਫਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਣੇਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਫ਼ੂੰਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਫਾਰਸ਼

		ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ				
ਫਸਲ	ਬਿਮਾਰੀ / ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਤਿਆਰ ਦਵਾਈ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕੱਟਾਈ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟੇ)
ਸੇਬ	ਸਕੈਬ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ਲੋਬੀਆ, ਗੁਆਰ, ਮਟਰ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ਜੀਰਾ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ਅੰਗੂਰ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ਅੰਬ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ਗੇਹੂੰ	ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਡਿਊ	2	2.5	500	24	□

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 85 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਜਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ – ਸਲਫਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਤੋਂ 4 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ :
ਖਾਲੀ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਨਲੀ ਵਾਲੀ, ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਾਦ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।
ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
2. ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਬਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।
6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਵਿਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮਤਲੀ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਲਾਜ
1. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ।
ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਦਾਰਥ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
2. ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
3. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10–15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੋਵੋ।
4. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ

ਪੌਧਾ-ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੌਧਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਟਕਰਨ
1. ਫਫ਼ੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ।
2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।
3. ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫਫ਼ੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਸ਼ਟਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
1. ਫਫ਼ੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
2. ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
3. ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਕੀ, ਰੌਸ਼ਨ, ਰ
4. ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਘਟਕ	ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ
1	ਸਲਫਰ ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ	□	80.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
2	ਭਿੱਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਟਕ	ਅਲਕਾਇਲ ਨੇਫਥੀਲੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰੋਮੈਟਿਕ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ ਦਾ ਸੰਘਨਨ	2.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
3	ਵਿਖੇਰਣ ਵਾਲਾ ਘਟਕ	ਫੀਨੋਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲਵਣ ਦਾ ਸੰਘਨਨ	8.00 % ਭਾਰ/ਭਾਰ
4	ਚਾਈਨਾ ਕਲੇ / ਕਾਓਲਿਨ	□	ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
	ਕੁੱਲ		100 % ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਪੰਫ਼ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

সালফার 80 শতাংশ পানিতে দ্রবণীয় দানাদার (স্পর্শজাত ছত্রাকনাশক)

এটি সালফার টেকনিক্যাল দিয়ে তৈরি একটি দানাদার পণ্য, যাতে ওজন অনুযায়ী 80 শতাংশ সক্রিয় উপাদান রয়েছে। এটি ফসলের ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সুপারিশ

		প্রতি হেক্টর মাত্রা				
ফসল	রোগ / পোকার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (কিলোগ্রাম)	প্রস্তুত দ্রব্য (কিলোগ্রাম)	পানির পরিমাণ (লিটার)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার অপেক্ষাকাল (দিন)	প্রতিবার ব্যবহারের পর পুনঃপ্রবেশ (ঘণ্টা)
আপেল	স্ক্যাব	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
লোবিয়া, গুয়ার, মটর	পাউডারি মিলডিউ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
জিরা	পাউডারি মিলডিউ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
আঙুর	পাউডারি মিলডিউ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
আম	পাউডারি মিলডিউ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
গম	পাউডারি মিলডিউ	2	2.5	500	24	□

ব্যবহারের নির্দেশাবলী
যেসব সবজিতে সালফারের কারণে ক্ষতি হয়, যেমন কুমড়ো জাতীয় সবজি এবং আপেল, নাশপাতি ও অন্যান্য ফলের কিছু জাতের ক্ষেত্রে, যেখানে তাপমাত্রা 85 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা তার বেশি হয়, সেখানে এর ব্যবহার ক্ষতিকর হতে পারে।

ব্যবহারের মাত্রা – সালফার 80 শতাংশ একটি শুকনো প্রবাহমান, পানিতে দ্রবণীয় দানাদার পণ্য, যাতে সালফার 80 শতাংশ ওজন থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ নিষ্ক্রিয় উপাদান। দানার আকার 2 থেকে 4 মাইক্রন হয়। এর ফলে ফসলের পৃষ্ঠে সক্রিয় উপাদানের একটি স্তর তৈরি হয় এবং ফলাফল আরও কার্যকর হয়।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি :
ফাঁপা কোণযুক্ত নোজল লাগানো, সোজা নলবিশিষ্ট, পিঠে বহনযোগ্য স্প্রে যন্ত্র ব্যবহার করুন।পাওয়ার চালিত স্প্রে যন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রয়োগের সময় : সি.আই.বি. নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা
1. খাদ্যসামগ্রী, খাদ্যসামগ্রীর খালি পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
2. মুখ, ত্বক এবং চোখের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
3. স্প্রের বাষ্প শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকুন। বাতাসের দিক অনুসারে স্প্রে করুন।
4. স্প্রের পর দূষিত পোশাক এবং শরীরের অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
5. স্প্রে করার সময় ধূমপান, খাওয়া, পান করা বা কিছু চিবানো নিষিদ্ধ।
6. স্প্রে করা বা মিশ্রণ প্রস্তুত করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন।

বিষের লক্ষণ
বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, মাথাব্যথা এবং শ্বাসনালী, চোখ ও ফুসফুসে জ্বালা হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
1. গিলে ফেললে গলার পেছনে গুদগুদে দিয়ে বমি করান। বমির সঙ্গে বের হওয়া পদার্থ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। রোগী অচেতন হলে বমি করাবেন না।
2. কাপড় বা ত্বক দূষিত হলে দূষিত কাপড় খুলে ফেলুন এবং ত্বক প্রচুর সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
3. চোখ দূষিত হলে স্যালাইন বা পরিষ্কার পানি দিয়ে প্রায় 10–15 মিনিট ধুয়ে নিন।
4 শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে রোগীকে দ্রুত পরিষ্কার বাতাসে নিয়ে যান।

উদ্ভিদ বিষাক্ততা
প্রস্তাবিত মাত্রা অনুযায়ী ব্যবহার করলে এই কীটনাশক উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত নয়।

বিষনাশক
কোনো নির্দিষ্ট বিষনাশক নেই।
লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

খালি ডিব্বার নিষ্পত্তি
1. ছত্রাকনাশক প্রস্তুতকারক বা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হলো ডিব্বা বা পাত্র ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা।
2. ব্যবহৃত ডিব্বাগুলো পুনরায় ব্যবহারের জন্য খোলা অবস্থায় রাখবেন না।
3. ডিব্বা বা অবশিষ্ট ছত্রাকনাশক কিংবা ধোয়ার পানি এমনভাবে নিষ্পত্তি করুন যাতে আশপাশের জিনিসপত্র ও পানীয় জল দূষিত না হয়।

সংরক্ষণের শর্তাবলী
1. ছত্রাকনাশকের ডিব্বাগুলো আলাদা কক্ষ বা আলমারিতে রাখুন, যেখানে অন্য কোনো সামগ্রী, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য বা পশুখাদ্য সংরক্ষিত না থাকে,
এবং পরিমাণ ও প্রকার অনুযায়ী তালাবদ্ধ আলাদা আলাদা আলমারিতে রাখুন।
2. যেখানে বা যে আলমারিতে কীটনাশক সংরক্ষণ করা হবে তা মজবুত নির্মাণের, শুষ্ক, আলোকিত, বায়ুচলাচলযুক্ত
3. এবং পর্যাপ্ত জায়গাযুক্ত হওয়া উচিত, যাতে কীটনাশকের বাষ্পে পরিবেশ দূষিত না হয়

রাসায়নিক সংমিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	বিবরণ	পরিমাণ
1	সালফার সক্রিয় উপাদান	□	80.00 % ওজন/ওজন
2	ভেজানো উপাদান	অ্যালকাইল ন্যাফথিলিন সালফোনিক ও অ্যারোম্যাটিক সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সংযোজন	2.00 % ওজন/ওজন
3	বিস্তারক উপাদান	ফেনল সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সংযোজন	8.00 % ওজন/ওজন
4	চায়না ক্লে / কাওলিন	□	প্রয়োজনীয় পরিমাণ
	মোট		100 % ওজন/ওজন

সতর্কতা: এই লিফলেটে উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

سلفر 80 فیصد پانی میں حل ہونے والے دانے دار (اسپرشی فنگس کش)

یہ سلفر ٹیکنیکل سے تیار کردہ دانے دار شکل کی دوا ہے جس میں وزن کے اعتبار سے 80 فیصد فعال جز" شامل ہے۔
"اس کا استعمال فصلوں میں فنگس کی روک تھام کے لیے کیا جاتا ہے

سفارش

		فی بیکٹر مقدار				
فصل	بیماری / کیڑے کا نام	فعال جزو (کلوگرام)	تیار دوا (کلوگرام)	پانی کی مقدار (لیٹر)	آخری اسپرے سے برداشت تک وقفہ (دن)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹے)
سیب	اسکیب	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
لوبیا، گوار، مٹر	پاؤڈری میلڈیو	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
زیرہ	پاؤڈری میلڈیو	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
انگور	پاؤڈری میلڈیو	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
آم	پاؤڈری میلڈیو	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
گندم	پاؤڈری میلڈیو	2	2.5	500	24	□

استعمال کے لیے ہدایات"
سلفر سے نقصان پہنچنے والی سبزیاں جیسے کدو کے خاندان کی سبزیاں وغیرہ اور
،سیب، ناشپاتی اور دیگر پھلوں کی کچھ اقسام میں
،جہاں درجہ حرارت 85 ڈگری فارن ہائیٹ یا 30 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ ہو
وہاں اس دوا کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔

،استعمال کی مقداریں – سلفر 80 فیصد ایک خشک، آسانی سے بہنے والا
پانی میں حل ہونے والا دانے دار مرکب ہے، جس میں سلفر 80 فیصد وزن کے اعتبار سے شامل ہے
اور باقی غیر فعال اجزاء ہوتے ہیں۔
دانے کا سائز 2 سے 4 مائیکرون ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے فصل کی سطح پر فعال جز کی تہہ بن جاتی ہے
جس کے نتیجے میں اثر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

استعمال ہونے والے آلات :
،کھلے کون والے نوزل کے ساتھ
سیدھی نالی والا، پیٹھ پر لاد کر چلنے والا اسپرے آلہ استعمال کریں۔
طاقت سے چلنے والے اسپرے آلے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔

استعمال کا وقت : سی-آئی-بی- ہدایات پر عمل کریں۔

استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر
خوراک، خوراک کے خالی برتن اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ .1
منہ، جلد اور آنکھوں کے رابطے سے بچائیں۔ .2
اسپرے کی بھاپ کو سانس کے ذریعے اندر جانے سے بچائیں۔ ہوا کی سمت میں اسپرے کریں۔ .3
اسپرے کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ .4
اسپرے کے دوران تمباکو نوشی، کھانا، پینا اور کچھ چبانا منع ہے۔ .5
اسپرے کرتے یا دوا ملاتے وقت مکمل حفاظتی کپڑے پہنیں۔ 6

زہر کی علامات
متلی، قے، سر درد، سانس کی نالی، آنکھوں اور پھیپھڑوں میں جلن ہو سکتی ہے۔

ابتدائی طبی امداد
اگر نگل لیا جائے تو گلے کے پچھلے حصے کو چھیڑ کر قے کروائیں۔ .1
اس عمل کو اس وقت تک دہرائیں جب تک قے کے ذریعے نکلا ہوا مادہ صاف نہ ہو جائے۔
اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کروائیں۔

اگر کپڑے یا جلد آلودہ ہو جائیں تو آلودہ کپڑے اتار دیں اور .2
جلد کو وافر مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔

اگر آنکھیں آلودہ ہو جائیں تو انہیں وافر مقدار میں سیلائن یا صاف پانی سے .3
تقریباً 10–15 منٹ تک دھوئیں۔

اگر سانس کے ذریعے اندر چلا گیا ہو تو مریض کو فوراً صاف ہوا میں لے جائیں۔ .4

پودوں پر زہریلا اثر
تجویز کردہ مقدار کے مطابق استعمال کرنے پر یہ دوا پودوں کے لیے زہریلی نہیں ہے۔

زہر کا تریاق
کوئی مخصوص تریاق موجود نہیں ہے۔
علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کا تصرف
فنگس کش بنانے والے یا استعمال کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے .1
کہ ڈبوں یا برتنوں کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کریں۔
استعمال شدہ ڈبوں کو دوبارہ استعمال کے لیے باہر نہ چھوڑیں۔ .2
ڈبوں یا بچی ہوئی فنگس کش دوا یا دھونے کے پانی کو .3
اس طرح تلف کریں کہ آس پاس کی اشیاء اور پینے کا پانی آلودہ نہ ہو۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط
فنگس کش کے ڈبوں کو الگ کمروں یا الماریوں میں رکھیں .1
،جو ان کمروں یا الماریوں سے الگ ہوں جہاں دیگر اشیاء
،خاص طور پر خوراک یا جانوروں کی خوراک رکھی جاتی ہو
اور کیمیائی ترکیب کے مطابق تالہ بند الگ الگ الماریوں میں رکھیں۔

جس جگہ یا الماری میں کیڑے مار دوا ذخیرہ کی جائے .2
وہ مضبوط ساخت کی، خشک، روشن، ہوادار اور
، حجم میں مناسب ہونی چاہیے
"تاکہ کیڑے مار دوا کی بھاپ سے ماحول آلودہ نہ ہو۔

کیمیائی ترکیب

شمار	جزو	وضاحت	مقدار
1	سلفر فعال جزو	□	80.00 % وزن/وزن
2	گیلا کرنے والا جزو	الکائل نیفتھلین اور آرومیٹک سلفونک تیزاب کا سوڈیم نمک	2.00 % وزن/وزن
3	منتشر کرنے والا جزو	فینول سلفونک تیزاب کا سوڈیم نمک	8.00 % وزن/وزن
4	چائنا مٹی / کیولن	□	حسب ضرورت
	کل		100 % وزن/وزن

احتیاط: اس لیف لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

Urdu

സൾഫർ 80 ശതമാനം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന കണികകളായ രൂപം (സ്പർശസ്വഭാവമുള്ള ഫംഗിസൈഡ്)

"ഇത് സൾഫർ ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കണികകളായ ഉൽപ്പന്നമാണ്, ഇതിൽ ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 80 ശതമാനം സജീവ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിളകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശ

		ഹെക്ടറിന് അളവ്				
വിള	രോഗം / കീടത്തിന്റെ പേര്	സജീവ ഘടകം (കിലോഗ്രാം)	തയ്യാറാക്കൽ (കിലോഗ്രാം)	വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന തളിക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ ഇടവേള (ദിവസങ്ങൾ)	ഓരോ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രവേശനം (മണിക്കൂർ)
ആപ്പിൾ	സ്കാബ്	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ലോബിയ, ഗ്വാർ, പയർ	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ജീരകം	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
മുന്തിരി	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
മാങ്ങ	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ഗോതമ്പ്	പൗഡറി മിൽഡ്യൂ	2	2.5	500	24	□

"ഉപയോഗ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സൾഫർ മൂലം നാശം സംഭവിക്കാവുന്ന കുക്കർബിറ്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും,
ആപ്പിൾ, പെയർ എന്നിവയും മറ്റ് ചില പഴവർഗങ്ങളും,
താപനില 85 ഡിഗ്രി ഫാറൻഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിലധികം ആയിടങ്ങളിൽ
ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഹാനികരമായിരിക്കും.

ഉപയോഗ അളവുകൾ – സൾഫർ 80 ശതമാനം എന്നത് ഉണങ്ങിയ നിലയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകുന്ന,
വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന കണികകളായ ഉൽപ്പന്നമാണ്, ഇതിൽ സൾഫർ 80 ശതമാനം ഭാരമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
മറ്റുള്ളവ അക്രിയ ഘടകങ്ങളാണ്.
കണികകളുടെ വലുപ്പം 2 മുതൽ 4 മൈക്രോൺ വരെയാണ്.
ഇതിനാൽ വിളകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സജീവ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു പാളി രൂപപ്പെടുകയും
ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ :
ഒഴുവായ കോൺ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച, നേരായ പൈപ്പുള്ള,
പുറത്ത് ചുമന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കണം.
ശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

പ്രയോഗ സമയം : സി.ഐ.ബി. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.
2. വായ, ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
3. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ശ്വസനത്തിലൂടെ അകത്ത് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
4. സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനിടെ പുകവലി, ഭക്ഷണം, പാനം എന്നിവയും എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കലും ഒഴിവാക്കണം.
6. സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ കലർക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം.

വിഷലക്ഷണങ്ങൾ
മനംമറക്കം, ഛർദ്ദി, തലവേദന, ശ്വാസനാളം, കണ്ണുകൾ, ശ്വാസകോശം എന്നിവയിൽ കത്തൽ അനുഭവപ്പെടാം.

പ്രാഥമിക ചികിത്സ
1. അബദ്ധത്തിൽ വിഴുങ്ങിയാൽ, തൊണ്ടയുടെ പിൻഭാഗം ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഛർദ്ദി വരുത്തണം.
ഛർദ്ദിയിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന വസ്തു ശുദ്ധമാകുന്നതുവരെ ഈ നടപടി തുടരുക.
രോഗി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്.
2. വസ്ത്രങ്ങളോ ചർമ്മമോ മലിനമായാൽ, മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി,
3. ചർമ്മം ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
4. കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ, സാലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 10–15 മിനിറ്റ് കഴുകുക.
ശ്വസനത്തിലൂടെ അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗിയെ ഉടൻ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക.

സസ്യവിഷാംശം
ശുപാർശ ചെയ്ത അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കീടനാശിനി സസ്യങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ല.

വിഷനാശിനി
പ്രത്യേകമായ വിഷനാശിനി ഇല്ല.
ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകണം.

ശൂന്യ പാത്രങ്ങളുടെ നശീകരണം
1. ഫംഗിസൈഡ് നിർമ്മാതാവിന്റെയോ ഉപയോക്താവിന്റെയോ കടമയാണ് പാത്രങ്ങൾ തകർത്തു,
താമസ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നത്.
2. ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുവയ്ക്കരുത്.
3. പാത്രങ്ങളോ ശേഷിച്ച ഫംഗിസൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയ വെള്ളമോ
ചുറ്റുപാടുകളെയും കുടിവെള്ളത്തെയും മലിനമാക്കാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ
1. ഫംഗിസൈഡിന്റെ പാത്രങ്ങൾ വേറിട്ട മുറികളിലോ അലമാരകളിലോ സൂക്ഷിക്കണം;
അവിടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോ മൃഗാഹാരമോ സൂക്ഷിക്കരുത്,
കൂടാതെ അളവും തരവും അനുസരിച്ച് പൂട്ടിയ വേറിട്ട അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിക്കണം.
2. കീടനാശിനി സംഭരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അലമാരി ശക്തമായ നിർമ്മാണമുള്ളതും, വരണ്ടതും, വെളിച്ചമുള്ളതും, വായുസഞ്ചാരം ഉള്ളതും,
മതിയായ വിസ്തൃതിയുള്ളതുമായിരിക്കണം,
അങ്ങനെ കീടനാശിനിയുടെ വാതകം പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുകയില്ല."

രാസഘടന

ക്രമ നമ്പർ	ഘടകം	വിവരണം	അളവ്
1	സൾഫർ സജീവ ഘടകം	□	80.00 % ഭാരം/ഭാരം
2	ഈർപ്പകാരകം	അൽകൈൽ നാഫ്തിലീൻ, അരോമാറ്റിക് സൾഫോണിക് ആസിഡുകളുടെ സോഡിയം ഉപ്പ്	2.00 % ഭാരം/ഭാരം
3	വിതരണ ഘടകം	ഫിനോൾ സൾഫോണിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം ഉപ്പ്	8.00 % ഭാരം/ഭാരം
4	ചൈന ക്ലേ / കയോളിൻ	□	ആവശ്യത്തിന്
	ആകെ		100 % ഭാരം/ഭാരം

ജാഗ്രത: ഈ ലിഫ്ലറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിളകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

Malayalam

ಸಲ್ಫರ್ 80 ಶೇಕಡಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದಾಣೆದಾರ (ಸ್ಪರ್ಶೀಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ದಾಣೆದಾರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 80 ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ	ರೋಗ / ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ □ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ (ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ)	ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ □ ತಯಾರಿಕೆ (ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲುವರೆಗೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಮರು ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆ)
ಸೇಬು	ಸ್ಕ್ಯಾಬ್	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ಲೋಬಿಯಾ, ಗ್ವಾರ್, ಬಟಾಣಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ಜೀರಿಗೆ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ಮಾವು	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ಗೋಧಿ	ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ	2	2.5	500	24	□

ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಸಲ್ಫರ್‌ನಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಕರ್ಬಿಟ್ ಕುಟುಂಬದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರ
ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನ 85 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರೆನ್‌ಹೀಟ್ ಅಥವಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಲ್ಲಿ,
ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ – ಸಲ್ಫರ್ 80 ಶೇಕಡಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದಾಣೆದಾರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ 80 ಶೇಕಡಾ ತೂಕವಿದ್ದು ಉಳಿದವು ಕ್ರಿಯಾರಹಿತ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ದಾಣೆಗಳ ಗಾತ್ರ 2 ರಿಂದ 4 ಮೈಕ್ರಾನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ದ್ರವ್ಯದ ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು :
ಖಾಲಿ ಕೋನದ ನೋಜಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ, ನೇರ ನಳಿಯಿರುವ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಳಸುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯ : ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು.
2.ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆವಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು.
4. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಊಟ, ಪಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಚವಚವಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
6. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಭಾವನೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1. ತಪ್ಪಾಗಿ ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಚುರುಕುಮಾಡಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ವಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.
ರೋಗಿ ಅಚೇತನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬಾರದು.
2. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
4. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು.

ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತನ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷನಾಶಕ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷನಾಶಕ ಇಲ್ಲ.
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.
2.ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆಂದು ತೆರೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಾರದು.
3. ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು
1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು; ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಪಶುಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧದ ಪ್ರಕಾರ ತಾಳೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಅಲಮಾರಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಬೆಳಕುಳ್ಳದು, ಗಾಳಿಚಲನವಲನ ಇರುವದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು; ಇದರಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕದ ಆವಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದು."

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ	ಪ್ರಮಾಣ
1	ಸಲ್ಫರ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ	□	80.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
2	ತೇವಕಾರಕ ಘಟಕ	ಅಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
3	ವಿಸರಣಾ ಘಟಕ	ಫೀನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	8.00 % ತೂಕ/ತೂಕ
4	ಚೈನಾ ಮಣ್ಣು / ಕಾಯೋಲಿನ್	□	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ
	ಒಟ್ಟು		100 % ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಿಫ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

சல்பர் 80 சதவீதம் தண்ணீரில் கரையக்கூடிய துகள்மயமானது (தொடர்புச் செயல் கொண்ட பூஞ்சைநாசினி)

"இது சல்பர் டெக்னிக்கல் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட துகள்மயமான தயாரிப்பாகும், இதில் எடை அடிப்படையில் 80 சதவீதம் செயலில் உள்ள கூறுகள் உள்ளன. இந்த தயாரிப்பு பயிர்களில் ஏற்படும் பூஞ்சை நோய்களைத் தடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரை

		ஹெக்டேருக்கு அளவு				
பயிர்	நோய் / பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	செயலில் உள்ள கூறு (கிலோகிராம்)	தயாரிப்பு (கிலோகிராம்)	நீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கான இடைவெளி (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்குப் பின் மீள் நுழைவு (மணிநேரம்)
ஆப்பிள்	ஸ்கேப்	1.50□2.00	1.875□2.50	750□ 1000	□	□
லோபியா, குவார், பட்டாணி	பவுடரி மில்டியூ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□ 1000	□	□
சீரகம்	பவுடரி மில்டியூ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□ 1000	□	□
திராட்சை	பவுடரி மில்டியூ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□ 1000	□	□
மாம்பழம்	பவுடரி மில்டியூ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□ 1000	□	□
கோதுமை	பவுடரி மில்டியூ	2	2.5	500	24	□

"பயன்பாட்டிற்கான வழிமுறைகள்
சல்பர் காரணமாக சேதம் ஏற்படும் காய்கறிகள், உதாரணமாக குக்குர்பிட் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த காய்கறிகள் மற்றும் ஆப்பிள், பேரிக்காய் மற்றும் பிற பழங்களின் சில வகைகளில், வெப்பநிலை 85 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அல்லது 30 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும் இடங்களில், இந்த தயாரிப்பின் பயன்பாடு தீங்கானதாக இருக்கலாம்.

பயன்பாட்டு அளவு – சல்பர் 80 சதவீதம் என்பது உலர் நிலையில் நன்கு பாயக்கூடிய, தண்ணீரில் கரையக்கூடிய துகள்மயமான தயாரிப்பாகும், இதில்
சல்பர் 80 சதவீதம் எடை உள்ளது மற்றும் மீதமுள்ளவை செயலற்ற கூறுகளாகும். துகள்களின் அளவு 2 முதல் 4 மைக்ரான் வரை இருக்கும். இதன் காரணமாக பயிர்களின் மேற்பரப்பில் செயலில் உள்ள கூறுகளின் அடுக்கு உருவாகி, அதிக செயல்திறன் பெறப்படுகிறது.

பயன்பாட்டில் வரும் கருவிகள் :
வெற்று கோண நுழைவாயில்கள் (நோசில்) பொருத்தப்பட்ட, நேரான குழாய் கொண்ட, முதுகில் சுமந்து பயன்படுத்தப்படும் தெளிப்பான் கருவியை பயன்படுத்தவும். மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் தெளிப்பான் கருவிகளையும் பயன்படுத்தலாம்.

பயன்படுத்தும் நேரம் : சி.ஐ.பி. வழிகாட்டி விதிமுறைகளை பின்பற்றவும்.

பயன்படுத்துவோருக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்
உணவுப் பொருட்கள், உணவுப் பொருட்களின் காலி பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனத்திலிருந்து விலகி வைக்கவும்.
வாய், தோல் மற்றும் கண்களுடன் தொடர்பு ஏற்படாமல் தவிர்க்கவும்.
தெளிப்பின் போது உருவாகும் வாயுக்கள் சுவாசத்தின் மூலம் உட்புகாமல் கவனிக்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும்.
தெளிப்புக்குப் பிறகு மாசடைந்த உடைகள் மற்றும் உடலின் பகுதிகளை நன்றாக கழுவவும்.
தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், உணவு உட்கொள்வது, பானம் அருந்துவது அல்லது ஏதேனும் மெல்வது கூடாது.
தெளிக்கும் போது அல்லது கலவை தயாரிக்கும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

விஷத்தன்மையின் அறிகுறிகள்
வாந்தி உணர்வு, வாந்தி, தலைவலி மற்றும் மூச்சுக் குழாய், கண்கள் மற்றும் நுரையீரலில் எரிச்சல் ஏற்படலாம்.

முதற்கட்ட மருத்துவ உதவி
1. தவறுதலாக உட்கொண்டால் தொண்டையின் பின்புறத்தை தூண்டி வாந்தி ஏற்படுத்தவும்.
வாந்தியுடன் வெளியே வரும் பொருள் தெளிவாகும் வரை இந்த செயல்முறையை தொடரவும்.
பாதிக்கப்பட்டவர் மயக்க நிலையில் இருந்தால் வாந்தி ஏற்படுத்த வேண்டாம்.
2. உடைகள் அல்லது தோல் மாசடைந்தால், மாசடைந்த உடைகளை அகற்றி, தோலை போதுமான அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவும்.
3. கண்கள் மாசடைந்தால், சாலைன் அல்லது சுத்தமான தண்ணீரால் சுமார் 10–15 நிமிடங்கள் கழுவவும்.
4. சுவாசத்தின் மூலம் உட்புகுந்திருந்தால், பாதிக்கப்பட்டவரை உடனடியாக தூய காற்று உள்ள இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும்.

தாவர விஷத்தன்மை
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவின் படி பயன்படுத்தினால், இந்த பூச்சிக்கொல்லி தாவரங்களுக்கு விஷமாக இருக்காது.

விஷநாசினி
குறிப்பிட்ட விஷநாசினி எதுவும் இல்லை.
அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை செய்யவும்.

காலி டப்பாக்களின் அகற்றல்
1. பூஞ்சைநாசினி தயாரிப்பாளர் அல்லது பயனர், டப்பாக்கள் அல்லது பாத்திரங்களை உடைத்து, குடியிருப்புகளிலிருந்து தூரத்தில் மண்ணில் புதைக்க வேண்டும்.
2. பயன்படுத்தப்பட்ட டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்காக வெளியில் திறந்தவாறு வைக்கக்கூடாது.
3. டப்பாக்கள் அல்லது மீதமுள்ள பூஞ்சைநாசினி அல்லது கழுவிய நீரை, சுற்றுப்புற பொருட்களும் குடிநீரும் மாசடையாத வகையில் அகற்ற வேண்டும்.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்
1. பூஞ்சைநாசினி டப்பாக்களை தனித்த அறைகளில் அல்லது அலமாரிகளில் வைக்க வேண்டும்; அங்கு உணவுப் பொருட்கள் அல்லது கால்நடை தீவனம் போன்றவை சேமிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது,
மேலும் அளவு மற்றும் வகைக்கு ஏற்ப பூட்டப்பட்ட தனித்தனியான அலமாரிகளில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
2. பூச்சிக்கொல்லி சேமிக்கப்படும் இடம் அல்லது அலமாரி உறுதியான கட்டமைப்புடன், உலர்ந்த, நல்ல ஒளியுடன், காற்றோட்டமுள்ள
3. மற்றும் போதிய இடவசதியுடன் இருக்க வேண்டும், அப்போது பூச்சிக்கொல்லியின் வாயுக்களால் சூழல் மாசடையாது."

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	கூறு	விளக்கம்	அளவு
1	சல்பர் செயற்கூறு	□	80.00 % எடை/எடை
2	ஈரப்படுத்தும் காரகம்	அல்கைல் நாப்திலீன் மற்றும் அரோமேட்டிக் சல்போனிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு	2.00 % எடை/எடை
3	சிதறல் காரகம்	ஃபீனால் சல்போனிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு	8.00 % எடை/எடை
4	சைனா களிமண் / கயோலின்	□	தேவையான அளவு
	மொத்தம்		100 % எடை/எடை

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

Tamil

సల్ఫర్ 80 శాతం నీటిలో కరిగే దాణాదార (స్పర్శజన్య శిలీంధ్రనాశకము)

ఇది సల్ఫర్ టెక్నికల్‌తో తయారు చేసిన దాణాదార ఉత్పత్తి, ఇందులో బరువు ప్రకారం 80 శాతం క్రియాశీల పదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ ఉత్పత్తిని పంటల్లో వచ్చే శిలీంధ్ర రోగాల నివారణకు ఉపయోగిస్తారు.

సిఫారసు

		హెక్టారుకు మోతాదు				
పంట	వ్యాధి / పురుగు పేరు	క్రియాశీల పదార్థం (కిలోగ్రాములు)	తయారీ (కిలోగ్రాములు)	నీటి పరిమాణం (లీటర్లు)	చివరి పిచికారీ నుండి కోత వరకు వ్యవధి (రోజులు)	ప్రతి వినియోగం తరువాత మళ్ళీ ప్రవేశం (గంటలు)
ఆపిల్	స్కాబ్	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
లోబియా, గ్వార్, బఠాణీ	పౌడరీ మిల్డ్యూ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
జీలకర్ర	పౌడరీ మిల్డ్యూ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
ద్రాక్ష	పౌడరీ మిల్డ్యూ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
మామిడి	పౌడరీ మిల్డ్యూ	1.50□2.00	1.875□2.50	750□1000	□	□
గోధుమ	పౌడరీ మిల్డ్యూ	2	2.5	500	24	□

వినియోగానికి మార్గదర్శకాలు
సల్ఫర్ వల్ల నష్టం కలిగే కూరగాయలు, ఉదాహరణకు కుకుర్బిట్ కుటుంబానికి చెందిన కూరగాయలు మరియు ఆపిల్, పెరుగు, ఇతర
పండ్ల కొన్ని రకాలలో, ఉష్ణోగ్రత 85 డిగ్రీ ఫారెన్‌హీట్ లేదా 30 డిగ్రీ సెల్సియస్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల,
ఈ ఉత్పత్తి వినియోగం హానికరంగా ఉండవచ్చు.

వినియోగ మోతాదు – సల్ఫర్ 80 శాతం అనేది పొడి రూపంలో సులభంగా ప్రవహించే, నీటిలో కరిగే దాణాదార ఉత్పత్తి, ఇందులో
సల్ఫర్ 80 శాతం బరువు ఉంటుంది మరియు మిగతా భాగం క్రియారహిత పదార్థాలుగా ఉంటుంది. దాణాల పరిమాణం 2 నుండి 4 మైక్రాన్‌ల వరకు ఉంటుంది. దీని వల్ల పంటల ఉపరితలంపై క్రియాశీల పదార్థాల పొర ఏర్పడి, ఫలితాలు మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.

వినియోగంలో ఉపయోగించే పరికరాలు :
ఖాళీ కోణ నోజిల్ అమర్చిన, నేరుగా ఉన్న పైప్‌తో, వెనుకకు మోసుకునే స్ప్రేయర్‌ను ఉపయోగించాలి. శక్తితో నడిచే స్ప్రేయర్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రయోగ సమయం : సి.ఐ.బి. మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలి.

వినియోగదారుల కోసం జాగ్రత్తలు
1. ఆహార పదార్థాలు, ఆహార పదార్థాల ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశువుల మేత నుండి దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోరు, చర్మం మరియు కళ్లతో సంపర్కాన్ని నివారించాలి.
3. స్ప్రే సమయంలో ఏర్పడే ఆవిరులు శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. గాలి దిశలో స్ప్రే చేయాలి.
4. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి.
5. స్ప్రే చేసే సమయంలో పొగ త్రాగడం, తినడం, త్రాగడం లేదా ఏదైనా నమలడం చేయకూడదు.
6. స్ప్రే చేయడం లేదా మిశ్రమం తయారు చేసే సమయంలో పూర్తిస్థాయి రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి.

విష లక్షణాలు
వాంతి భావం, వాంతులు, తలనొప్పి మరియు శ్వాసనాళం, కళ్లలో మరియు ఊపిరితిత్తుల్లో మంట కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స
1. పొరపాటున మింగినట్లయితే గొంతు వెనుక భాగాన్ని గుదగుదల చేసి వాంతి చేయించాలి. వాంతితో బయటకు వచ్చే పదార్థం శుభ్రంగా వచ్చే వరకు ఈ ప్రక్రియను కొనసాగించాలి. బాధితుడు అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించకూడదు.
2. బట్టలు లేదా చర్మం కలుషితమైతే కలుషితమైన బట్టలను తొలగించి, చర్మాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి.
కళ్ళు కలుషితమైతే సాలైన్ లేదా శుభ్రమైన నీటితో సుమారు 10–15 నిమిషాలు కడగాలి. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్లినట్లయితే బాధితుడిని వెంటనే శుద్ధమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్లాలి.

వృక్ష విషతత్వం
సిఫారసు చేసిన మోతాదు ప్రకారం వినియోగించినప్పుడు ఈ పురుగుమందు మొక్కలకు విషంగా ఉండదు.

విషనాశకము
ప్రత్యేకమైన విషనాశకము లేదు.
లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాల నిర్వాహణ
1. శిలీంధ్రనాశక తయారీదారు లేదా వినియోగదారుడి బాధ్యతగా డబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగదీసి, నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పాతాలి.
2.వినియోగించిన డబ్బాలను మళ్లీ ఉపయోగించేందుకు బహిరంగంగా ఉంచకూడదు.
3. డబ్బాలు లేదా మిగిలిన శిలీంధ్రనాశకము లేదా కడిగిన నీటిని చుట్టుపక్కల వస్తువులు మరియు త్రాగునీరు కలుషితం కాకుండా విధ్వంసం చేయాలి.

నిల్వ నిబంధనలు
1. శిలీంధ్రనాశక డబ్బాలను వేరే గదుల్లో లేదా అలమారాల్లో ఉంచాలి; అక్కడ ఆహార పదార్థాలు లేదా పశు మేత వంటి ఇతర వస్తువులు నిల్వ ఉండకూడదు,
అలాగే పరిమాణం మరియు రకానికి అనుగుణంగా తాళం వేసిన వేర్వేరు అలమారాల్లో ఉంచాలి.
2. పురుగుమందు నిల్వ చేసే స్థలం లేదా అలమారి బలమైన నిర్మాణంతో, పొడిగా, వెలుతురు కలిగి, గాలిచొరబడేలా
3. మరియు తగిన స్థలంతో ఉండాలి, అప్పుడు పురుగుమందు ఆవిరి వల్ల వాతావరణం కలుషితం కాదు."

రసాయన సంయోజనము

క్రమ సంఖ్య	భాగం	వివరణ	పరిమాణం
1	సల్ఫర్ క్రియాశీల పదార్థం	□	80.00 % బరువు/బరువు
2	తేమ కలిగించే పదార్థం	అల్కైల్ నాఫ్తలీన్ మరియు అరోమాటిక్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం ఉప్పు	2.00 % బరువు/బరువు
3	వ్యాప్తి పదార్థం	ఫీనాల్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం ఉప్పు	8.00 % బరువు/బరువు
4	చైనా మట్టి / కయోలిన్	□	అవసరమైనంత
	మొత్తం		100 % బరువు/బరువు

హెచ్చరిక: ఈ లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలకతీతంగా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దు.

Telugu